

S-0027 - BACK PAIN FUNCTION SCALE (BPFS)' İN TÜRKÇE VERSİYON GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Gökhan MARAŞ1, Seyit ÇITAKER1, Jale MERAY2,

**1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye,
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye,**

Bel ağrısı toplumda görülen hastalıkların başında gelmektedir. Back Pain Function Scale (BPFS) bel ağrılı hastaların günlük yaşamlarında yaptıkları aktivitelerde zorlanma seviyesini sorgulayan hastanın kendi yaptığı bir ankettir. Bu çalışmanın amacı BPFS' in Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirligini ortaya koymaktır.

Çalışmaya kronik bel ağrısı olan 18-65 yaş aralığında 180 kişi alındı. Anketin Türkçe' ye uyarı ve çevirinde Beaton tarafından önerilen çeviri süreci izlendi. Anketin geçerliği için hastalara Roland Morris Disabilitate Ölçeği ve Oswestry Disabilitate Ölçeği uygulandı. Anketin test-retest güvenirligini araştırmak için 66 hastaya 7 gün arayla BPFS tekrar uygulandı. Güvenilirliği değerlendirmek için sınıf içi korelasyon katsayıları ve Cronbach alfa hesaplandı. Ölçeğin geçerliliği Roland Morris Disabilitate Ölçeği ve Oswestry Disabilitate Ölçeği ile Spearman's Korelasyonu bakılarak değerlendirildi.

Cronbach's Alpha katsayısı 0,910 değeri ile yüksek seviyede iç tutarlılık gösterdi. Sınıf içi korelasyon katsayısı 0,961(% 95 güven aralığı: 0.947, 0.974) ile test retest güvenirliği mükemmel bulundu. Spearman's korelasyon geçerliği Roland Morris Disabilitate Ölçeği ile negatif yönde ($r: -0,800 p<0,001$), Oswestry Disabilitate Ölçeği ile negatif yönde ($r: -0,828, p<0,001$) bulundu. Sonuçlar BPFS' in yapılan diğer anketlerle mükemmel korelasyonda olduğunu gösterdi.

Bel ağrılı hastaların günlük aktivitelerini yaparken ne kadar zorlandıklarını değerlendiren BPFS' in Türkçe versiyonu geçerli ve güvenilir olup klinisyenlerce bel ağrılı hastaları değerlendirmek amacıyla kullanılabilir