

**T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**PEDİATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN
MORAL DİSTRES REVİZE-ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI**

Mustafa Sabri KOVANCI

**Psikiyatri Hemşireliği Programı
YÜKSEK LİSANS TEZİ**

ANKARA

2020

**T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**PEDİATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN
MORAL DİSTRES REVİZE-ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI**

Mustafa Sabri KOVANCI

**Psikiyatri Hemşireliği Programı
YÜKSEK LİSANS TEZİ**

TEZ DANIŞMANI

Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ

ANKARA

2020


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PEDİATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN MORAL DİSTRES REVİZE-ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öğrenci: Mustafa Sabri KOVANCI
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ

Bu tez çalışması 17.04.2020 tarihinde jürimiz tarafından "Psikiyatri Hemşireliği Programı" nda yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Başkanı:	<i>Doç. Dr. Duygu HIÇDURMAZ</i> (Hacettepe Üniversitesi)	
Tez Danışmanı:	<i>Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ</i> (Hacettepe Üniversitesi)	
Üye:	<i>Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai KÖKEN</i> (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)	
Üye:	<i>Dr. Öğr. Üyesi Sevilay KARAHAN</i> (Hacettepe Üniversitesi)	
Üye:	<i>Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN</i> (Hacettepe Üniversitesi)	

Bu tez Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri tarafından uygun bulunmuştur.

04 Mayıs 2020


Prof. Dr. Diclehan Orhan
Enstitü Müdürü

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI


Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.

Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan *“Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”* kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

- Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir. ⁽¹⁾
- Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren ... ay ertelenmiştir. ⁽²⁾
- Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. ⁽³⁾

22 /04/2020


Mustafa Sabri KOVANCI

⁽¹⁾“Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”

(1) Madde 6. 1. Lisansüstü teze ilişkin patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

(2) Madde 6. 2. Yeni teknik, materyel ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ay aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.

(3) Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir *. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir

* Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.

ETİK BEYAN

Bu çalışmadaki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, yararlandığım kaynaklara bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, tezimin kaynak gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu, Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ danışmanlığında tarafımdan üretildiğini ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.



Mustafa Sabri KOVANCI

TEŞEKKÜR

Yüksek lisans eğitimim süresince kıymetli bilgi ve tecrübeleri ile her türlü yardım ve desteği sağlayan, çalışmanın her aşamasında bilgi ve deneyimleriyle yol gösteren ve destekleyen değerli tez danışmanım Sayın Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'a saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Lisans hayatımdan itibaren kişisel gelişimimde ve akademik hayatımda bilgi ve tecrübesiyle yol gösteren, desteğini ve emeğini her zaman hissettiğim kıymetli hocam Sayın Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ'a

Yüksek lisans eğitim süresince katkılarından dolayı bütün hocalarıma,

Tezimin uygulama aşamasının yürütülmesindeki katkılarından dolayı Türk Hemşireler Derneği ve Çocuk Hemşireler Derneği yönetimine,

Veri toplama aşamasında zamanlarını ayırarak bana destek olan ilgili bölümlerde çalışan değerli meslektaşlarıma,

Çalışmam süresince her zaman beni destekleyen roket takımına ve kıymetli arkadaşlarıma,

Tüm hayatım boyunca benden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ve attığım her adımda arkamda olduklarını hissettiren aileme en içten dileklerle teşekkür ederim.

ÖZET

Kovancı, MS., Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Bu çalışma, pediatri hemşirelerindeki moral distres düzeyini ölçmek amacıyla Hamric ve ark. (2012) tarafından geliştirilen Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire (MDS-R) ölçeğinin Türkçe formunun, geçerlik ve güvenilirlik çalışması olarak metodolojik desende planlanmıştır. Araştırma, 15 Temmuz 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında, Çocuk Hemşireleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği aracılığıyla ulaşılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 210 pediatri hemşiresi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, “Hemşire bilgi formu” ve “Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği (PH-MDRÖ)” ile toplanmıştır. Ölçeğin, geçerliğinin değerlendirilmesinde, “dil”, “kapsam”, “görünüş” ve “yapı” geçerliği analizleri kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal yapısının doğrulanmasında kullanılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir sınırlar altında bulunduğu için, Türk dili ve kültüründeki faktör yapısının belirlenmesinde açıklayıcı faktör analizi kullanılmış ve beş faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. PH-MDRÖ’nün beş faktörlü yapısının, “geçerli” bir ölçek olduğu kabul edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacı ile yapılan analizlerde, ölçek için hesaplanan Cronbach Alfa değeri, 0,865 bulunmuştur. Ayrıca, ölçek için, eş değer yarılar analizi sonucunda katsayılar 0,891 olarak hesaplanmış, korelasyona dayalı madde analizi sonucunda değerler kabul edilebilir aralıkta ve madde ayırt ediciliğinin yeterli olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; PH-MDRÖ’nün 21 madde ve beş alt boyuttan oluşan Türkçe formunun Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin, pediatri hemşirelerinde moral distres düzeyinin belirlenmesi amacıyla kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ahlaki sıkıntı, etik, pediatri, pediatri hemşireliği, geçerlik ve güvenilirlik

ABSTRACT

Kovanci, MS., Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Moral Distress Scale-Revised for Pediatric Nurses, Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Psychiatric Nursing Program, Master's Thesis, Ankara, 2020. This study with a methodological design was structured as a validity and reliability study for the Turkish version of the Moral Distress Scale-Revised for Pediatric Nurses (MDS-R) developed by Hamric et al. (2012) in order to measure the level of moral distress in pediatric nurses. The research was carried out between July 15, 2019 - January 1, 2020 with the participation of 210 pediatric nurses who were reached through the Pediatric Nurses Association and the Turkish Nurses Association and agreed to participate in the research. The research data were collected through "Nurse information form", "Moral Distress Scale-Revised for Pediatric Nurses (MDSR-PN)". The scale's validity was evaluated in terms of "language", "scope", "face" and "construct" validity. As a result of the confirmatory factor analysis used to verify the original structure of the scale, the fit index values were determined to be within the acceptable limits. Thus, explanatory factor analysis was employed to identify the factor structure in the Turkish language and culture, and a five-factor structure emerged. The five-factor structure of MDSR-PN showed that the scale was "valid." In the analyses made to evaluate the reliability of the scale, the Cronbach's Alpha value calculated for the scale was found to be 0.865. In addition, as a result of the analysis of equivalent halves for the scale, the coefficients were calculated as 0.891, and the correlation-based item analysis showed that the values were within the acceptable range and the discrimination of the items was adequate. As a result, it was determined that the Turkish version of MDSR-PN, consisting of 21 items and five sub-dimensions, is a valid and reliable measurement tool suitable for the Turkish culture. The use of the scale to determine the level of moral distress in pediatric nurses is recommended.

Keywords: moral distress, ethics, pediatrics, pediatric nursing, validity and reliability

İÇİNDEKİLER

ONAY SAYFASI	iii
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI	iv
ETİK BEYAN	v
TEŞEKKÜR	vi
ÖZET	vii
ABSTRACT	viii
İÇİNDEKİLER	ix
SİMGELER VE KISALTMALAR	xii
ŞEKİLLER	xiii
TABLolar	xiv
1. GİRİŞ	1
2. GENEL BİLGİLER	5
2.1. Stres	5
2.1.1. İş Stresi	5
2.1.2. Hemşirelerde İş Stresi	6
2.2. Moral Distres (Ahlaki Sıkıntı) Tanımı	7
2.2.1. Moral Distres Süreci	11
2.2.2. Moral Distres Modelleri	13
2.2.3. Moral Distresin Etkileri	20
2.2.4. Moral Distresi Önleme	21
2.2.5. Moral Distresin Değerlendirilmesi	25
2.3. Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği (KLPH) ve Moral Distres	30
2.4. Ölçek Uyarlama Çalışmalarında Geçerlik ve Güvenirlik	31
2.4.1. Geçerlik	31
2.4.2. Güvenirlik	36
3. GEREÇ VE YÖNTEM	40
3.1. Araştırmanın Şekli	40
3.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı	40
3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi	41
3.4. Veri Toplama Araçları	42

3.5.	Araştırmanın Uygulanması	43
3.5.1.	Araştırmanın Ön Uygulaması	43
3.5.2.	Araştırma Verilerinin Toplanması	43
3.6.	Araştırmanın Etik Boyutu	43
3.7.	Moral Distress Scale- Revised Pediatrics Nurses Ölçeği'nin Uyarlama Aşamaları	44
3.7.1.	MDS-R Geçerlik Aşamaları	44
3.7.2.	PH-MDRÖ'nün Güvenirlik Aşamaları	47
3.8.	Verilerin Analizi	48
3.9.	Araştırmanın Kısıtlılıkları ve Güçlü Yönleri	48
4.	BULGULAR	50
4.1.	Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri	50
4.2.	PH-MDRÖ'nin Geçerlik Bulgularının İncelenmesi	53
4.2.1.	PH-MDRÖ'nin Dil Geçerliği	53
4.2.2.	PH-MDRÖ Kapsam Geçerliği	54
4.2.3.	PH-MDRÖ Görünüş Geçerliği	56
4.2.4.	PH-MDRÖ Yapı Geçerliği	56
4.3.	PH-MDRÖ'nin Güvenirlik Bulgularının İncelenmesi	60
4.3.1.	PH-MDRÖ'nin İç Tutarlık Cronbach α Kat Sayısı Bulguları	60
4.3.2.	PH-MDRÖ'nün Eş Değer Yarılar Testi Bulguları	61
4.3.3.	Madde Analizi	62
4.4.	PH-MDRÖ'nin Ölçek Puanlarının Katılımcılara Ait Özelliklere Göre Dağılımı	65
5.	TARTIŞMA	70
5.1.	PH-MDRÖ'nün Geçerliği	70
5.2.	PH-MDRÖ'nün Güvenirliği	77
6.	SONUÇ VE ÖNERİLER	83
6.1.	Sonuç	83
6.2.	Öneriler	84
7.	KAYNAKÇA	86
8.	EKLER	98
EK-1.	Hemşire Bilgi Formu	

EK-2. Pediatri Hemřireleri İin Moral Distres Revize-Öleđi

EK-3. Arařtırma Davet Formu

EK-4. Hacettepe Üniöersitesi Giriřimsel Olmayan Etik Kurul Onayı

EK-5. Hacettepe Üniöersitesi Giriřimsel Olmayan Etik Kurulu Protokol Revizyon Onayı 103

EK-6. Bařvurulan Üniöersite Hastaneleri, Eđitim Arařtırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinden Gelen Ret Yazıları

EK-7. Bařvurulan Üniöersite Hastaneleri, Eđitim Arařtırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinden Gelen İzin Yazıları

EK-8. ocuk Hemřireleri Derneđi ve Türk Hemřireler Derneđi izin yazıları

EK-9. Aydınlatıřmıř Onam

EK-10. MDS-R Öleđinin Yazarının Geerlik ve Güvenirlik alıřmasına Yapılmasına İliřkin Onay Yazısı

Ek-11. Turnitin Dijital Makbuz ve Orijinallik Raporu

9. ÖZGEMİř

SİMGELER VE KISALTMALAR

AACN	American Association of Critical Care Nurses - Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliği
AFA	Açıklayıcı Faktör Analizi
AMOS	Analysis of Moment Structures
ANOVA	Analysis of Variance-Tek Yönlü Varyans Analizi
DFA	Doğrulayıcı Faktör Analizi
DSÖ	Dünya Sağlık Örgütü
ICN	International Council of Nurses - Uluslararası Hemşireler Birliği
ILO	International Labour Organization-Uluslararası Çalışma Örgütü
KGİ	Kapsam Geçerlik İndeksi
KGO	Kapsam Geçerlik Oranı
KLPH	Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği
KMO	Kaiser-Mayer- Olkin Testi
MDS	Moral Distress Scale
MDS-R	Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire
PH-MDRÖ	Pediatric Hemşireleri İçin Moral Distress Revize-Ölçeği
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
TDK	Türk Dil Kurumu

ŞEKİLLER

Şekil	Sayfa
2.1. Moral distres kreşendo etkisi	12
2.2. Moral distres ikilemi	13
2.3. Moral distres teorisi modeli	19
4.1. Faktörlere ilişkin yamaç birikinti grafiği	59



TABLOLAR

Tablo	Sayfa
3.1. MDS-R'nin dil ve kapsam geçerliđi uygulama aşamaları	45
4.1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri	51
4.2. Katılımcıların mesleki özellikleri	52
4.3. PH-MDRÖ'nün KGO ve KGI değerleri	55
4.4. PH-MDRÖ'nün KMO ve Bartlett's küresellik test sonuçları	56
4.5. PH-MDRÖ'nün DFA bulguları	57
4.6. PH-MDRÖ madde faktör yükleri, özdeğerleri ve açıklanan varyans değerleri	58
4.7. PH-MDRÖ'nün ve alt boyutlarının Cronbach α değerleri	61
4.8. PH-MDRÖ'nün eş değer yarılar bulguları	62
4.9. PH-MDRÖ'nün madde analizlerine ait bulgular	63
4.10. PH-MDRÖ'nün madde ayırt ediciliđi bulguları	64
4.11. PH-MDRÖ puan dağılımları	65
4.12. PH-MDRÖ'nün alt boyutlarının puan dağılımları	66
4.13. PH-MDRÖ puanının katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı	67
4.14. PH-MDRÖ puanının katılımcıların mesleki özelliklerine göre dağılımı	68
4.15. Katılımcıların yaş ve mesleki özellikleri ile PH-MDRÖ puanı arasındaki korelasyonlar	68

1. GİRİŞ

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana iç içe yaşadığı stres, modern yaşamla birlikte değişime uğramış, stres kaynakları farklılaşmış, değişim ve gelişimin kendisi bir stres kaynağı haline gelmiştir (1). Modern insanın stres kaynaklarının başında, kuşkusuz yaşamın büyük bir bölümünü geçirdiği iş hayatı gelmektedir. İş stresi tüm çalışma alanlarında farklı boyutlarda yaşanmakta ve istisnasız tüm çalışanların sağlığı için önem teşkil etmektedir (2-5). Sağlık hizmetinin sunulduğu ortamlar iş stresinin yoğun bir şekilde yaşandığı yerlerin başında gelmektedir (3, 6, 7). Yapılan pek çok çalışmada ise sağlık çalışanları arasında en yoğun derecede strese maruz kalan grubun hemşireler olduğu bulunmuştur (4).

Uluslararası Çalışma Örgütü - (International Labour Organization) (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün hazırladığı ortak raporda, hemşirelerin çalışma ortamına ait başlıca stresörleri, aşırı iş yükü, rol çatışması ve belirsizliği, vardiya ile çalışma, yöneticilerle, meslektaşlarla ve hizmet alıcılarda yaşanan çatışmalar, hasta bireylerle temas nedeniyle yaşanan duygusal stres, yoğun bakıma gereksinimi olan ve ölmekte olan hastalarla çalışma olarak tanımlanmaktadır (8). Hemşirelerin stres kaynakları arasında, yıldırma (mobbing) ve iş ortamındaki fiziksel sorunlar da yer almaktadır (9-11). Ayrıca, literatürde son yıllarda yer almaya başlayan ve hemşirelerin stres kaynaklarından biri olarak tanımlanan durumlardan biri de moral distrestir. Güncel literatür moral distresin hemşireler tarafından son derece yaygın ve çok boyutlu bir şekilde deneyimlendiğini ortaya koymaktadır (12-15).

Moral distres ilk olarak, 1984 yılında Andrew Jameton tarafından; "Bir kişinin yapılacak doğru eylemi bilmesine rağmen, kurumsal kısıtlamalar nedeniyle doğru olduğuna inandığı şekilde hareket etmesinin neredeyse imkânsız olduğu durumlarda yaşadığı sıkıntı" olarak tanımlanmıştır (16). Wilkinson (1987), moral distresi; "Bir kişi ahlaki bir karar verdiğinde ancak verdiği bu kararı ahlaki davranış olarak uygulayamadığında oluşan psikolojik dengesizlik ve olumsuz duygu hali" olarak tanımlamıştır (17). Hamric (2014), Jameton ve Wilkinson tarafından yapılan tanımlarını daha da genişleterek, kavramın en güncel ve en yaygın olarak kabul gören tanımını yapmıştır; "Bireyin ahlaki bütünlüğünün ciddi bir şekilde tehlikeye girmesi ya da temel değerler ve yükümlülüklerle hareket edememe ya da eylemlerinin

istenilen sonuca ulaşmada başarısız olmasından dolayı ortaya çıkan sıkıntı” (18). Yapılan neredeyse tüm tanımlarda, çalışanların etik bir durum ile karşılaştıkları zaman, doğru olduğuna inandıkları girişimleri uygulamada karşılaştıkları bireysel, kurumsal ve dış engeller vurgulanmaktadır.

Literatür incelendiğinde, moral distressin hemen hemen tüm sağlık çalışanları tarafından, sağlık bakım ortamlarının tümünde deneyimlendiği görülmektedir (19-25). Ancak, çalışmaların büyük kısmı hemşireler üzerinde gerçekleştirilmiştir (26-30). Günlük uygulama içerisinde sık sık etik karar verme gereğinin ortaya çıktığı birimler, moral distress yaşanması açısından daha özellikli birimlerdir. Pediatri klinikleri ise bu birimler içinde yer almaktadır (19, 21, 22, 31). Pediatri kliniklerinde yürütülen bakımda ortaya çıkan etik konular, yetişkin bakımında görülen etik konulara göre farklılık göstermektedir (27-30, 32-34). Ailenin bakım ve karar verme sürecinde etkin rol alması, çocuğun, ailenin ve sağlık personellerinin bambaşka ihtiyaçlar ve kaygılar içinde olması, mevcut durumu değerlendirmelerinde farklılıklara yol açmaktadır. Ayrıca tanı, tedavi ve bakım uygulamalarının seçimi sırasında, ebeveyn talepleri, çocuğun talepleri ve sağlık çalışanının doğruları arasında denge oluşturulması kolay olmamaktadır (28, 30). Bu nedenle çocuklar, ebeveynlerinin ve sağlık personellerinin istekleri arasındaki fikir ayrılıklarının baskısını hissedebilmekte, kendileri ise bambaşka isteklere sahip olabilmektedir (28, 30).

Pediatri hizmeti alan grubun kendine özgü özellikleri, istismar ve ihmale açık olmaları, incinebilirliği yüksek bireylerden oluşması, karar verme sorumluluğunun muğlak olması ve sunulan hizmetin kendine özgü dinamikleri, etik konuları gündeme getirmektedir. Bu durumlarda doğru eyleme karar verme ve bu eylemi uygulayabilme ise hemşirelerde zorlanmaya yol açabilmektedir (26, 35). Literatür pediatri hemşirelerinin yaşamış oldukları bu zorlanmaya dikkat çekmekte, yaşadıkları moral distress düzeyini ise düşük, orta ve ortanın üzerinde olarak belirtmektedir (26, 28, 29, 35).

Moral distressin, sağlık kurumunu, sağlık çalışanlarını ve bakım alan bireyi olumsuz bir etkilediği çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur (36-38). Moral distressin sağlık çalışanı üzerindeki etkileri fiziksel, psikolojik ve sosyal seviyelerde görülmektedir (39, 40). Bu etkiler, kavramının doğası gereği birdenbire ortaya çıkan

ya da kaybolan nitelikten ziyade, aşamalı olarak ilerleyen, moral distressi tetikleme potansiyeli olan durumlarda ise artarak patlak verir niteliktedir (41, 42). Çaresizlik hissi (43), tükenmişlik (44, 45), verimde azalma, iş tatminsizliği (39), ve işten ayrılma isteği (39, 46, 47) gibi durumlarla sonuçlanan moral distress, hem çalışana, hem hastaya, hem de kuruma zarar vermektedir (42, 48, 49).

Moral distressle mücadele etmenin ilk adımı, mevcut durumun değerlendirilmesidir. Güncel literatürde, hemşireler tarafından deneyimlenen moral distressi ölçmek amacıyla geliştirilmiş dört ölçüm aracı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Corley (2001) tarafından, yoğun bakım hemşireleri üzerinde geliştirilmiştir (50). İkinci ölçek Ohnishi ve ark. (2010) tarafından, Corley (2001) tarafından geliştirilen ölçeği temel alarak geliştirilmiş ve ölçek psikiyatri hemşirelerine özel olarak yapılandırılmıştır (25). Moral distress alanında geliştirilen üçüncü ölçek ise, “Moral distress Termometresi” dir (51). Bu ölçüm gereci analog skala şeklinde ve tek boyutlu olarak, son iki hafta içinde yaşanan moral distressin sıklığını ölçmektedir (51). Son ölçek ise, Corley tarafından geliştirilen moral distress ölçeğinin güncel olmadığı düşünülen maddeleri çıkartılarak, Hamric ve ark. (2012) tarafından çalışılmış ve altı paralel form olacak şekilde ölçeği revize etmiştir. Bu paralel formlar, yetişkin hemşire formu, yetişkin doktor formu ve yetişkin diğer sağlık çalışanları formu ile pediatri hemşire formu, pediatri doktor formu ve pediatri diğer sağlık çalışanları formudur (37). Ülkemizde, Karagözoğlu ve ark. (2017) tarafından Hamric ve ark. (2012) tarafından revize edilen ölçeğin, yetişkin hemşire formu Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (52). Pediatri hemşirelerinin moral distress düzeyini ölçebilecek özellikteki tek ölçek, Hamric tarafından geliştirilen “Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire” dir.

Bu çalışma, pediatri hemşirelerine yönelik moral distress düzeylerini ölçmek için Hamric ve ark. (2012) tarafından geliştirilen “Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire” in (37) Türkçe uyarlamasını, geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yaparak alana özgü yeni bir ölçme aracı kazandırmak amacıyla yürütülmüştür.

Araştırma sonucunda aşağıdaki soruların cevaplanması planlanmıştır.

Araştırma soruları;

1. Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire ölçeđinin Türkçe formu geçerli midir?
2. Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire ölçeđinin Türkçe formu güvenilir midir?
3. Türkiye’de çalışan pediatri hemşirelerinin moral distrese ilişkin durumları nasıldır?



2. GENEL BİLGİLER

2.1. Stres

İçinde bulunduğumuz çağın en büyük sorunlarından biri olan stres; tıp, hemşirelik, psikoloji, mühendislik, örgütsel davranış vb. çalışma alanı ve bilim dalının ilgi odağı olmuştur. Literatürde, uzun yıllardır stresin kapsamı, sonuçları ve mücadele yolları tartışılmaktadır (10). Stres terimi, Latince “estrica”, eski Fransızca “estrece” sözcüklerinden gelmekte ve iki farklı anlamda kullanılmaktadır (53). Bu anlamlardan ilki insanın tehlike içinde bulunduğu etmen ve koşullara göre dengesinin bozulmasını ifade etmekte, diğeri ise bu dengenin bozulmasına yol açacak faktörleri işaret etmektedir (9). Stres genel olarak, “birey-çevre etkileşiminde, bireyin uyumunu tehlikeye atan ve mevcut kaynakları zorlayan veya aşan çevre talepleri “olarak tanımlanmaktadır (53).

Fransız fizyolog Claude Bernard, 19. yüzyılın ilk yarısında stresin tanımını yapmış ve her canlının dış çevredeki değişimlere karşı, iç çevresini sabit tutma çabasının olduğunu belirtmiştir (53, 54). Diğer bir araştırmacı olan Walter B. Cannon, insan organizmasının bu iç dengeyi koruma çabasını “homeostasis” olarak adlandırmış ve canlının iç dengesini bozacak her türlü dış tehdide karşı “savaşma ve kaçma” reaksiyonu gösterdiğini savunmuştur (9). Stres kavramı üzerinde öncü isimlerden biri olan Hans Selye ise stresi; “insan vücudunun herhangi bir isteme verdiği özgül olmayan karşılık” olarak tanımlamıştır. Ayrıca bazı tanımlarda stres, kişinin performansını etkileyen, kişi üzerinde fizyolojik ve psikolojik baskı oluşturan duygu, düşünce ve davranış olarak tanımlanmaktadır (9, 10, 53-55).

Bireyin fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan her etken bir stres kaynağı olarak nitelendirilmekte ve yoğun yaşanan stres, kişilerin sağlık durumunda olumsuzluklarla sonuçlanmaktadır. Bu etkiler bireyde psikolojik, fizyolojik ve davranışsal olarak üçe ayrılmaktadır (9, 10, 53).

2.1.1. İş Stresi

İnsanoğlu var oluşundan bu yana stres ile iç içe yaşamıştır ve stres hayatta kalmasını ve çevresine uyum sağlamasını kolaylaştıran bir faktör olmuştur (9, 10, 54). Günümüzde hayat şartlarının sürekli değişiyor olmasının, insanların fiziksel ve ruhsal

yapıları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler karşısında insanların uyum gösterme çabası kaçınılmazdır. Ancak günümüz yaşam koşulları, stres yaşantısını artırmış ve stres kaynaklarını da çeşitlendirmiştir. Bu stres kaynaklarının başında kuşkusuz insanların genç yaşlardan başlayarak yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri iş ortamı ve iş hayatı gelmektedir (1, 10, 53, 54, 56).

İş, insanların hayatlarını devam ettirilebilmesi için bir araç ve amaç birlikteliğini içeren bir olgudur. Bu nedenle iş, günümüzde insanlar için önemli bir yere sahiptir. Araştırmalar, iş yerinde yaşanan stresin çalışanlar üzerinde psikolojik ve fizyolojik baskılar ve yıkımlar oluşturduğunu, onların sağlık ve başarılarını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir (2, 3, 57-63). İş stresinin tanımı genel olarak, bireyin çevre ile ilişkisi olarak tanımlanıp, bireysel farklardan ve psikolojik süreçlerden etkilenen, dış çevre, durum, olayın sonucuna bir yanıt olarak tanımlanabilir (5, 34, 56). Bir başka deyişle iş stresi, kişilerin işleri ile ilişkilerinden doğan ve işlevselliklerini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur (64).

Stres her meslek grubu için önem teşkil etmektedir. Çalışanlar strese maruz kaldıkları gibi, bunun sonuçlarını da yaşamak zorunda kalmaktadır. Bazı meslek grupları stresi yoğun bir şekilde yaşarken, bazı meslek grupları ise stresi görece daha az deneyimlemektedir. Stresin en yoğun yaşandığı iş yerlerinin başında gelen hastanelerde çalışan sağlık çalışanları stresin yoğun olarak yaşandığı gruplardandır (61).

2.1.2. Hemşirelerde İş Stresi

Sağlık hizmetleri ortamlarında işi gereği insanlarla iç içe ve yüz yüze çalışan hekim, hemşire gibi sağlık çalışanları genellikle stresin etkilerine yakından maruz kalmaktadır. (6). Bu durum da ister istemez sağlık bakım hizmetlerinde çalışma yaşamını olumsuz etkilemektedir. Sağlık profesyonelleri arasında bakım alan birey ile en uzun süre temas halinde olan kuşkusuz hemşirelerdir. Bu nedenle hemşireler, yaşanan iş stresini en yoğun şekilde deneyimleyen meslek gruplarının başında gelmektedir. Belirli düzeyde yaşanan stres hemşirelerin görevlerini yerine getirmede onları motive ederken, sürekli ve aşırı yaşanan stres çalışanları olumsuz yönde etkilemektedir (7).

ILO ve DSÖ'nün hazırladığı ortak raporda, hemşirelerin çalışma ortamına ait başlıca stresörleri aşırı iş yükü, rol çatışması ve belirsizliği, vardiya ile çalışma, yöneticilerle yaşanan çatışmalar, hastalarla çalışma nedeniyle yaşanan duygusal stres, yoğun bakıma gereksinimi olan ve ölmekte olan hastalarla çalışma, hastalarla yaşanan çatışmalar olarak tanımlamaktadır (8). Bunlara ek olarak literatürde, örgütsel stres kaynakları arasında yıldırma (mobbing) ve iş ortamındaki fiziksel sorunlar da önemli stres faktörleri olarak görülmektedir (10, 54, 55, 65). Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ise, hemşirelerde görülen iş stresi kaynaklarını çalışma şartları, çalışma ortamındaki ilişkiler, çatışma ve belirsiz rol, çevresel düzenleme ve iklim şartları, çalışma ortamı ile ev arasındaki engeller, mesleki gelişme, işin niteliği olarak sıralamıştır (66).

Uzun dönemli yaşanan iş stresi hemşirelerin kişisel ilişkilerini de etkilemekte, işe devamsızlıklarını arttırmakta, motivasyon düşüklüğüne, çatışmalar yaşanmasına neden olmakta, iş tatminsizliğine yol açmakta, tükenmişliğe neden olmakta, iş doyumunu azalmakta, iş bırakma oranını ve verimsizliği artırmaktadır (2, 57, 62, 63, 67-70). Böyle durumlarda daha olumlu çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması birey ve kurum açısından önemlidir.

Sağlık bakım hizmetlerindeki stres kaynakları kurum ya da birimlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde ölümcül hastaya bakım verme ve ölüm olgusu ile başa çıkmaya çalışma en önemli stres nedeni iken, cerrahi ve dahili birim gibi servislerde çalışan hemşirelerde çalışan yetersizliği ve aşırı iş yükü en önemli stres nedeni olarak görülmüştür (63, 71). Bu stres faktörleri ile birlikte hasta bireyin çocuk olması, girişimlerin ve bakımın çocuğa verilmesi de psikolojik ve duygusal yük oluşturan bir unsur olmakta, hemşirelerin stres düzeylerinin artırmaktadır (72). Bütün bu durumlar pediatri kliniklerinin ve pediatri hemşirelerinin diğer birimlerdeki hemşirelere göre daha özellikli bir hale gelmesine neden olmaktadır.

2.2. Moral Distres (Ahlaki Sıkıntı) Tanımı

Fransızca "Morale" kelimesinden köken alan moral terimi Türkçe'ye ahlaki, ahlakla ilgili olarak çevrilmektedir. Arapça kökenli olan ahlak kelimesini Türk Dil Kurumu (TDK) "bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış

biçimleri ve kuralları” olarak tanımlamaktadır (73). Ahlakın (moral), en genel tanımı, toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları yazılı olmayan davranış biçimleri ve kurallardır. Ahlak pek çok bilim alanının ilgi odağı olmuştur. Deontolojide ahlak, doğru ve yanlış davranışlar konusundaki gelenek ve inanışları kapsarken (74), psikolojide, bireyin inançları, tutumları, duyguları, yetenekleri sonucu ortaya çıkan, iyi veya kötü olarak nitelendirilebilecek davranışların bütünü ifade edilmektedir (75). Sosyolojik açıdan ise, insan topluluklarınca zamanla benimsenen, bireylerin birbirleriyle ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen kurallar, ilkeler ve inançlar bütünü şeklinde tanımlanmaktadır. Ahlak, çok yönlü anlam içermekle beraber, özelde insan davranışlarının ve insanlar arasındaki ilişkilerin, genelde ise toplumun oluşturduğu birtakım kuralların iyi veya kötü olarak nitelendirilmesidir (75). Moral kelimesinin ahlak kelimesini tam olarak karşılamadığı düşünüldüğü için yazarlar çalışmada moral kelimesini kullanmayı tercih etmiştir.

Jameton ahlakı, toplum tarafından benimsenen önemli sosyal değerler veya normlarla bireyin kendisinin belirlediği doğru ve yanlışlar bütünü olarak tanımlamaktadır (16). Toplumsal değer ve normlarla, bireyin doğru ve yanlış algısı paralel olabildiği gibi nadiren komplike olmayan, çözülemeyen veya tanımlanamayan problemlere neden olabilecek şekilde çatışabilmektedir. Bu çatışma bireyler tarafından distres yaşantısı olarak deneyimlenmektedir.

Distres kavramı, güçsüzlük, hüznün, korku, depresyon, anksiyete, panik, endişe, üzüntü gibi çok çeşitli durumları kapsar. Distres terimi; korku, endişe, üzüntü gibi günlük deneyimlerden, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik, izolasyon, ruhsal ve varoluşsal kriz gibi psikiyatrik ve psikososyal durumlara kadar giden geniş bir yelpazeyi tanımlamaktadır (76, 77). Distres terimi Türkçe’ye ruhsal, psikolojik sıkıntı olarak çevrilmektedir. TDK ise, sıkıntı sözcüğünü, bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk hali olarak tanımlamıştır (78). Distres kavramının anlamı ve sıkıntı kelimesinin tanımına bakıldığında tam olarak birbirlerinin anlamını karşılamadıkları görülmektedir. Distres, sıkıntıya göre daha geniş bir anlam içermektedir. Bu nedenle, çalışma boyunca distres kelimesinin kullanılmasına karar verilmiştir.

Moral distres ise, bireyin yapılacak doğru davranışı bildiği halde engeller nedeniyle doğru davranışı gerçekleştirememesi durumunda yaşadığı sıkıntı olarak ifade edilmektedir (40, 46, 52). Moral distres kavramı yaklaşık son 30 yıldır literatürde yer almakta ve kavram üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir. Dolayısıyla moral distresin tanımı konusunda da henüz bir uzlaşmaya varılmamış, pek çok bilim insanı kendi bakış açısına uygun olarak moral distresi tanımlamıştır. Kavramın literatürde yeni olması nedeniyle bu bölümde moral distres tanımına geniş bir yer ayrılmış ve literatürde karşılaştığımız tüm tanımlar bu bölüme dahil edilmiştir.

Moral distres ilk olarak, 1984 yılında Andrew Jameton tarafından “Bir kişinin yapılacak doğru eylemi bilmesine rağmen, kurumsal kısıtlamalar nedeniyle doğru eylem sürecini takip etmesinin neredeyse imkânsız olduğu durumlarda yaşadığı sıkıntı” olarak tanımlanmıştır (16).

1987 yılında ise Wilkinson “Bir kişi ahlaki bir karar verdiğinde ancak verdiği bu kararı ahlaki davranış olarak uygulayamadığında oluşan psikolojik dengesizlik ve olumsuz duygu halidir.” şeklinde tanımlamıştır (17).

Corley’in aktardığına göre Webster ve Basliy (2000) Jameton’un tanımının genişletilmesini önermiş ve “doğru eylemi takip edememe durumuna” ek olarak “doğru eylemi takip etmek için başarısız olmak, yargılamada bir hata, bazı kişisel başarısızlıklar veya kişinin kontrolü dışındaki koşullar durumalar” şeklinde eklemelerde bulunmuşlardır (79).

Corley ise, moral distres kavramını daha çok hasta savunuculuğu bağlamında incelemiş ve “Ahlaki olarak uygun eylemin bilincinde olduğunda ancak kurumsal kısıtlamalar nedeniyle hasta için doğru olabilecek ahlaki kararları uygun bir şekilde gerçekleştiremediğinde ortaya çıkan psikolojik sıkıntı, ızdırap” olarak tanımlamıştır (79).

Bir tanımda ise moral distres, “etik bir durum meydana geldiğinde ahlâkî açıdan doğru davranışı yapmak için harekete geçmede, içsel ve dışsal faktörler nedeni ile istenen davranışların uygulanmasının imkânsız olması sonucu meydana gelen sıkıntı” şeklinde tanımlanmıştır (80).

Nathaniel (2006) ise, daha önce yapılmış olan tanımları sentezleyerek moral distesi "kişi ahlaki bir sorunu fark ettiğinde ve ahlaki sorumluluk aldığı anda doğru

eylem hakkında yargıda bulunma sürecinde deneyimlediği zihinsel, fiziksel veya ilişkiyel etkileri sıkıntı ya da ızdıraptır" şeklinde tanımlamıştır (81).

Diğer bir araştırmacı olan Sporrong (2007) ise moral distres sürecini "ahlaki bir stres faktörü ile başlayan olası bir tepki" olarak nitelendirmiştir. Sporrong (2007)'a göre, sağlık hizmetlerinde verilen bir ahlaki kararın, ahlaki stres faktörü sayılabilmesi için hem verilen sağlık hizmeti ile hem de hastaya karşı yerine getirilmesi gereken görevlerle ilişkili olması gerekmektedir (82).

Pendry (2007) ve De Villers ve Devon (2012) ise Jameton'un yaptığı moral distres tanımına ek olarak, moral distresi "içsel veya dışsal kısıtlamaların neden olduğu fiziksel ya da duygusal acı, duygusal tepki" olarak tanımlamışlardır (83, 84).

Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliği (American Association of Critical-Care Nurses) (AACN) 2008 yılındaki yayınladığı bildirmede moral distres kavramına değinmiş ve "ahlaki açıdan doğru olduğunu bildiğiniz halde, bu eylemi gerçekleştirmediğinizde, kişisel ve profesyonel değerlerinize ters düşen eylemi yapmanız durumunda ortaya çıkan bir deneyim" şeklinde tanımlamıştır (85).

Hamric (2014) ise, Jameton ve Wilkinson tanımlarını daha da genişleterek, moral distresi; "Bireyin ahlaki bütünlüğünün ciddi bir şekilde tehlikeye girmesi ya da temel değerler ve yükümlülükler göre hareket edememe ya da eylemlerinin istenilen sonuca ulaşmada başarısız olmasından dolayı ortaya çıkan sıkıntı" olarak tanımlamıştır (46).

Moral distres ile yapılan çalışmalar çoğaldıkça ve kavramla ilgilenen araştırmacı sayısı arttıkça çeşitli tanımlar yapılmaya devam edilmektedir. Tanımlar incelendiğinde, tamamına yakınında, sağlık çalışanlarının etik bir durum ile karşılaştıkları zaman, ahlaki açıdan doğru olduğuna inandıkları girişimleri uygulamada karşılaştıkları bireysel, kurumsal ve dış engeller vurgulanmaktadır (17, 36, 46).

Literatürde, hemşirelik ve sağlık alanındaki moral distres son yıllarda incelenmeye başlansa da hemşirelerin moral distres deneyimlerinin modern hemşirelik başlangıcına kadar dayandığı söylenebilir. Winland Brown ve arkadaşları (2010)'nın aktardığına göre, Florence Nightingale'in Hemşirelik Notları adlı kitabında da moral distres kavramına değinilmiştir. Nightingale kitabında birey birtakım engellerle karşı

karşıya kaldığında ve vermek istediği bakımı sunamadığında yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatmıştır (86). Bahsedilen bu durum, günümüzde moral distres tanımlarında temas edilen, bireyin etik olarak yapılması doğru olan şeyi bilmesine rağmen, algıladığı bu yükümlülükle hareket etmesi engellendiğinde, moral distresin ortaya çıkması savı ile paralellik göstermektedir.

Moral distres kavramı ilk olarak yetişkin yoğun bakım servislerinde (36, 50, 79) ve sağlık çalışanı olarak da hemşirelerle çalışılan bir kavramdır. Zaman içerisinde bu kavramın, sağlık hizmetlerinin pediatri (28, 33, 87, 88), acil servis (89), cerrahi (90), psikiyatri (25, 45, 91-93) ve onkoloji (38, 94) gibi pek çok farklı hemşirelik alanlarında çalışıldığı görülmektedir. Daha sonraları yapılan çalışmalarda ise, hekim (37, 93), eczacı (95), psikolog (96), veteriner (97) ve ebe (98) gibi farklı disiplinlere mensup sağlık çalışanlarını da etkilediği görülmüştür.


2.2.1. Moral Distres Süreci

Literatür incelendiğinde, moral distresin etik durumlara karşı verilen bir ani tepkiden ziyade bir süreç barındırdığı görülmektedir (41, 99, 100). Bu doğrultuda, Jameton (1993) moral distres sürecini “Öncül moral distres (initial)” ve “reaktif moral distres” adı altında iki bölümde incelemiştir. Öncül moral distres durumunda, birey kişisel değerleri ile çatışma yaşadığı ve kurumsal engellerle karşı karşıya kaldığı zaman sıkıntı, öfke ve kaygı vb. hissetmektedir. Birey bu duruma herhangi bir şekilde müdahale etmediğinde, moral distrese yol açan etken ortadan kalksa bile bu deneyim kişi üzerinde “reaktif moral distres” denilen bir etki bırakmaktadır. Bu durum, bireylerin öncül moral distresine neden olabilecek durumlarla karşılaşmadıklarında da hissettikleri distres olarak tanımlanmıştır (100). Bu bağlamda, moral distrese neden olan durumun üzerinden zaman geçse bile, bu etkinin kalıntısının devam etmektedir.

Yaşanan reaktif moral distres durumu, Webster ve Bayliss (2000) tarafından “moral residue (ahlâkî kalıntı)” olarak adlandırılmış ve Epstein ve Hamric tarafından moral distresle arasındaki ilişki incelenmiştir (46, 99). Bu inceleme doğrultusunda Epstein ve Hamric (2009), moral distres deneyiminin, üzerinden vakit geçtiğinde, bireyin öncül etkilerinin azaldığını hatta yok olduğunu düşündüğünü öne sürmüştür (99). Ancak ilerleyen zaman içinde, moral distrese neden olabilecek bir durumla tekrar karşılaşıldığı ahlaki kalıntı nedeniyle hızla ve ivme kazanan bir şekilde moral distres

belirtileri tekrar görülebilmektedir. Epstein ve Hamric (2009) bu durumu, “kreşendo etkisi” adı verilen bir modelde açıklamıştır (99). Moral distres kreşendo etkisi modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.

Epstein ve Hamric (2009), moral distres ve ahlaki kalıntının potansiyel üç sonucu olduğunu belirtmiştir. Bunlardan ilki, bakım sağlayıcıların etik açıdan zorlayıcı durumlara karşı ahlaki olarak duyarsız hale gelmeleridir. Bu doğrultuda bakım sağlayıcılar, ahlaki duyarlılık gerektiren klinik durumları fark edemeyebilir ya da görmezlikten gelebilir. İkincisi, bakım sağlayıcıların vicdani olarak kendini rahatsız hissetmeleri ve stres yaşamalarıdır. Üçüncü, en önemli ve en zarar verici sonuç ise bakım sağlayıcılarda tükenmişlik gelişmesidir(99, 101, 102).




Şekil 2.1. Moral distres kreşendo etkisi (99)

Tiedje (2000) ise, Jameton’un moral distres tanımını aynı şekilde kullanmış, ancak moral distres sürecini farklı aşamalandırmıştır. Tiedje (2000)’ye göre moral distres sürecinin aşamaları;

- Bir kararın uygulanmasının zor olduğunu fark etmek,
- Duygusal sıkıntı yaşamak,
- Durum hakkında derinlemesine düşünmek,
- Çözüm için olası stratejilerden seçim yapmak,

- Harekete geçmek (103).

Kalvemark ve arkadaşları (2004) ise, moral distressin etik ikilemlerden kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. Bu doğrultuda, bireyin etik ikilemler karşısında sergiledikleri davranışları “ahlaki doğru” ve “ahlaki yanlış” olarak iki gruba ayırmışlar ve “yasal doğru” ve “yasal yanlış” ile bağdaştırarak moral distress oluşumunu açıklamaya çalışmışlardır. Kalvemark ve arkadaşlarının öne sürdüğü etik ikilem durumu Şekil 2.’de şematize edilmiştir. Öne sürülen “moral distress ikilemi” görüşü doğrultusunda bir davranış hem ahlaki olarak hem de yasal olarak doğruysa “sadece yap”, hem ahlaki olarak hem de yasal olarak yanlış ise “yapma” şeklinde bir davranış sergilenmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu duruma ek olarak, eğer “ahlaki bir yanlış” ile “yasal bir doğrunun” veya “ahlaki bir doğru” ile “yasal bir yanlışın” ikileminin yaşandığı bir durum söz konusu olduğunda ise ortaya moral distressin çıkacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, Jameton’a paralel olarak moral distressin yasa ve mevzuat kaynaklı engellerden kaynaklandığını belirtmişlerdir (80).



Şekil 2.2. Moral distress ikilemi (80)

2.2.2. Moral Distres Modelleri

Literatür incelendiğinde moral distress kavramına yönelik üç model olduğu görülmektedir. İlk model Wilkinson tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir (17). Bu model hemşireliğin ahlaki yönleri ile kaliteli hasta bakımı konularından temel almaktadır. İkinci model, Wilkinson (1987)’un çalışmasından yararlanarak askeri hemşirelere özgü faktörlere adapte eden Fry ve arkadaşları (2002)’i tarafından geliştirilmiştir (104). Üçüncü model ise Jameton (1993) ve Wilkinson (1987)’un çalışmalarından yararlanılarak geliştirilen ve bir hemşirenin, bir hastaya savunuculuk

yapamadığında veya yapamayacağını algıladığında moral distresin ortaya çıktığını öne süren Corley (2002) tarafından geliştirilmiştir. Corley (2002)'in modelinde temel olarak hemşirelerin iş çevresi ile ilgili psikolojik tepkilerini içeren ahlaki yetkinliğin, moral distres deneyimine zemin hazırladığı görülmektedir. Ayrıca bu modelde ahlaki yetkinliğin gelişimi, ahlaki kavramların hemşirelerin değer sistemine dahil edilmesine bağlıdır (79). Bu bölümde her bir model ayrıntılı olarak incelenecektir.

Wilkinson'ın Moral Distres Modeli

Moral distresi, “Bir kişi ahlaki bir karar verdiğinde ancak verdiği bu kararı ahlaki davranış olarak uygulayamadığında oluşan psikolojik dengesizlik ve olumsuz duygu hali” olarak düşünen Wilkinson, moral distres sonucu ortaya çıkan deneyimin bireyin ahlaki olarak harekete geçememesinden kaynaklandığını öne sürmüştür (17). Wilkinson (1987), hemşirelerin hastalarının kritik yaşam olaylarına müdahil olduklarını, bilinçli ve bilinçsiz olarak etik karar vermeye devam ettiklerini ve hemşirelerin hastanın iyiliğini en önemli değer olarak gördüklerini belirtmiştir. Ayrıca Wilkinson, moral distresin iki ana bileşeninin olduğunu öne sürmektedir. İlk bileşen, birey ahlaki açıdan rahatsız edici veya endişe uyandıran bir durum ile karşılaştığında doğru olduğuna inandığı eylem hakkında karar verme ve bu kararı eyleme geçirmeye çalıştığında deneyimlediği kısıtlamalardır. İkinci bileşen ise, bireyin ilk deneyimden hissettiği sıkıntı ve rahatsızlık duygularını azaltmak için kullandığı baş etme davranışlarıdır (17).

Bu modelde moral distresin, diğer sağlık çalışanları, hukuk sistemi veya yasal çekinceler, hemşirelik hizmetleri ve hastane idaresi, istihdam sorunları, hastalar ve ailelerin talepleri gibi dış kısıtlamalar ile birlikte işini kaybetmekten korkmak, kendinden şüphe etmek, cesaret eksikliği ve geçmiş eylemlerin yararsız kalması gibi iç kısıtlamalardan kaynaklanabileceği bildirilmektedir (17). Wilkinson'un (1987) moral distres modelinde, hemşirelerin ahlaki bir ikilem ile karşılaştıklarında, hangi eylemin ahlaki açıdan iyi olduğuna karar verirken, bilişsel ahlak ve empati duygularını kullandıkları belirtilmiştir. Ayrıca, Wilkinson hemşirelerin mesleki deneyim düzeyleri ile mevcut seçenekler hakkındaki bilgileri moral distres düzeyini etkileyeceğini öne sürmüştür ancak modelin geliştirildiği yıllarda bu duruma yönelik herhangi bir çalışma olmadığından bu görüşünü destekleyememiştir.

Hemşireler kendi ve hastanın ahlaki bütünlüğü koruma ve iyi bir bakım sunma eğilimindedirler. Ahlaki kararlar verirken kendi profesyonel ve bireysel değerleri yanında kararlarını yönlendiren veya engelleyen çevresel kısıtlamaları, görüşleri, yasa ve yönetmelikleri dikkate almalıdırlar. Ancak hemşireler ahlaki yükü fazla olan durumlara sık maruz kaldıklarında, mevcut durumla etkili bir şekilde başa çıkabilme yetenekleri azalır. Moral distrese bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz başa çıkma davranışları, hasta bakımını olumsuz yönde etkiler. Etkisiz başa çıkma ise hemşirelerin mesleklerini tamamen bırakmalarına ya da hasta bakımının bütünlüğüne ve kalitesine zarar vermelerine neden olabilir (17). Bu doğrultuda, eğer sağlık hizmetini ve bakım kalitesini tehdit eden bir durum varsa derhal incelenmelidir.

Askeri Hemşirelikte Moral Distres Modeli

Fry ve ark., (2002)'ı tarafından geliştirilen modelde, moral distres askeriyedeki hemşireleri etkileyen zorlu çevresel koşullar bağlamında incelenmiştir. Bu modelde moral distres, çatışan değerlerden kaynaklanan bir süreç olarak değerlendirilmiştir. Moral distres süreci hemşirenin ahlaki bir yargı, karar veya eylem ihtiyacını fark etmesi ile başlamaktadır. İlk olarak hemşire durumu değerlendirir ve eyleme geçme konusunda herhangi bir engel ile karşılaşmadığında harekete geçer. Eğer eyleme geçmede engeller varsa, öncül moral distres oluşur ve engeller aşılamadığında ise reaktif moral distres gelişir. Bu durum, Jameton (1993) tarafından tanımlanan moral distres süreci ile paralellik gösterse de, moral distrese neden olan faktörlerin, askeri hemşireler için farklı olduğu bilinmektedir (104).

Fry ve arkadaşları (2002) modeli geliştirirken, yarı yapılandırılmış bir görüşme rehberi kullanmışlardır. Çalışma sonunda askeri hemşirelerin, istenen ahlaki eyleme yönelik engel yaşadıklarında; genellikle bir iş arkadaşına danıştıkları, konuyu daha yüksek rütbeli bir görevlinin dikkatine sundukları ve hastaya en iyi bakımı sunmak için etkili bir şekilde bakımın savunuculuğunu yaptıkları saptanmıştır. Aynı zamanda bu girişimlerin etkili olmadığı bazı durumlarda, yoğun endişe yaşama, hayal kırıklığına uğrama, kızgın olma, uyuşukluk hissi ve üniformayı giymekte güçlük çekme gibi hem kısa hem de uzun vadeli sonuçlar geliştiği bildirilmiştir (104).

Corley'in Moral Distres Modeli

Corley (2002) modelinde, hemşireliğin ahlaki bir uğraş olduğunu ifade etmiş ve hasta savunuculuk rolünü yerine getiremediğinde hemşirede gelişebilecek durumları açıklamıştır. Corley (2002), Jameton (1993)'nin üzerinde durduğu bir kavram olan öncül moral distresi temel almıştır. Bu modelde, bireylerin kurumsal engellerle karşılaştığında ve değerler konusunda çatışma yaşadığında ortaya çıkan hayal kırıklığı, öfke ve kaygıya odaklanmıştır. Corley tarafından geliştirilen model, en fazla kabul gören moral distres modelidir. Literatür incelendiğinde Corley'in modelinin hala geliştirilmekte olduğu, güncel çalışmaların çoğunluğunun bu modeli temel aldığı ve farklı araştırmacılar tarafından da bu modele katkı sağlandığı görülmektedir (42, 105, 106).

Corley (2002)'in teorisi "hemşirelik ahlaki bir meslektir" ve "hemşireler ahlaki temsilcilerdir" olmak üzere iki önermeye dayanmaktadır. Bu önermelere göre bir hemşire karşılaştığı etik durumlarda moral distres deneyimleyebilir ve ahlaki etkinliğini ortaya koyamazsa, yaşadığı moral distrese karşı savunmasız hale gelir (79). Corley (2002), modelini açıklamak için gerekli olan bazı ahlaki kavramlar kullanmıştır. Corley'e göre ahlaki eylem ve ahlaki yetkinliğin gelişmesini etkileyen bu kavramlar moral distres kavramı ile ilişkili ve etkileşim içindedir. Corley'in modeli, kararlılık, duyarlılık, özerklik, anlamlandırma, muhakeme, çatışma, yetkinlik ve kesinlik olmak üzere sekiz ahlaki kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramların birbirleri ile kurdukları etkileşim ve etki, ahlaki davranışa yönelmeye ya da moral distrese neden olabilir (79). Ahlaki kavramlar arasındaki ilişkiler Şekil 3'teki modelde gösterilmiştir.

Ahlaki Kararlılık: Hasta bakımında ahlaki bir durum ile ilgili değerlere sadakat ve risk almaya istekli olmaktır. Ahlaki kararlılık, ahlaki kesinliğin geliştirilmesinden önce veya ahlaki kesinliğin gerçekleşmesinden sonra eylemde görülebilir.

Ahlaki Duyarlılık: Ahlaki bir çatışmayı tanıma, mevcut durumu içeriksel ve sezgisel değerlendirme ve kararın birey adına etik sonuçları hakkında bilgi sahibi olma yeteneğidir.

Ahlaki Özerklik: Etik seçim yapma özgürlüğü, hakkı ve sorumluluğudur. Ahlaki özerkliğe sahip hemşirelerin, ahlaki kararlılıkları ve ahlaki yetkinlikleri olmadıkça moral distres yaşama olasılıkları daha yüksektir.

Ahlaki Anlamlandırma: Ahlaki anlamın yapılandırılmasıdır. Yüksek düzeyde ahlaki kararlılık ve ahlaki yetkinliğe sahip hemşirelerin, bir durumu ahlaki açıdan anlamlandırması daha kolay olabileceği için, daha az moral distres deneyimleme ihtimalleri bulunmaktadır.

Ahlaki Muhakeme: Belirli bir durumda ne yapılması gerektiğini belirlemek için bir eylem tarzına karşılık gelen davranışı ya da sayısız etik düşüncenin birleştirilmesini içerir. Yüksek düzeyde ahlaki kararlılık, ahlaki yetkinlik ve ahlaki anlamlandırma yeteneğine sahip hemşirelerin, uygun ahlaki muhakeme ile daha az moral distres yaşama olasılıkları yüksektir.

Ahlaki Çatışma: Ahlaki açıdan doğru eylemin ne olduğuna ilişkin ahlaki değerlerin çatışmasını içeren bir durumdur. Altı temel özelliği vardır: seçme, savunuculuk, özerklik, acı ve ıstırap, değerler ve ilişki. Seçme deneyimi, hemşirelerin deneyiminin birleştirici temel özelliği olarak kabul edilmektedir. Diğer özellikler ise seçilen kumaşa dokunmuştur. Hemşirelerin hasta savunuculuğu, harekete geçme özerkliklerinin belirsizliği, sınırlı seçeneklerin varlığı, değerlerin ihlali ve acı çeken hastalarla profesyonel bir ilişki varlığı nedeniyle ahlaki çatışmaya maruz kalmaları daha olasıdır.


Ahlaki Yetkinlik: Ahlaki durumları anlama, ahlaki yargı ve iyi niyet kullanma ve ahlaki olarak uygun davranışlarda bulunma becerisidir. Ahlaki kararlılığı olan ancak ahlaki yetkinliği olmayan hemşirelerin moral distres yaşama olasılığı daha yüksektir. Hemşirelerin ahlaki yetkinliklere ilişkin kendi algıları doğru olmayabilir ve ahlaki açıdan uygunsuz eylemlere yol açabilir. Bu nedenle, ahlaki yetkinliğin çerçevesi iyi çizilmelidir.

Ahlaki Kesinlik: Hemşirelerin kişisel ve profesyonel olarak kendilerini bir inancın doğruluğu üzerinde hareket etme riskini almaya yol açan mutlak ahlaki bir inançtır. Yüksek düzeyde ahlaki kararlılık, ahlaki yetkinlik ve ahlaki özerkliğe sahip olan hemşirelerin ahlaki kesinlik hissetme ve daha az moral distres yaşama olasılıkları yüksektir (79).

Bireyin etik bir durum ile karşılaştığında ahlaki cesaret ve ahlaki bir tutumla harekete geçebilmesi, yukarıda bahsi geçen kavramların, birey üzerinde etkileşimlerinin ve ilişkilerinin varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Eğer hemşire

harekete geçmeyi seçmezse ya da kurumsal kısıtlamalar nedeniyle harekete geçemeyeceğini hissederse moral distres yaşar. Bir hemşire ahlaki açıdan ne kadar yetkinse, bireyin etik durumlarda verdiği kararlar ve eylemlerde kendini rahat hissetmesi olarak tanımlanan (107) ahlaki rahatlık (moral comfort) düzeyi yüksek ve deneyimleyeceği moral distres düşük olacaktır (79). Ahlaki rahatlığın yüksek ve moral distresin düşük olması hemşirenin hasta savunuculuğu rolünü desteklemektedir. Ahlaki duyarlılık, hemşirenin etik karar verirken stratejiler kullanma yeteneği ile hastalara olan bağlılığını güçlendirmektedir. Ahlaki duyarlılıkları düşük olan bireyler moral distres yaşamazlar. Duyarlılık ve yetkinliklerini yüksek düzeyde koruyan hemşirelerin ise ahlaki cesaret gösterme olasılıkları oldukça yüksektir. Bu durumda hemşireler moral distresten ziyade ahlaki rahatlıkla sonuçlanan eylemlere yönelirler (79).

Corley (2002)'in ifade ettiğine göre moral distresin hasta, hemşire ve sağlık kurumu üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler “moral distresin etkileri” başlığı altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.



Şekil 3. Moral distres teorisi modeli (79)

2.2.3. Moral Distresin Etkileri

Sağlık hizmetleri, çalışanların zorlanmasına yol açan pek çok faktör barındırmaktadır. (82). Sağlık hizmeti sunumunu ve hemşirelik kültürünü dışsal ve içsel birçok faktör etkilemektedir (108). Bu faktörlerden biri olan moral distresi, AACN 2008’de ciddi bir sorun olarak göstermiştir. AACN’e göre hemşirelerin memnuniyetsizliği ve çalışma ortamında bütünlük olmaması, fiziksel ve duygusal stres yaşamalarına; hemşirelik bakımının niteliğinin, niceliğinin ve maliyetinin etkilenmesine, hatta hemşirelik mesleğini bırakma niyetine kadar gidebilen bir meslek sorunudur (85). Bu konudaki literatür incelendiğinde, moral distresin olumsuz etkisinin hasta, hemşire ve kurum olmak üzere üç düzeyde olduğu görülmektedir.

Hasta Üzerine Etkisi: Moral distres sağlık çalışanları üzerinde etki gösteren bir olgudur. Ancak, sağlık çalışanları üzerindeki etkisinden, hastalar da dolaylı olarak etkilenmektedir. Moral distres hasta boyutunda ele alındığında, hastalarda kendini savunmada eksiklik ve çekingenlik oluşturduğu, bunun sonucunda ise ızdırap seviyelerinde artış olduğu düşünülmektedir (79). Literatürde moral distresin, hastaların yaşadıkları ızdırabın artışına bağlı olarak, hastanede kalış süresinin uzamasına, hastaların özerkliğinin zedelenmesine, hastalara yetersiz ve uygun olmayan bir bakım verilmesine yol açtığı belirtilmektedir (46, 50, 79, 80, 109).

Hemşire Üzerine Etkisi: Moral distres hemşireleri fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel bağlamda etkilemektedir. Corley, moral distresin hemşireler üzerindeki en büyük etkisinin her anlama ızdırap duymak olduğunu ifade etmiş ve sonucunda hemşirelerde kurumdan istifa, tükenmişlik ve hemşirelik mesleğini bırakma eğilimlerinin görüldüğünü belirtmiştir (108). Literatürde moral distresin etkileri üzerine yapılan bazı çalışmalarda, moral distres yaşayan bireylerin kalp çarpıntısı, ishal, baş ağrısı, mide ağrısı, kas ağrısı ve ağlama gibi fiziksel tükenmişlik belirtileri ile birlikte (25, 30, 48, 63, 110), hayal kırıklığı, sinirlilik, suçluluk, güçsüzlük, umutsuzluk, pişmanlık ve anksiyete ile karakterize psikolojik semptomlar yaşadıkları saptanmıştır (111-117). Hemşireler üzerinde bu konuda yapılan bazı çalışmalarda, moral distres yaşayan hemşirelerin acı çekme, gücenme, hayal kırıklığı, keder, anksiyete, çaresizlik, utanç, mahçubiyet, perişanlık, üzüntü, korku ve ızdırap duygularını deneyimledikleri (25, 30, 46, 108, 117-119), hatta bazı hemşirelerin

hastanın yaşadıklarına tanıklık etmelerinden dolayı kabus gördükleri belirtilmiştir (120). Diğer yandan bazı hemşirelerin deneyimledikleri moral distresi tanımlayamamaları nedeniyle stres, duygusal tükenme, iş doyumsuzluğu, yas, bozulmuş mesleki bütünlük ve öz değer kaybı yaşadıkları saptanmıştır (83, 121, 122).

Yapılan bazı çalışmalarda ise, moral distres nedeniyle pozisyonunu terk etmeyi düşünen hemşirelerde moral distres düzeyinin oldukça yüksek olduğu (26, 99, 112, 123), paralel olarak yapılan bir çalışmada hemşirelerin %6,6'nın bir önceki görevinden moral distres nedeniyle ayrıldığı (12, 28, 124-126), hemşirelerde görülen moral distresin tükenme, hasta bakımında hatalı uygulamalar, hastalardan uzaklaşma ve pozisyonu terk etme düşüncesi ile yakından ilişkili olduğu saptanmıştır (30, 110, 127, 128).

Sağlık Kurumu Üzerine Etkisi: Moral distres hemşirelerin kişisel yaşamını etkilediği gibi mesleki yaşamını da etkileyebilir. Dolayısıyla, hasta ve hemşireler üzerindeki etkilerinin yanı sıra kurum üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Kurum içerisinde moral distres kaynaklı sorunlar yaşanması, buna bağlı olarak kurum içi işe alımlarda zorluklar oluşmasına zemin hazırlamaktadır (79). Ayrıca, Avrupa ve Amerika'da moral distresin hemşire üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalarda, işe geç kalma, verimde azalma, iş tatminsizliği, bakım kalitesinde azalma, işten ayrılma niyeti ve istifa gibi sonuçlar kurumu olumsuz yönde etkilemektedir (111, 126, 129). Moral distresin bu etkileri sonucunda yüksek hemşire devrine neden olabilmekte, yoğun bakım, onkoloji, pediatri vb. özellikli birimlerdeki deneyimli hemşirelerin kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Ayrıca, bakımın niteliğinde bozulması ile maliyetin artması ve hasta memnuniyetinin azalması da görülmektedir (80).

2.2.4. Moral Distresi Önleme

Son dönemde literatürde moral distresi azaltmaya ve önlemeye yönelik öneriler sunan çalışmalara rastlamak mümkündür. Bu çalışmalar sayı ve nitelik oldukça sınırlı olsa da moral distresin önlenmesine yönelik önerilen modellerin bireysel ve kurumsal boyutlar içerdikleri görülmektedir. Moral distresin tanımı ve neden olan faktörleri düşünüldüğünde, hem bireysel hem de kurumsal yaklaşımların önemi yadsınamaz (52, 99, 130).

Moral distres genellikle, konuşulmayan, hatta kişinin kendi kendine bile itiraf etmesi zor bir durum olduğu için moral distresi, açığa çıkarmak hatta konuşulabilir kılmak bile oldukça zordur. Bu nedenle moral distresin önlenmesinde ilk adım, yaşanan durumun ifade edilmesi ve konuşulabilir hale gelmesidir. Yaşanılan moral distresin ifade edilebilmesi için kurumsal boyutta bir zemin hazırlanması gerekmektedir. Bireylerin kendilerini ifade edebileceği bir ortam hazırlanmalı ve çözüm üretilebilecekleri multidisipliner bir yaklaşım önerilmektedir (41, 46, 125). bireysel mücadelede ise hemşireler, moral distresle ilişkili durumları çözümleyebilmeleri için mesleki yaşamlarında moral distres belirtilerini tanımları, moral distres kaynaklarını belirleyebilmeleri ve moral distresin istenmeyen sonuçlarını azaltabilecek stratejileri öğrenmeleri son derece önemlidir.

AACN, 2008 yılında, moral distresin önlenmesini öncelikli bir hedef kabul ederek, moral distresi ele alma konusunda öneriler sunmaktadır (85). AACN, moral distresi önleme ve azaltma için bakım ortamlarında uygulanmak üzere 4A yaklaşımını önermektedir ve Epstein ve Hamric bu yaklaşımı ilişkin tanımları bulunmaktadır:

Ask (Sor); Bu aşamada, moral distres ve etkilerinin farkına varılmaktadır. Moral distresin tanımını ve semptomlarını gözden geçirme ve hissedilen durumun moral distres olup olmadığını sorgulama aşamasıdır. Bu aşamanın amacı, moral distresin var olduğunun farkına varmaktır. Moral distres bireyin ahlaki bütünlüğünü ve benlik duygusunu tehdit ettiğinden dolayı bireyin fiziksel, duygusal, davranışsal ve ruhsal esenliğini etkiler ve ızdıraba neden olur. Bu nedenle yaşanan durumun sorgulanması ve fark edilmesi önemlidir.

Affirm (Doğrula); Yaşanan durumla ilgili hissedilen duyguyu, ızdırabı ve distresi doğrulayıp, bu durumun moral distres olarak kabul edilme aşamasıdır. Bu aşamanın amacı, moral distresin azaltılmasına yönelik bir girişimde bulunulacağına taahhüt edilmesidir. Bu doğrultuda, profesyonel destek alınması veya yakın çevre ile yaşanan distresin konuşulması önerilmektedir. Moral distresin tanımlanması duruma müdahale edilebilmesi açısından önemli bir adımdır. Bu açıdan, ilk olarak bireyin ahlaki bütünlüğünün hangi yönden tehdit altında olduğu sorgulanması gerekmektedir.

Assess (Değerlendir); Moral distresin kaynağının belirlendiği aşamadır. Hangi koşullar altında belirtiler ortaya çıkıyor? Diğer bireyler bu durumdan dolayı moral

distres yaşıyor mu? Kaynaklar çevresel mi, bireysel mi? Moral distres kaynağı ortadan kaldırılabiliyor mu? Yaşadığım moral distres hangi düzeyde? vb. gibi sorular aracılığıyla, birey kendinde var olan moral distresin kaynağını ve düzeyini belirler. Değerlendirme süreci, moral distresin azaltılmasına yönelik uygulanacak doğru eylemin seçilmesinde yol gösterici olmaktadır.

Act (Harekete Geç); Bu aşamada, iç ve dış engeller ele alınarak, belirlenen riskler azaltılmaya ve hemşirenin güçlendirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda geliştirebilecek ya da geliştirilebilen yeni stratejiler üzerinde düşünmelidir. Hemşirenin, kaynağı, türü ve düzeyi belirlenen moral distrese yönelik bir strateji oluşturduktan sonra, bu stratejinin mümkün olduğu düzeyde uygulamaya geçirmesi önerilmektedir. Bu aşamanın amacı bireyin güçlendirilmesi ve eksiklerin giderilerek mevcut durumla baş etmesini sağlamaktadır (37, 85).

Rushton ise, 4A modeli ile paralel bir görüş sunmuş ve bu modelde ye alan aşamaların sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için aşağıdaki sorular yardımcı olabileceğini öne sürmüştür. Bunlar:

- Sizce yapılması gereken “doğru” eylem nedir ve bu durum neden doğrudur?
- Şu anda ne yapılıyor ve neden yapılıyor?
- Bu olaydaki veya durumdaki kişiler kim?
- Bu durumla ilgili harekete geçmeye hazır mısınız?
- Uygulanacak doğru eylemi seçtin mi?
- Bir eylem planı hazırla ve uygula (131).

AACN'nin 4A yaklaşımı başlangıçta yoğun bakım ortamları için tasarlanmış olsa da, diğer bakım ortamlarına adapte edilebilir ve uygulanabilir bir özelliğe sahiptir. Bu modelde göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, bulunan çözümün geçici bir çözüm olmamasıdır. Bu model, kurum temelli yeni politika ve uygulamalar geliştirerek, gelecekte moral distrese neden olabilecek, yaşanması muhtemel durumların önüne geçme potansiyeline sahiptir. Ancak elde edilen sonucun kalıcılığının ve genellenebilirliğinin sağlanabilmesi için yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması da son derece önemlidir (30).

Her ne kadar moral distresi önlemede yasal düzenlemeler önerilse de geniş kapsamlı bir politika ve düzenleme geliştirmek her zaman mümkün olmamaktadır.

Mümkün olduğunda ise bu önlemlerin hayata geçirilmesi hem zaman almakta hem de bazı düzenlemeler bürokratik engellere takılabilmektedir. Bu nedenle, moral distresi önlemede, kurum temelli çözümler ön plana çıkmaktadır. Etik komisyonlar/merkez, kurum temelli çözümlerin en yaygın örneğidir ve moral distres çözümünde etkili olabilmektedir. Bu komisyonlar, özellikle gerekli politikaların geliştirilemediği ya da çözümün süreç gerektirdiği durumlarda işlevsel olması açısından önemlidir. Bu komisyonların/merkezin en iyi örneği Amerika Virginia'da bulunan Moral Distres Danışma Merkezi (Moral Distress Consult Service) dir. Merkez, etik merkez şeklinde çalışmakta fakat burada etik sorunlardan daha çok kişilerin yaşadığı moral distres üzerine odaklanılmaktadır. Merkez temel olarak moral distresin konuşulabilmesi ve çözümleri üzerine çalışmaktadır. Bu nedenle merkezde bireysel ve grup odaklı görüşmeler yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü zaman ise konu, birim yöneticileri ile birlikte kurumun etik komisyonuna gönderilmekte ve çözüm yolu aranmaktadır (99). Bu merkez sayesinde moral distrese neden olan sorunlar açığa çıkmakta ve yaşanan sorunlar incelenmektedir. Bu şekilde bireylerde oluşan ve oluşabilecek moral distres sorunlarının önüne geçilebildiği düşünülmektedir (46).

Kurumsal boyutta gerçekleştirilen müdahaleler, moral distresin önlenmesi ve azaltılmasına önemli derece de katkı sağlar. Ancak kurumsal müdahalelerin, bireysel müdahalelerle desteklenmesi çok daha etkili sonuçlara yol açmaktadır. Bireysel müdahaleler, kendini tanıma, moral distrese neden olan olayı ve kendi üzerindeki etkilerini tanımlayabilmedir. Ayrıca duruma yönelik baş etme mekanizması geliştirilmeye odaklanılmalıdır (40, 132). Bireysel olarak, mesleki bilgi ve becerinin geliştirilmesi yoluyla yaşanan moral distresin azaldığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (38). Ayrıca çalışanların, moral distres ile ilgili eğitim alması ve etik konulara yönelik yeterliliklerinin artırılması da moral distres ile bireysel baş etmede önemli bir faktör olarak görülmektedir (38, 48). Konuyla ilgili olarak Beumer (2008), moral distresi azaltmaya yönelik yaptığı workshop çalışmasının sonucunda, katılımcıların moral distres seviyelerinde azalma olduğunu belirtmiştir (133). Hamaideh (2014), psikiyatri hemşireleri ile yaptığı çalışmada, moral distres workshopuna ve eğitimlere katılan hemşirelerin, eğitim sonrası daha az moral distres yaşadıklarını bulmuştur (39).

Moral distrese neden olabilecek bireysel ve kurumsal pek çok faktörün ortadan kaldırılması ile moral distressin olumsuz sonuçları engellenebilir. Bununla birlikte kurumların oluşturduğu sağlıklı çalışma ortamlarının güçlendirilmesi, yöneticilerin bu konuda duyarlılıklarının artırılması, moral distrese neden olabilecek kurumsal faktörlere yönelik güvenilir çözüm önerilerinin getirilmesi ve politikaların geliştirilmesi sağlık çalışanlarının moral distress yaşamasını engelleyebilir. Ahlaki bir mesleğin üye ve ahlaki temsilciler olarak hemşireler, moral distressin tetikleyicilerini tanımlamayı, önleme stratejileri geliştirmeyi ve ahlaki ikilemlerle yüzleşmek için kendilerini güçlendirmeyi öğrenmelidirler. Moral distressin tanımı ve neden olan faktörleri düşünüldüğünde, mücadelede hem bireysel hem de kurumsal yaklaşımların bir arada yürütülmesi gerektiği görülmektedir (52, 79, 99, 130).

2.2.5. Moral Distressin Değerlendirilmesi

Moral distressin değerlendirilmesiyle ilgili uluslararası literatür incelendiğinde ölçme çalışmalarının neredeyse tamamının Corley'in çalışmalarını dayandığı görülmektedir. Moral distressi ölçmek için ilk çalışma Corley ve ark. tarafından 1994 yılında tek maddelik görsel bir analog ölçek kullanılmasıyla başlatılmıştır (50). Daha sonra bu görsel analog ölçek yine Corley tarafından 1995'te bir değerlendirme sonucunda Moral Distress Scale (Moral Distress Ölçeği) olarak geliştirilmiştir (130). Ancak bu ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmamıştır.

Geçerlik ve güvenilirlik çalışmasının yapıldığı ilk gereç (MDS:moral distress scale) Corley (2001) tarafından yoğun bakım hemşireleri üzerinde çalışılmıştır. Bu ölçeğin yoğun bakım hemşirelerinde moral distress düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur (50). MDS yine Corley tarafından 2005 yılında ağrı yönetimini, sağlık personelinin bakımını ve yetkinliğini içeren 6 madde daha eklenerek yeniden geliştirilmiştir (108).

MDS'nin hastanelerde farklı ünitelerde ve farklı ülkelerde olmak üzere geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Asker hemşirelerinde, anestezi uzmanı hemşirelerinde (134), yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşirelerinde (26), onkoloji ve hematoloji ünitesi hemşirelerinde (94) ve yoğun bakım ünitesi hemşirelerinde (52) farklı versiyonları değerlendirilmiştir. Ohnishi ve ark. (2010) ise, Corley (2005)

tarafından geliştirilen ölçeği temel alarak psikiyatri hemşirelerinin moral distres düzeylerini belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirmiştir (25).

MDS, Hamric ve ark. (2012) tarafından, zamana uygun olmadığı düşünüldüğü için bazı maddeler çıkarılarak ve diğer maddelerde de düzenlemeler yapılarak yenilenmiştir (37). Ayrıca bu çalışma ile birlikte ölçeğin, hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanları ve bunların pediatri uyarlamalarını içeren, altı paralel formu geliştirilmiştir. Hamric ve ark. (37) tarafından çşılan bu ölçek ve formları literatürde en yaygın kullanılan ölçüm gereçleridir.

Wocial ve Weaver (2012) ise “Moral Distres Termometresi”ni geliştirmişlerdir. Hemşirelerin son iki hafta içinde yaşadıkları moral distres seviyelerinin sıklığını, rahatsızlık düzeyini ve nedenlerini belirlemek için termometre üzerinde moral distresin seviyesine göre 0 ile 10 değer aralığında işaretleme yapmaları istenmiştir. Çalışma sonucunda bu termometrenin moral distresi ölçmek için destekleyici, uygulanması kolay, görsel analog tipte bir ölçüm aracı olduğu belirtilmiştir (51). Ancak, katılımcıların bu ölçüm aracının moral distrese neden olan durumları tanımla konusunda işlevsel olmadığına yönelik eleştirileri bulunmaktadır (42).

Ülkemizde ise, Karagözoğlu ve ark. (2017) tarafından Hamric ve ark. (2012) tarafından revize edilen ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış ve geçerli bulunmuştur (52). Moral distresin ölçülmesini de içeren hemen hemen tüm çalışmalarda Corley ve ark. (2005) tarafından geliştirilen moral distres ölçeği ya da Hamric ve ark. tarafından oluşturulmuş sağlık profesyonelleri moral distres ölçekleri kullanılmaktadır.

2.2.6. Pediatri Hemşirelerinde Moral Distres

Moral distres kavramı ile ilgili ilk çalışmalar sağlık profesyonelleri arasında hemşirelerle yapılmıştır. İlk çalışma alanı ise, en sık etik durumlarla karşılaşılan kliniklerden biri olan yoğun bakım üniteleridir. Ancak zamanla günlük pratikte etik durumlarla sıkça karşılaşılan pediatri, onkoloji, psikiyatri ve acil servislerde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (89, 135-137). Literatür incelendiğinde yetişkin hasta bakımı veren hemşirelerde moral distres deneyimi daha çok çalışıldığı görülmektedir. Ancak

son yıllarda çocuk hastalara bakım veren pediatri hemşirelerinin deneyimlediği moral distres yönelik çalışmalar artmaktadır. Literatürde, pediatri alanında moral distrese yoğunlaşan çalışmalar, diğer sağlık hizmet alanlarında yapılan çalışmalara benzer şekilde, çoğunlukla tedavi edici hizmetler ve hemşireler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmalarda, nitel modelin sıklıkla tercih edildiği görülmektedir (28, 29, 34, 35, 88, 115, 138-140). Larson ve ark. (2017) Kanada’da pediatri ve neonatal hemşireler ile yaptığı çalışmada moral distres düzeyleri yüksek bulunmuştur (35). Yapılan bir diğer çalışmada ise pediatri hemşirelerinin moral distres skoru 63 iken, yetişkin hemşirelerinin moral distres skoru 47 olarak bulunmuştur (34).

Pediatri kliniklerinde karşılaşılan etik konuların yetişkin kliniklerinde karşılan etik durumlar ile ortaklaştığı alanları olması karşın farklılıkları bulunmaktadır. Pediatri kliniklerinde en sık karşılaşılan durumlar; çocuklardan bilgilendirilmiş onam almada özerklik etik sorunları; bakım ile ilgili kararlarda yaşanan etik sorunlar, pediatri yoğun bakımlarında yaşanan etik sorunlar ve zarar vermeme-yarar sağlama etik ilkesinde yaşanan etik sorunlar başlıkları altında toplamak mümkündür (141).

Bahsi geçen etik sorunların ortaya çıkmasının en temel nedenlerin biri, aşına olunan sağlık çalışanı-hasta-hasta yakını ilişkisinin çocuk hasta söz konusu olduğunda farklılaşması ve çocuğun ebeveynlerinin karar sürecindeki baskın varlığıdır. Tedavi ve bakım sürecinde sağlık çalışanlarının, çocuğun ve ailenin, tedavi ve hastalığa yönelik kaygı ve endişeleri tamamen birbirinden farklıdır. Bu nedenle çocuklar, ebeveynlerinin, sağlık personellerinin ve kendi isteklerinin arasındaki çatışmalara maruz kalabilmekte, bu da pediatri kliniklerindeki bakım alanında etik sorunlara neden olabilmektedir (28). Ayrıca, yetişkin hasta bakımında iletişim hasta birey ile sağlık ekibi arasındadır. Hasta birey tedavi sürecine doğrudan katılabilir veya en azından tedavi süreciyle ilgili kaygılarını dile getirebilir veya anlaşmazlıklarını ifade edebilir (28). Bununla birlikte, pediatri kliniklerinde çocuklara bakarken iletişim çocuk, ebeveynler ve sağlık ekibi arasındadır. Bazı durumlarda, ebeveynlere yalnızca terapötik stratejilerin belirlenmesinde danışılabilir ve çocuğun tercihleri dikkate alınmaz (30).

Literatür incelendiğinde, çocuklara yönelik bakımın farklı doğası göz önüne bulundurularak, yenidoğan ve pediatri kliniklerinde moral distrese yönelik

çalışmaların yapıldığı görülmektedir (28, 30, 33-35, 94, 139, 142). Bu çalışma sonuçlarına dayanarak pediatri kliniklerinde moral distrese yol açan etmenler, literatürde yer aldığı şekilde dışsal (kurumsal), klinik ve bireysel faktörler olmak üzere üç ana kategoride verilecektir (46, 50, 79). Dışsal faktörler moral distresin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan, politik, idari ve kurumsal faktörleri işaret ederken, klinik faktörler orada yürütülen sağlık hizmetlerinin doğası ile ilişkilidir. Bireysel faktörler ise, hizmet vericiler ve hizmet alıcılara yönelik bireysel, kültürel, değer ve kişilik farklılıklarını tarif etmektedir.

Dışsal faktörler: Dışsal faktörlerin moral distres ile ilişkisi, 1984 yılında, Jameton tarafından yapılmış olan tanımında açıkça ortaya konmuştur. Hatta Jameton moral distrese yol açan birincil faktörü “politik, idari ve kurumsal yapının, duruma uygun eylemin uygulanmasını engellemesi” olarak belirtmiştir (46, 50). Literatürde, moral distresin politik, idari ve kurumsal yapının, hasta ve çalışanların isteklerine yanıt vermediği, finansal kaygının ön planda olduğu, kurumun ihtiyaçlarının öncelikli olarak ele alındığı, güç dağılımının dengesiz ve görev tanımının belirsiz olduğu, yeterli sağlık çalışanının istihdamının yapılmadığı, dolayısıyla da bakımda niteliğin sağlanamadığı sağlık sistemlerinde yaşanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (40, 80, 88, 143). Ayrıca, sağlık sistemi içinde bulunan hiyerarşi, meslek içi ve meslekler arası çatışmaların da moral distres nedeni olabileceği bilinmektedir (25, 37, 39, 48, 50, 138, 143, 144). Özetle, belirtilen bütün bu olumsuz durumlar sonucunda, bakımından sorumlu olduğu kişilerin gerekli bakımı alamadığını ve acı çektiğini görmek de sağlık çalışanlarının moral distres yaşamasına neden olmaktadır (40, 48, 145).

Klinik faktörler: Bakım alan hasta grubunun özellikleri, yürütülen sağlık bakım uygulamaları, uygulanan tedaviler ve kliniğin yapısı, sağlık çalışanlarındaki moral distres düzeyini etkilemektedir (37, 48). Özellikle pediatrik onkoloji ve pediatri yoğun bakım kliniklerinde hizmet veren sağlık çalışanları, diğer kliniklerde çalışanlara oranla daha yüksek moral distres yaşamaktadır (35, 87). Literatür incelendiğinde, agresif tedavi yöntemleri ile hayatı uzatmak (36, 52, 90, 143), ekip içi yetersiz iletişim (52, 143), gereksiz/faydasız tedavi (36, 37, 52, 143), bakım için yetkin olmayan kişiler ile çalışmak (52), hasta otonomisini göz ardı etme (25, 39, 143), ve hasta ve ailelere boş umut verme (138) durumlarının moral distresle ilişkili olduğu görülmektedir.

Bireysel faktörler: Moral distrese neden olan bireysel faktörlere yönelik araştırma sonuçlarının farklılık gösterdiği görülmüştür (25, 39, 45, 48). Moral distres düzeyi ile sosyodemografik özellikleri inceleyen çalışma sonuçlarına göre, yaşlı hemşireler, daha fazla hemşirelik deneyimi olan hemşireler ve şu anki pozisyonlarında daha uzun süre çalışan hemşirelerin daha sık moral distres deneyimlediği görülmektedir. Rice ve ark. (146) yoğun bakımda çalışan hemşirelerde yaptığı çalışmada, yaşlı hemşirelerin daha yoğun moral distres yaşadığını, ayrıca, moral distres yoğunluğunun, yıllarca süren hemşirelik deneyimi ve mevcut pozisyonda kalma süreleri ile arttığını belirlemişlerdir (146). Cavaliere (2010) yenidoğan yoğun bakım hemşireleri ile yaptığı çalışma da yaş, hemşirelikteki çalışma yılları, yenidoğan yoğun bakımdaki çalışma yılları ile moral distres sıklığı veya yoğunluğu arasında zayıf bir ilişki bulunmuştur (26). Moral distresin düzeyi ile sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyle ilgili olarak, hemşirelerin yaşlandıkça daha az yoğun moral distres yaşadıklarını ifade eden çalışmalar da bulunmaktadır (33). Bununla birlikte, diğer çalışmalarda, moral distres sıklığı ile yaş, meslekte çalışma yılı, cinsiyet veya eğitim arasında anlamlı bir ilişki bulunmayan çalışmalarda mevcuttur (115, 125). Meltzer ve Huckabay, lisans derecesi veya daha yüksek dereceli hemşirelerin, tıp fakültesi durumlarıyla karşı karşıya kaldıklarında, bir lisans derecesine sahip hemşirelere göre daha yüksek bir moral distres yaşadıklarını bulmuşlardır (147).

Moral distres ile ilgili bireysel özellikler sosyodemografik özellikler dışında subjektif özellikler olarak nitelendirilen, sağlık çalışanlarının değerleri, problem çözme becerileri, baş etme becerileri, kendilerini bir birey ve bir sağlık profesyoneli olarak algılama şekilleri bağlamlarında da incelenmiştir (148). Sağlık çalışanının dünya görüşü, bakım algısı, kültürü, ahlaki duyarlılık düzeyi, etik algısı gibi kişiden kişiye değişim gösteren faktörler moral distres seviyesini etkilemektedir (99, 148). Austin (2005), moral distresin öznel bir yaşantı olduğunu belirtmiştir. Moral distres yaşantısı kadar, moral distrese verilen tepkiler de kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

2.3. Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği (KLPH) ve Moral Distres

Moral distres hemşireleri fiziksel, psikolojik ve ruhsal anlamda olumsuz bir şekilde etkileyebilmekte ve hemşirelerde öfkeden depresyona gidebilen bir tabloya neden olabilmektedir (30, 128, 149). Sonuçta, hemşirelerde güçsüzlük, depresyon, iş verimin azalma, iş tatminsizliği ve işi bırakmaya neden olabilmektedir (46). Bu doğrultuda moral distresin tanınması, önlenmesi ve moral distrese yönelik farkındalığın artırılması, moral distresin önlenemediği durumlarda ise moral distresin etkilerini ile nasıl baş edilebileceğine yönelik çalışmalar yapılması, kısaca ifade etmek gerekirse, hemşirelerin ve kurumun profesyonel olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, psikiyatri hemşireliğinin bir üst uzmanlık olanı olan Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği (KLPH)'ne büyük rol düşmektedir.

KLPH, temelde fiziksel fonksiyon bozukluğu nedeniyle sağlık bakım sistemine giren hastaların ve ailelerin, primer koruma, tedavi, bakım ve rehabilitasyona kadar uzanan yelpazede ortaya çıkan “emosyonel, felsefi, gelişimsel, bilişsel ve davranışsal” tepkilerini, ruhsal ve psikososyal sorunlarını tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra liyezon hizmetleri ile sağlık ekibi içinde ve kurumda etkili iletişim ve işbirliğinin sağlanması, sağlık çalışanlarına etkili baş etme becerilerinin kazandırılması ve psikososyal destek sağlanması da KLP hemşirelerinin çalışma alanlarındandır (150) Moral distres bağlamında, KLPH'nin klinik ve eğitim ve işbirliği rolleri önem kazanmaktadır. Bu roller içerisinde yer alan KLPH'nin spesifik alanlarda danışmanlık becerisi, problem çözme, destekleyici psikoterapi ve cesaretlendirme gibi becerilerini kullanarak, birey, ekip veya grup odaklı bir şekilde hemşirelerin yeni rollerine uyum sağlama, iş stresi ve psikolojik gereksinimlerini tespit ederek çeşitli müdahalelerde bulunabilmektedir. Bunun yanı sıra KLPH, sadece hemşire odaklı değil sistem odaklı da çalışabilmektedir (151). Bu doğrultuda, KLPH sağlık kurumu yöneticileri ile çalışarak, ruh sağlığı temelli sağlık çalışanlarının farkındalıklarını ve baş etme mekanizmalarını güçlendirebilecek çeşitli programlar planlayarak müdahalelerde bulunabilmektedir (152). KLPH'nin bu çalışma alanları 2011 yılında kabul edilen hemşirelik yönetmeliğinde de açıkça belirtilmiştir. Hemşirelik yönetmeliği (2011)'nde KLPH görevleri arasında; Bakımın etkinliğini azaltan, sistemin işlemesine engel olan

nedenleri ortaya çıkarmak, ortadan kaldırmak ya da değiştirmek için çaba göstermek, Genel hastanede çalışan hemşirelerin yaşadığı iş stresi-problemi hakkında duygularını ifade etmesine ve problemlerini çözmelerine yardımcı olur, sağlık elemanlarına destek olur, destek grupları oluşturur ve sürdürmek, Hemşirelerin mesleki benliği, kişisel benlik saygılarını, girişimciliğini artırmak için gerekli terapötik grup çalışmalarını planlamak, Değişim, çatışma çözümü ve diğer personelle ilgili konularda yönetsel danışmanlık hizmeti vermek yer almaktadır (153).

KLPH, moral distressi önleme ve baş etmede önemli sorumlulukları bulunmaktadır. KLPH yardımıyla, bireysel ve kurumsal düzeyde sistem odaklı müdahaleler planlanarak, moral distressin ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve bu kazanımların sürekliliğinin sağlanması mümkün olabilir.

2.4. Ölçek Uyarlama Çalışmalarında Geçerlik ve Güvenirlik

Ölçekler tutum, davranış ve benzeri özellikler gibi doğrudan ölçülemeyen özelliklerin bazı teorik temellere dayandırarak dolaylı yoldan ölçülmesini sağlayan ölçüm araçlarıdır (154). Ölçek uyarlama çalışmaları, ölçeklerin farklı kültürden uyarlanmak istenen kültüre, dil, anlam ve psikometrik özellikler açısından ne kadar uyumlu olduğunun değerlendirildiği bir süreçtir. Ölçek uyarlaması çalışmalarında ölçeğin geçerli ve güvenilir özellikte olduğunun gösterilmesi gerekmektedir (155). Ölçeğin, geçerliği ve güvenirligi test edilirken, birçok uygulama ve analiz yapılmaktadır. Eğer bu analizler ve uygulamalar gerektiği şekilde yapılmaz ise ölçeğin kullanımı sırasında önemli hatalar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle geçerlik ve güvenirlilik bir ölçme aracıda bulunması gereken en önemli psikometrik özelliklerdir ve çalışmanın raporlanma aşamasında her iki özelliğin bir arada verilmesi gerekmektedir (156).

2.4.1. Geçerlik

Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği/değişkeni başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru ölçebilme derecesi olarak tanımlanmaktadır (154, 157). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında, geçerliğin belirlenmesine yönelik çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler; dil geçerliği, kapsam geçerliği,

görünüş geçerliği, ölçüt geçerliği ve yapı geçerliği olarak sınıflandırılmaktadır (157-159).

i. Dil Geçerliği

Ölçme aracı geliştirildiği mevcut dilden başka bir dilde kullanılacak ise öncelikle ölçeğin dil ve kültür uyumluluğunun sağlanabilmesi için çeviri yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, ölçek uyarlama çalışmalarında ilk aşama olarak yabancı dilde geliştirilen ölçeğin dil geçerliği sağlanır (160). Dil geçerliği aşamasında çeviriler yapılırken, yabancı dildeki ölçeğin maddelerinin anlam, yapı ve amaçlarının kaybolmaması için dikkatli bir şekilde yürütülmesine özen gösterilmelidir. Ek olarak, çevrilen dilin kültürel özellikleri, dil ve anlam özellikleri göz önünde bulundurularak, çeviri yapılan dilde karşılığı olmayan ifade ve maddelerin ölçekten çıkarılması önerilmektedir (155). Bu nedenle ölçek uyarlama çalışmalarında, çevirilere katkı sağlayacak uzmanların niteliğine önem verilmelidir (161). Dil geçerlik aşamasında çevirileri istenen uzmanların, hem ölçeğin orijinal diline ve kültürüne hem de çevrilen dile ve kültüre hakim olması, her iki dili de akıcı bir şekilde konuşabilmesi ve ölçeğin ölçtüğü özellik veya kavram hakkında belirli bir düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir (157, 161).

Literatürde çeşitli dil geçerliği yöntemleri kullanılmakla birlikte, dil geçerliğinin sağlanmasında en sık kullanılan yöntem çeviri-geri çeviri yöntemidir. Bu yöntemde, öncelikle ölçeğin mevcut dilinden, çeviri yapılan dile çevirisi gerçekleştirilmeli, daha sonra tekrar ölçeğin mevcut dile çevirisi yapılmalıdır. Sonraki aşamada ise çevirisi tamamlanan ölçek, araştırmacı tarafından anlam ve yapı açısından incelendikten sonra hem mevcut dilin hem de çeviri yapılan dilin uzmanları tarafından dil bilgisi açısından gözden geçirilerek, gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmelidir. Bu aşamalar sonucunda ölçeğin dil geçerliği tamamlanmış olmaktadır (162).

ii. Kapsam Geçerliği

Kapsam geçerliği, bir ölçeğin bütününe ve ölçekte yer alan her bir maddenin, ölçme amacına hangi derecede hizmet ettiğini belirlemede kullanılmaktadır. Kapsam geçerliği mantık ve/veya istatistiksel olarak iki farklı uygulama ile değerlendirilebilmektedir (160). En sık kullanılan uygulama, kapsam geçerliği

değerlendirilmesinde ölçülmek istenen kavram hakkında ve ölçek geçerlik ve güvenilirliği konusunda bilgisi olan, alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmasıdır. Görüşü istenen uzmanlardan, ölçekteki her bir madde için maddenin uygunluğunu değerlendirmesi ve gerekli önerilerde bulunması istenir. Aynı zamanda kapsam geçerliğinde, değerlendirilen maddelerin anlaşılma durumu ve kültüre uygunluğu uzmanlarca incelenmektedir (162). Maddelerin uygunluğunun hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde farklı derecelendirme teknikleri kullanılmaktadır.

Davis Tekniği

Davis tekniği, kapsam geçerliğinin değerlendirmesinde en az beş en fazla 40 uzman görüşüne başvurulmasını önermektedir (163). Davis tekniğinde 4'lü derecelendirme kullanılmaktadır. Bu derecelendirme yöntemi ile uzmanlardan görüşlerini (1) “madde uygun değil”, (2) “maddenin uygun şekilde getirilmesi gerekiyor.”, (3) “uygun ancak ufak değişiklik gerekiyor” ve (4) “madde uygun”, şeklinde belirtmeleri istenmektedir. Uzmanların gözden puanlama ve değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra “madde uygun” ve “madde hafifçe gözden geçirilmeli” seçeneklerini işaretleyen uzman sayısı dikkate alınarak, kapsam geçerlik oranı (KGO) ve kapsam geçerlik indeksi (KGİ) değerleri analiz edilir (155).

Lawshe Tekniği

Lawshe tekniğinde ise, 3'lü derecelendirme; (1) “madde hedeflenen yapıyı ölçüyor”, (2) “madde yapı ile ilişkili ancak gereksiz” ve (3) “madde hedeflenen yapıyı ölçmez” biçiminde uzman görüşlerine sunulmaktadır. (Thorndike, 2017). KGO ve KGİ hesaplanmasında “madde hedeflenen yapıyı ölçüyor” seçeneği işaretleyen uzman sayısı dikkate alınmaktadır (155).

Kapsam Geçerlik Oranı (KGO) ve Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ)

Davis ve Lawshe tekniği sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel açıdan değerlendirilmesinde KGİ ve KGO kullanılmaktadır (157). KGO her bir madde için hesaplanırken, KGİ ölçeğin bütünü için hesaplanmaktadır. KGO hesaplanmasında dikkate alınan uzman sayısında farklılık olmakla birlikte hesaplama formülü sabittir. KGO hesaplanırken Davis tekniğinde “madde uygun” ve “madde hafifçe gözden

geçirilmeli” seçeneklerini işaretleyen uzman sayısı, Lawshe tekniğinde ise “madde hedeflenen yapıyı ölçüyor” seçeneği işaretleyen uzman sayısının, toplam uzman sayısına oranının 1’den çıkarılması ile elde edilmektedir (164). KGO sınır değerleri uzman sayısına göre değişiklik göstermektedir. Sınır değerlerinin altında kalan maddelerin kapsam geçerliğini olumsuz etkileyeceği için bu maddelerin ölçekten çıkarılması önerilmektedir (159). Davis tekniği; KGO düşük olan maddelerin çıkarılmasında KGİ değerini belirleyici olması gerektiğini ve KGİ değeri 0.80’nin üzerinde ise maddelerin çıkarılmamasını önermektedir (163).

KGİ ise, her bir madde için hesaplanan KGO oranlarının toplamının, toplam madde sayısına oranlanması ile elde edilmektedir. Literatürde, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede, uzmanların yaklaşık %80’ninin maddeyi uygun kabul etmesinin yeterli olduğu belirtilmektedir (165). Ancak en çok kabul gören yaklaşım, .80-1 arasında olması gerektiği yönündedir (157, 166).

Kapsam geçerliğinin değerlendirilmesinde diğer bir yol, aynı kapsamı ölçtüğü bilinen geçerlik ve güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçek ile arasındaki korelasyonunun hesaplanmasıdır. Ancak bu durumda aynı kapsamı ölçen bir ölçek bulunurken, yeni ölçek için farklı ya da üstün özellik taşıdığı düşünülüyorsa uygun bir yaklaşım olarak görülmemektedir (159).

iii. Görünüş Geçerliği

Görünüş geçerliği, literatürde yüzey geçerliği ve yüzeysel geçerlik isimleriyle de kullanılmaktadır. Literatürün bir kısmında kapsam geçerliğinin bir alt başlığı olarak kabul edilse de aslında ayrı bir geçerlik türüdür (158). Görünüş geçerliği, ölçme aracının ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmesi olarak tanımlanabilmektedir (158). Bu açıdan, görünüş geçerliği, ölçeğin içeriğinden ve kapsamında ziyade neyi ölçüyor olarak görüldüğüyle ilgilenmektedir. Değerlendirilmesinde ise, sayısal ve istatistiksel bulgulardan çok mantıksal kanaatler doğrultusunda bir yorum yapılmaktadır.

Görünüş geçerliğinde, ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı yapıyı ne düzeyde ölçüyor görünmesinin incelenmesi ile birlikte ölçme aracının şekilsel yönden düzgünlüğü de değerlendirilmektedir. Katılımcıların şekilsel anlamda iyi dizayn edilmemiş ölçeklerde cevaplama isteğinde düşüklüğe sebep olduğu belirtilmektedir

(155). Bu doğrultuda, ölçek maddelerinin yanı sıra ölçeğin ismi, açıklamaları, maddelerin ve ölçeğin düzeni gibi faktörler değerlendirilmektedir. Literatüre göre, görünüş geçerliğinin değerlendirilmesinde uzman görüşü ve/veya araştırma örneklemini temsil eden küçük bir gruba ön uygulama yapılması önerilmektedir (159).

iv. Ölçüt Geçerliği

Ölçüt geçerliği, ölçüm sonuçlarının belirlenen bir ölçeğe ait ölçüleri ne derecede yansıttığını belirlemede kullanılan bir geçerlik türüdür. Başka bir deyişle ölçüt geçerliği, bir ölçek aracılığıyla elde edilen sonuçlar ile başka bir ölçek ile elde edilmiş sonuçların karşılaştırılması esasına dayanmaktadır (158). İki yaygın kullanılan türü bulunmaktadır.

İlk türü uyum geçerliğidir. Bu geçerlik türünde daha önceden geçerli ve güvenilir olduğu bilenen bir ölçme aracı ile maliyet, zaman ve pratiklik açısından daha iyi olan yeni bir ölçme aracının sonuçlarının, korelasyon katsayılarından yararlanılarak, uyumunun değerlendirilmesidir (157).

Diğer türü ise kestirim (yordama) geçerliğidir. Kestirim geçerliği, standart ölçümü kestiren bir ölçme aracından elde edilen değerler yardımıyla ileriye dönük bir zamandaki değerleri tahmin etmek amacıyla kullanılmaktadır (157).

v. Yapı Geçerliği

Bir değişkenin diğer değişkenlerle olan kuramsal ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Amaç, ilgili yapıyı ve özelliği ölçeceği düşünülen değişkenlerin oluşturduğu bütünü, öngörülen yapıyı belirleyip belirlemediğinin incelenmesidir (157). Yapı geçerliği, önceki bölümlerde bahsedilen geçerlik türleri ile yakından ilişkili hatta hepsini kapsadığı söylenebilmektedir (158). Yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler; grup farklılıklarının karşılaştırılması, çoklu özellik-çoklu yöntem matrisi, ölçütler ve diğer testlerle arasındaki korelasyonun incelenmesi ve faktör analizidir (160).

Belirtilen yöntemlerin hepsinin kendine özgü kullanım alanları bulunmaktadır. Ancak, ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında sıklıkla faktör analizleri kullanılmaktadır. Faktör analizi yöntemi, ölçeğin ölçtüğü değişkenlerin sayısı ve

bunların her birinin bütününden elde edilen toplam puanlara katkısı, testin ölçtüğü yapı ve yapıları ortaya çıkarmada kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu yöntem, açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) bulguları ile değerlendirilmektedir (155). AFA bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliğin kavramsal yapısının ve bu yapıya ait alt boyutların belirlenmesinde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir (159). DFA ise, önceden belirlenmiş veya kurgulanmış bir yapının istatistiksel olarak doğrulanmasında kullanılan bir faktör analizi yöntemidir (158). Bir diğer deyişle, AFA mevcut verideki faktör yapısını belirlemeye çalışırken, DFA araştırmacı tarafından belirlenen ve daha önceden belirlenmiş olan kuramsal yapının veride var olup olmadığını test etmektedir (157). Bu doğrultuda, ölçek geliştirme çalışmalarında sıklıkla AFA kullanılırken, ölçek uyarlama çalışmalarında DFA tercih edilmektedir (159).

2.4.2. Güvenirlik

Bir ölçme aracının sahip olması gereken önemli niteliklerden birisidir. Güvenirliği düşük olan ölçeğin geçerliğinin yüksek olması beklenmemektedir (154, 164, 167). Güvenirliğin literatürde çeşitli tanımları bulunmaktadır. Tanımlarda ortaklaşan ve güvenirliğin bir göstergesi olarak kabul edilen üç kavram bulunmaktadır.

Güvenirlik, bir ölçüm sürecinde, ölçüm işleminin tekrarlanması durumunda benzer sonuçlar elde edilmesi veya tekrarlardaki *tutarlılıktır* (157).

Güvenirlik, bir ölçme aracının aynı şartlar altında farklı zamanlarda yapılan ölçümleri arasında aynı veya benzer sonuçlar vermesindeki zamana karşı *kararlılığıdır* (158).

Güvenirlik, bir ölçme aracının ölçmesi amaçlanan yapıyı ölçme hassasiyetindeki *duyarlılığıdır* (159).

Güvenirlik değerlendirilirken, ölçüm hatalarını engellemek için değişkenler arasındaki ilişki derecesi, korelasyon katsayısı yardımıyla hesaplanmaktadır. Güvenirliğin yüksek olması için elde edilen sonucun 1'e yakın olması gerekmektedir. Ölçek güvenirliğinin değerlendirilmesinde, paralel test yöntemi, test tekrar test yöntemi, iç tutarlılık katsayısı ve eş değer yarılar yöntemi kullanılmaktadır (155, 157, 158, 167).

i. Paralel Test Yöntemi

Bir ölçeğin güvenilirliğinin belirlenmesinde aynı kapsamı ve aynı özelliği ölçtüğü bilinen başka bir ölçekle arasındaki korelasyon değerinin hesaplanması yöntemidir. Ancak, bu yöntemde ölçeklerin birbirleri ile eşdeğer olması ve aynı özelliği ölçmesi konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir (157).

ii. Test-Tekrar Test Yöntemi

Aynı bireylere aynı koşullarda ancak belirli bir zaman aralığı ile ölçüm aracının tekrardan uygulanmasıdır. Bu iki uygulama arasında elde edilen skorların korelasyon katsayısı incelenerek güvenilirlik derecesi elde edilmektedir. Bu sayede ölçüm aracının kararlılık açısından güvenilirliği belirlenmektedir. Skorlar arası yapılan analiz sonucunda çıkan korelasyonun 0.8 üzeri olması ve 0.7'nin altında olmaması istenmektedir. Yapılacak olan ilk test ve geri test arasındaki süre literatüre göre, 7 gün-15 gün ve bazı özel durumlarda ise 3 ay kadar ara verilmesi gerektiği belirtilmektedir (158, 166).

iii. İç Tutarlılık Katsayısı

Bir ölçme aracı, tek bir grup ve uygulama gerektirdiğinde en sık kullanılan yöntemdir. Temelde iç tutarlılık; bir ölçüm aracında yer alan her bir maddenin ölçek yapısının tamamıyla hareket edip etmediğinin bir göstergesidir (159). İç tutarlılıkta sıklıkla kullanılan yöntemler; Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı, Kuder Richardson 20-21 güvenilirlik katsayısı ve madde analizleridir (162, 164, 166, 167).

Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı

Ölçme aracındaki maddelerin iç tutarlılığının, homojenliğinin göstergesidir. Özellikle likert tipli ölçeklerde Cronbach alfa katsayısı hesaplanması ve belirli bir değere sahip olması gerektiği belirtilmektedir (166). Ölçüm aracının tüm alt boyutlarının birbirine göre ya da her bir alt boyutundaki soruların kendi içinde tutarlı olup olmadığının sınanmasında alfa katsayısı kullanılmaktadır (155).

Alfa katsayısı; ölçekte yer alan “k” maddenin ortalamalardaki değişimlerden kaynaklı varyansları göz ardı ederek, katılımcıların ölçek bütününden elde edilen skorlarının toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart

değişim ortalaması olarak tanımlanmaktadır (158). Literatüre göre, alfa katsayısının 0.70'den yüksek olması ölçek iç tutarlılığının yeterli olduğunu ve 0.60'dan büyük olması kabul edilebilir düzeyde ölçek iç tutarlılığının olduğunu göstermektedir (157, 160, 167).

Kuder Richardson 20-21 yöntemi

Ölçeğin maddeleri ikili kategoriler (evet-hayır) halinde olduğunda uygulanabilmektedir. Yöntem, ölçeğin homojen dağıldığı durumda ve tek bir yapıyı ölçtüğü zaman kullanılmaktadır. Ölçek maddeleri benzer güçlükte olmadığında Kr-20, benzer güçlükte olduğu bilindiğinde ise Kr-21 kullanılmaktadır. Güvenirliği değerlendirilen ölçeğin madde sayısına göre kabul edilebilir değerleri 0.50-0.80 aralığında değişmektedir (157, 158).

Madde analizi

Madde analizin genel amacı, bir ölçekte yer alan maddelerin ölçeğin hedefleri doğrultusunda çalışıp çalışmadığını tespit etmektir (168). Madde analizinde çeşitli teknikler olmakla birlikte en sık kullanılan teknikler, madde- bütün korelasyona dayalı madde analizi ve madde ayırt ediciliği tekniğidir.

Madde-bütün korelasyona dayalı madde analizi, bir madde ile bütün arasındaki korelasyon ile maddenin ölçeğin geriye kalan maddelerinin tümünün ölçtüğü özelliği ölçüp ölçmediğini değerlendiren bir yöntemdir (157). Ölçekte bulunan maddeler ile yapılan korelasyon analizi sonucu, bir maddenin ölçeğin bütünü ile yaptığı korelasyon katsayısı düşük ise o maddenin ölçeğe katkısının düşük olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, maddenin ölçeğe olan katkısının kabul edilebilir olması için madde-bütün korelasyon katsayısının pozitif yönde ve en az 0.25 olması gerektiği belirtilmektedir. Madde, istenilen düzey olan +0.25'den düşük çıkmış ise ölçeğin güvenilirliğini düşürdüğü gerekçesiyle maddenin ölçekten çıkartılması önerilmektedir (169).

Madde ayırt ediciliği ise, her bir maddenin ve ölçeğin tamamının, ölçmeyi amaçlanan değişken/tutum/davranışa sahip olan bireyler ile sahip olmayan bireyleri ayırt etme özelliğini test etmektedir (158). Bu analiz türünde, katılımcılar ölçekten aldıkları toplam puana göre büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. Ardından toplam

katılımcı sayısının en yüksek puana sahip olan %27'lik dilimi “üst grup”, en düşük puana sahip olan %27'lik dilimi ise “alt grup” olarak tanımlanmakta ve ortada kalan katılımcılar dikkate alınmamaktadır (157). Madde ayırt ediciliğinde %27'lik dilimlerin alınması işlemi literatürde genel kabul haline gelen bir kuraldır (158). Daha sonra her bir madde ve toplam puan için bu iki gruba ait ortalamaların anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik “bağımsız gruplar için t testi” uygulanarak, madde ayırt ediciliği değerlendirilmektedir (159).

iv. Eş Değer Yarılar Yöntemi (Split Half)

Ölçeğin birden çok kez uygulanamayacağı durumlarda güvenilirliğin belirlenmesinde en sık kullanılan güvenilirlik yöntemidir (157). Bu yöntemde, ölçme aracı iki eş yarıya bölünerek iki yarı ölçek arasındaki eşdeğerliliği incelenmektedir. Yarı ölçeklerin ölçüm sonuçlarını arasında anlamlı ve yüksek bir korelasyon ilişkisi varsa ölçeğin tamamının iç tutarlılık bağlamında güvenilirliğinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (155, 159, 167).

v. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Şekli

Bu araştırma, pediatri hemşirelerindeki moral distres düzeyini ölçmek amacıyla Hamric ve ark. (2012) tarafından geliştirilen Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire (MDS-R) ölçeğinin Türkçe formunun, geçerlik ve güvenilirlik çalışması olarak metodolojik türde planlanmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki soruların cevaplanması planlanmıştır.

Araştırma soruları;

1. Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire ölçeğinin Türkçe formu geçerli midir?
2. Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire ölçeğinin Türkçe formu güvenilir midir?
3. Türkiye’de çalışan pediatri hemşirelerinin moral distrese ilişkin durumları nasıldır?

3.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Araştırma, Çocuk Hemşireleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği’ne üye olan pediatri hemşirelerinin katkı ve katılımıyla, 15 Temmuz 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında online formatta gerçekleştirilmiştir.

Çocuk Hemşireleri Derneği

Çocuk Hemşireleri Derneği, çocuk hemşireliğinin ülkemizde gelişmesi, dünya standartlarına ulaşması, çocuk hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine katkıda bulunulması vb. konularda derneğin öncülük edebileceğine inanan bir grup meslektaşımız tarafından Pedyatri Hemşireliği Derneği adı ile 27 Ocak 1997 tarihinde İstanbul da, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda kurulmuştur. Merkezi İstanbul olan derneğin Ankara ve İzmir şubeleri bulunmaktadır.

Türk Hemşireleri Derneği

23.08.1933 yılında, hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmak amacıyla gönüllü hemşireler tarafından İstanbul'da kurulan "Türk Hastabakıcılar Cemiyeti" adlı cemiyet, Cumhuriyet ile birlikte Hemşirelikte yaşanan gelişmeler ve örgün olarak, hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde yeniden düzenlenerek Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Türk Hemşireler Derneği'nin, 17 şubesi ve il temsilcilikleri bulunmaktadır.

3.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni, ilk olarak Ankara ili sınırlarında bulunan üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve devlet hastanelerinde çalışan pediatri hemşirelerinden oluşması planlanmıştır. Ancak, başvuru alan 31 hastaneden altı hastaneden dönüş yapılmamış, 17 hastane çalışmayı reddetmiş ve sekiz hastane araştırma onayı vermiştir. Onay veren hastanelerde çalışan toplam pediatri hemşire sayısı 80-90 olduğundan, araştırma için yeterli örneklem büyüklüğü sağlanamayacağı gerekçesiyle araştırma evreni değiştirilmiştir. Sonuç olarak, araştırma evrenini Türkiye'de çalışan pediatri hemşireleri oluşturmuştur.

Araştırma örneklem büyüklüğü, ölçek geliştirme ve geçerlik-güvenirlik çalışmalarında örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan Örnek sayısı= (Madde Sayısı) X (Gözlem/kişi sayısı) formül ile hesaplanmıştır (157). Literatüre göre, formülde belirtilen "gözlem/kişi sayısı" geçerlik ve güvenilirliği değerlendirilecek olan ölçekte bulunan her madde için 5-40 kişi olması önerilmektedir (157, 158). Bu çalışmada, veri toplama aşamasından önce evrenin özelliği ve ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak, geçerliği ve güvenilirliği test edilecek olan ölçekteki her madde için en az 10 pediatri hemşiresi olacak şekilde örneklem büyüklüğü hesaplanmış ve formül uyarınca 210 pediatri hemşiresine ulaşılması gerektiği belirlenmiştir (21 Madde X 10 = 210). Örneklem alınacak pediatri hemşirelerine Çocuk Hemşireleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği aracılığıyla e-posta yolu aracılığıyla ulaşılmış ve ulaşılan hemşirelerden aynı klinikte çalıştıkları pediatri hemşirelerine ulaşmada yardım alınmıştır.

Çalışmaya dahil edilme kriterleri ve dışlanma kriterleri aşağıda verilmiştir.

Çalışmaya dahil edilme kriterleri;

- Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak
- En az altı aydır çocuk hastalarla çalışıyor olmak
- Klinik hemşiresi olarak görev yapıyor olmak

Çalışmadan dışlanma kriterleri;

- Özel birim hemşiresi (eğitim hemşiresi, kalite birim çalışanı, enfeksiyon hemşiresi vb) olmak
- Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olmak
- Hemşire dışı sağlık çalışanı olmak

3.4. Veri Toplama Araçları

Verilerin toplanmasında Hemşire Bilgi Formu (EK-1) ve Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği (EK-2) kullanılmıştır.

Hemşire Bilgi Formu (EK-1)

Hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini ve etik konulara ilişkin eğitimlerine yönelik değişkenleri içermektedir. Bu form, araştırma alanındaki literatür bilgileri taranarak (37, 52, 170) ve alanda çalışan uzmanlardan görüş alınarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Hemşirelerin, sosyodemografik özelliklerini, iş geçmişlerini, pediatri alanında çalışma deneyimlerini, çalıştıkları klinikleri, kliniklerindeki çocukların iletişime açık olma durumu ve etik alanda aldıkları eğitimler sorgulayan dokuz sorudan oluşmaktadır.

Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği (Moral Distress Scale- Revised Pediatrics Nurses) (EK-2)

Hamric ve ark. tarafından 2012 yılında, pediatri hemşirelerinin moral distres düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek tek boyuttan ve 21 maddeden oluşmaktadır. Cronbach alfa değeri 0,89 olarak hesaplanmıştır. Ölçek iki sütun

şeklinde 5’li likert tipte olarak rahatsızlık (0: Hiç, 1: Düşük, 2: Orta, 3: Yoğun, 4: Çok Yoğun) ve 5’li likert tipte olarak sıklığı (0: Asla, 1: Az Sıklıkta, 2: Ara sıra, 3: Sıklıkla, 4: Çok Sık) ölçmektedir. Sıklık ve rahatsızlık boyutlarından her birinden 0-84 aralığında puan elde edilmektedir. Ölçekte her bir madde de bulunan sıklık ve rahatsızlık puanları çarpılarak 0-16 aralığında genel bir moral distress puanı elde edilmektedir. Bu durumda elde edilen toplam puan 0-336 aralığındadır. Ölçeğin kesim noktası bulunmamakta, ölçekten alınan puan arttıkça moral distressin arttığı şeklinde değerlendirilmektedir.

3.5. Araştırmanın Uygulanması

3.5.1. Araştırmanın Ön Uygulaması

Araştırmanın ön uygulaması, formların görünüş geçerliği ve anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla, çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 10 pediatri hemşiresi ile gerçekleştirilmiştir. Ön uygulamaya katılan pediatri hemşireleri araştırma örneğine dahil edilmemiştir.

3.5.2. Araştırma Verilerinin Toplanması

Araştırma verileri online anket formatında toplanmıştır. Çocuk Hemşireleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği üyesi olan katılımcılara, dernek aracılığı ile araştırmaya davet mektubu gönderilmiş ve özel e-postalarında araştırmanın linki paylaşılmıştır (EK-3). Ulaşılan dernek üyesi katılımcıları aracılığı ile pediatri hemşiresi olan ve pediatri kliniklerinde çalıştığı bilenen katılımcıların özel e-posta ve telefonlarına araştırma davet linki iletilmiştir. Veri toplamada kullanılan formların doldurulması yaklaşık olarak 10 dakika sürmüştür.

3.6. Araştırmanın Etik Boyutu

Araştırma için Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı (GO 19/522) alınmıştır (EK-4). Araştırmanın yapıldığı yer, evren ve veri toplama yöntemi değişiklikleri, Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’na yazılı olarak bildirilmiş ve değişiklik kurul tarafından onaylanmıştır (EK-5). Başvurulan üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve devlet

hastanelerinden ret (EK-6), izin yazıları (EK-7) ve Çocuk Hemşireleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği'nden izin yazıları alınmıştır (EK-8). Araştırmaya katılan katılımcılardan online forma eklenen aydınlatılmış onam onay tuşu vasıtasıyla onam alınmıştır (EK-9).

3.7. Moral Distress Scale- Revised Pediatrics Nurses Ölçeği'nin Uyarlama Aşamaları

MDS-R Kullanım İzninin Alınması

Araştırma konusu belirlendikten sonra, MDS-R ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışmasının yapılabilmesi amacıyla, ölçeğin geliştirilmesinde sorumlu araştırmacı olan Professor Ann B. Hamric ile e posta aracıyla iletişime geçilmiştir. Prof. Hamric, ölçeğin bu araştırma kapsamında Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışmasının yapılabilmesi için e posta yoluyla izin vermiştir (EK-10). Araştırmanın dil geçerliği aşamasında faktörlerin isimlendirilmesinde ve analiz sonuçlarının yorumlanmasında Prof. Hamric'le iletişim halinde olunmuş ve görüşlerine başvurulmuştur.

3.7.1. MDS-R Geçerlik Aşamaları

MDS-R Geçerlik Aşamaları

Bu aşamada, MDS-R'nin geçerliğinin değerlendirilmesi amacıyla dil geçerliği, kapsam geçerliği, görünüş geçerliği ve yapı geçerliği analizleri kullanılmıştır.

MDS-R'nin Dil Geçerliği

MDS-R'nin Türkçe formunun oluşturulması ve dil geçerliğinin değerlendirilmesi amacıyla, geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarında sıklıkla kullanılan standart yöntem olan çeviri geri çeviri tekniği kullanılmıştır. Tablo 3.1.'de dil geçerliği ve kapsam geçerliği sürecinde yapılan süreçler aşamalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3.1. MDS-R'nin dil ve kapsam geçerliği uygulama aşamaları

Aşama	Amaç	Uygulama
Hazırlık	MDS-R'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliğinin yapılabilmesi için izin alınması	Sorumlu araştırmacı olan Professor Ann B. Hamric ile e-posta aracılığıyla iletişime geçildi ve izin alındı.
Orijinal dili olan İngilizce'den Türkçe'ye çevirisi aşaması	Anlam ve yapının korunması	Ana dili Türkçe olan ve İngilizce'ye hakim olan üç farklı akademisyen hemşire tarafından çeviri işlemi yapıldı.
Türkçe çevirilere karar verilmesi	Sonraki aşamalarda ölçeğin kullanılabilmesi için uygun olan çevirilere karar verilmesi	Sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından çeviriler tek bir form haline getirildi.
Çevirilerin Türkçe'ye uygunluğu	Türkçe dil bilgisi ve anlam açısından incelenmesi	Bir Türkçe dil bilim uzmanı tarafından değerlendirildi ve uygun bulundu.
Türkçe'den İngilizce'ye çevirisi aşaması	Anlam ve yapının korunduğundan emin olunması	Ana dili Türkçe olan ve İngilizce'ye hakim olan üç farklı akademisyen hemşire tarafından çeviri işlemi yapıldı.
İngilizce çevirilere karar verilmesi	Sonraki aşamalarda ölçeğin kullanılabilmesi için uygun olan çevirilere karar verilmesi	Sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından çeviriler tek bir form haline getirildi.
Çevirilerin İngilizce'ye uygunluğu	İngiliz dil bilgisi ve anlam açısından incelenmesi	Bir İngilizce dil bilim uzmanı tarafından değerlendirildi ve uygun bulundu.
Çevirinin orjinal yapıya göre değerlendirilmesi	Orjinal ölçek ile çeviri yapılan formu arasındaki anlam ve yapının korunması	Sorumlu araştırmacı olan Professor Ann B. Hamric tarafından değerlendirildi ve uygun bulundu.
Kapsam Geçerliği Aşaması	Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği ne kadar temsil ettiğini belirlenmesi	Bir tıp etiği uzmanı, bir pediatri uzman hekimi, iki pediatri akademisyen hemşire, beş psikiyatri akademisyen hemşireden oluşan, dokuz uzman görüşü alındı.

Tablo 3.1. MDS-R'nin dil ve kapsam geçerliği uygulama aşamaları (Devam)

Ölçeğin son halinin değerlendirilmesi	Dil ve kapsam geçerliği tamamlanan ölçeğin uygulanabilmesi için hazırlanması	Bir ölçme değerlendirme uzmanı, sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından incelendi ve görünüş geçerliği öncesi son hali verildi.
Görünüş geçerliği aşaması	Güvenirlilik aşamasına geçmeden önce ölçek maddelerinde yaşanabilecek anlam ve yapı problemlerinin tespit edilmesi	Örnekleme dahil edilmeyen 10 pediatri hemşiresine veri toplama gereçleri uygulandı.

PH-MDRÖ'nün Yapı Geçerliği

PH-MDRÖ'nün yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde DFA ve AFA kullanılmıştır.

Faktör analizleri yapılmadan önce, verilerin örneklem büyüklüğünün analize uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla Kaiser-Mayer- Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliği, KMO değerinin 0,80'in üzerinde olması, ölçeğin faktörlenebilirliği ise Bartlett's küresellik testi p değerinin 0,05'ten küçük olması ile değerlendirilmiştir.

Araştırmada, yapı geçerliğinin incelenmesinde, DFA için ağırlıklandırılmamış en küçük kareler tahmin yöntemi ve AFA için faktör çıkartma yöntemi Temel Bileşenler Analizi kullanılmıştır. Ölçeğin orjinal yapısı ile araştırma örnekleminde elde edilen veriler, DFA ile analiz edilmiştir. DFA değerlendirilmesinde χ^2/SD , GFI, IFI, CFI, RMSEA ve TLI uyum indekslerinin iyi uyum ve kabul edilebilir değerleri göz önüne alınarak yapı geçerliği hakkında karara varılmıştır.

Ülkemize uygun olan faktör yapısının belirlenmesi amacıyla, AFA uygulanmıştır. AFA'da temel amaç birden fazla faktör ortaya çıkartmak olduğundan, faktör yüklerinin doğru dağılımının belirlenebilmesi için eğik döndürme yöntemlerinden birisi olan varimax döndürmesi kullanılmıştır. AFA sonucunda, ölçeğin faktör yapısı değerlendirilirken, her bir faktör grubunda yer alan maddelerin en az "0,30" faktör yüküne sahip olması gereği göz önünde bulundurulmuştur.

3.7.2. PH-MDRÖ'nün Güvenirlik Aşamaları

Bu arařtırmada, PH-MDRÖ'nün güvenirliliđinin deđerlendirilmesi amacıyla i tutarlık güvenirliliđi, eř deđer yarılar güvenirliliđi ve madde analizleri kullanılmıřtır.

İ tutarlık güvenirliliđi

PH-MDRÖ'nün ve alt boyutları iin Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıřtır. Cronbach alfa katsayısının 0,60 ve üzeri olması i tutarlılıđı sađlanması iin esas alınmıřtır.

Eř deđer yarılar (split half) güvenirliliđi

Bu arařtırmada, öleđe tek maddeler ve ift maddeler řeklinde yarıya bölme iřlemi yapılmıřtır. Veriler Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı ve Guttman Eř Deđer Yarılar Korelasyon Katsayısı ile deđerlendirilmiřtir. Eř deđer yarılar güvenirlilik kat sayısının 0,70'den büyük olması kriter olarak kabul edilmiřtir.

Madde analizi

Bu arařtırmada, madde analizi kapsamında korelasyonlara dayalı madde analizi (madde-bütün korelasyon katsayıları) ve madde ayırt edicilik gücü indeksi kullanılmıřtır. Öleđin her bir maddesinin ölülmek istenen kavramı ölme gücünü belirlemek ve bu bilgiden yararlanarak öleđi daha güvenilir bir duruma getirebilmek amacıyla, PH-MDRÖ'nün madde toplam korelasyon katsayısı ve madde silindiđinde Cronbach α katsayısı deđerleri incelenmiřtir. Yapılan alıřmada, madde toplam korelasyon katsayısının negatif olması veya +0.25'den küçük olması ve maddenin ölekten ıkartılması durumunda ölek Cronbach Alfa katsayısının yükselmesi belirleyicileri dođrultusunda ölek madde analizleri yapılmıřtır (159, 171).

Ölekte bulunan her bir maddenin madde ayırt ediciliđinin belirlenmesi amacıyla, alt-üst %27'lik gruplara iliřkin madde ortalamaları karřılařtırılmıřtır. Alt-üst %27'lik gruplar arasındaki farkın incelenmesinde, bađımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılmıř ve p deđerinin 0,05'en küçük olması ile deđerlendirilmiřtir (158).

3.8. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Versiyon 23.0 ve faktör analizi için IBM AMOS (Analysis of Moment Structures) Versiyon 23.0 istatistik programları kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımının belirlenmesinde Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov ve basıklık-çarpıklık (Skewness-Kurtosis) testleri ve homojen dağılımının belirlenmesinde varyans homojenite analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın tanımlayıcı istatistikler olarak, sayı, yüzde, ortalama±standart sapma verilmiştir. PH-MDRÖ ile tanımlayıcı özelliklerin ilişkisinin incelenmesinde, Pearson korelasyon katsayısı, gruplar arası farkın incelenmesinde ise ikiden fazla gruplar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ikili grup için bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testleri kullanılmıştır. İstatistiksel kararlarda $p < 0.05$ seviyesi anlamlı farklılığın göstergesi olarak kabul edilmiştir. PH-MDRÖ'nün geçerlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan analizler, araştırmanın uygulanması bölümünde ilgili başlıkların altında açıklanmıştır.

3.9. Araştırmanın Kısıtlılıkları ve Güçlü Yönleri

Araştırmanın veri toplama aşamasında, Ankara ilinde yer alan hastanelerin büyük bir bölümünden izin alınamaması nedeniyle, çalışmanın evreni ve veri toplama şekli değiştirilmiştir. Veriler, örnekleme belirtilen dernek üyelerinden ve bu üyeler tarafından yönlendirilen pediatri hemşirelerinden online olarak toplanmıştır. Bu durum, çalışmanın kısıtlılığı olarak değerlendirilmekle birlikte farklı açılardan da çalışmayı güçlendirdiği düşünülebilir. Yapılan araştırma online ortamda yürütüldüğü için ve katılımcılarla kurumları içinde direk temasa geçilmediğinden, katılımcıların anket sorularına daha özgür cevap verdiği düşünülmektedir. Ayrıca, örnekleme Türkiye genelinde bulunan çeşitli pediatri kliniklerinde çalışan hemşireler oluşturduğundan ve belirli bir hastane kültüründen etkilenme söz konusu olmadığından dolayı, cevapların daha objektif olabileceği düşünülebilir.

Araştırmanın dış geçerlik çalışmasının yapılmamış olması ve güvenilirlik aşamasında eş değer yarılar (split half) yöntemin kullanılmış olması çalışmanın sınırlılıkları arasında görülebilmektedir.

Dış geçerlik çalışmasının yapılmamış olması: Geçerlik güvenilirlik çalışmalarında dış geçerliğin değerlendirilmesi aynı özelliği ölçen ölçeklerin kullanılması önerilmektedir. Ancak, literatür incelendiğinde Türkiye’de pediatri hemşirelerinin moral distres düzeylerini ölçebilecek ölçüm araçlarına rastlanmamış ve başka bir özellik barındıran ölçeklerle ile yapıldığında dış geçerliği olumsuz etkileyeceği düşünüldüğünden dolayı çalışmada dış geçerlik incelenmemiştir.

Eş değer yarılar yönteminin kullanılmış olması: Ölçekteki soruların hemşirelerin günlük uygulamaların belki hemen her gün karşılaştıkları durumlara etik ve ahlaki bir bakışla değerlendirmeleri katılımcıların daha önce fark etmediği sorunlar konusunda farkındalığının artmasına neden olacaktır. Bu nedenle çalışmanın güvenilirlik aşamasında test tekrar test kullanılmamıştır. Bunun yerine güvenirlığın belirlenmesinde bir yöntem olan eş değer yarılar (split half) yöntemi kullanılmıştır.

4. BULGULAR

Çalışmanın bulguları üç bölümde sunulmuştur. İlk bölümde katılımcılara ait değişkenlere yer verilmiştir. İkinci bölümde Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği (PH-MDRÖ)'nin geçerlik ve güvenirlik analizleri sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise, PH-MDRÖ'nin ölçek puanlarının katılımcılara ait özelliklere göre dağılımı istatistiksel olarak incelenmiştir.

4.1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri

Bu bölümde, katılımcıların sosyodemografik bilgileri (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu) ve mesleki özelliklerine (meslekteki çalışmaya yılı ve pediatri kliniğinde çalışma yılı, çalıştığı klinik ve bakım verdikleri çocukların sözel iletişim kurma becerileri) ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyodemografik özelliklerine yönelik bulgular, Tablo 4.1.'de sunulmuştur.

Tablo 4.1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri (n=210)

	n	%	$\bar{x} \pm SS$	Min-Max
Yaş				
20-29	127	60,5		
30-39	54	25,6	30,1±6,6	22-51
40-49	27	12,9		
50-59	2	1,0		
Cinsiyet				
Kadın	190	90,5		
Erkek	20	9,5		
Medeni Durum				
Evli	100	47,6		
Bekar	110	52,4		
Eğitim Durumu				
Lise	28	13,3		
Ön lisans	3	1,4		
Lisans	164	78,1		
Yüksek Lisans/Doktora	15	7,2		
Toplam	210	100		

Katılımcıların yaş ortalaması $30,1 \pm 6,6$ yıl olup, %60,5'i 20-29 yaş aralığında bulunmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%90,5) kadın; yarısından fazlası (%52,4) bekar ve %78,1'i lisans mezunudur.

Araştırmaya katılan hemşirelerin mesleki özelliklerine yönelik bulgular, Tablo 4.2.'de sunulmuştur.

Tablo 4.2. Katılımcıların mesleki özellikleri (n=210)

	n	%	$\bar{x} \pm SS$	Min-Max
Meslekteki Çalışma Yılı				
1-5	94	44,8		
6-10	62	29,5	8,2±6,9	1-30
11+	54	25,7		
Pedatri Kliniğinde Çalışma Yılı				
1-5	128	61,0		
6-10	42	20,0	6,1±6,0	1-30
11+	40	19,0		
Çalışılan Klinik				
Acil	11	5,2		
Cerrahi	14	6,7		
Dahili	81	38,6		
Onkoloji	20	9,5		
Yoğun bakım	84	40,0		
Klinikte Çocukların İletişime Açık Olma Durumu				
Evet	142	67,6		
Hayır	68	32,4		
Etik Konulara İlişkin Eğitim Alma Durumu				
Mezuniyet öncesi	79	37,6		
Mezuniyet öncesi ve hizmet içi eğitim	30	14,3		
Hizmet içi eğitim	37	17,6		
Mezuniyet sonrası	20	9,5		
Hepsi	44	21,0		
Toplam	210	100		

Katılımcıların meslekteki çalışma yılı ortalaması 8,2±6,9 yıl olup, %44,8'i 1-5 yıl aralığındadır. Pedatri kliniğinde çalışma yılı ortalaması 6,1±6,0 yıl olup, 1-5 yıldır bu klinikte çalışan hemşirelerin oranı %61'dir. Katılımcıların %40'ı pedatri yoğun

bakım ve %38,6'ı dahili kliniklerde çalışmakta, %67,6'sinin bakım verdiği çocuklar sözel olarak iletişim kurabilmektedir. Katılımcıların % 36,7'si sadece mezun olmadan önce etik konulara ilişkin eğitim alırken, % 21'i mezuniyet öncesine ek olarak mezuniyet sonrası ve hizmet içi eğitim olarak etik konulara ilişkin eğitim almışlardır.

4.2. PH-MDRÖ'nin Geçerlik Bulgularının İncelenmesi

PH-MDRÖ'nin ölçeğinin Türk dili ve kültürüne adaptasyonu çalışmasında geçerliğinin değerlendirilmesi amacıyla; dil geçerliği, kapsam geçerliği ve yapı geçerliği analizleri uygulanmış ve bulguları sunulmuştur.

4.2.1. PH-MDRÖ'nin Dil Geçerliği

PH-MDRÖ'nin dil geçerliğinin incelenmesi amacıyla, çeviri – geri çeviri tekniği kullanılmıştır. Çeviri aşamasında ilk olarak PH-MDRÖ'nin maddeleri orijinal dili olan İngilizce'den Türkçe'ye çevirisi yapılmıştır. Türkçe'ye çeviri aşamasında ana dili Türkçe olan ve İngilizce'ye hakim olan üç farklı akademisyen hemşire çeviri işlemini yapmıştır. Çeviri yapan kişiler, birbirinden bağımsız bir şekilde çevirilerini gerçekleştirmiştir. Elde edilen üç çeviri, sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından incelenerek, her bir madde için uygun olan Türkçe çevirilere karar verilmiştir. Türkçe çevirisi tamamlanan ölçek, Türk dil bilgisi ve anlam açısından incelenmesi amacıyla bir Türkçe dil bilim uzmanına gönderilmiştir. Uzmandan gelen öneriler doğrultusunda, PH-MDRÖ'nün nihai Türkçe çevirileri oluşmuştur.

Türkçe çevirisi yapılan PH-MDRÖ'nün, İngilizce'ye geri çeviri işlemini İngilizce'ye hakim olan üç farklı akademisyen hemşire çeviri işlemini yapmıştır. Çeviriyi yapan kişiler ölçeğin orijinal halini görmemiş ve birbirinden bağımsız bir şekilde çevirilerini gerçekleştirmiştir. Elde edilen çeviriler, sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından incelenerek bütün maddeler için uygun olan İngilizce çevirilere karar verilmiştir. İngilizce çevirisi tamamlanan ölçek, İngiliz dil bilgisi ve anlam açısından incelenmesi amacıyla, bir İngilizce dil bilim uzmanına gönderilmiştir. Uzmandan gelen öneriler doğrultusunda ölçeğin İngilizce son hali oluşturulmuştur.

Çeviri ve geri çeviri aşamaları tamamlanan PH-MDRÖ, uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ölçeği geliştiren akademisyene e-posta aracılığıyla

gönderilmiştir. Akademisyen ölçeğin orijinal hali ile çeviri yapılan formu arasında değerlendirme yapmıştır. Değerlendirme sonucunda, 4, 9, 10, 12, 17, 20 ve 21. maddelere kelime anlam farklılıkları ve madde anlam yapısına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmuştur. Öneriler, sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından incelenmiş 4, 10, 20 ve 21. maddelerde değişiklik yapılmamış ve gerekli açıklama yapılmıştır. Madde 12'ye “ızdırıp” kelimesi, madde 9 ve 17'ye “yetkin” kelimesi eklenmiştir. Böylece, PH-MDRÖ dil geçerliği aşaması tamamlanarak son halini almıştır.

4.2.2. PH-MDRÖ Kapsam Geçerliği

Dil geçerliği tamamlanan PH-MDRÖ'nün kapsam geçerliği, kapsam geçerlik indeksi (KGİ) kullanılarak değerlendirilmiştir. Kapsam geçerliği aşamasında, bir tıp etiği uzmanı, bir pediatri uzman hekimi, iki pediatri akademisyen hemşire, beş psikiyatri akademisyen hemşireden oluşan, dokuz uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Davis tekniği puanlama ölçütü olarak, uzmanlardan maddeleri 1-4 arasında, 1 puan “madde uygun değil”, 2 puan “maddenin uygun şekilde getirilmesi gerekiyor.”, 3 puan “uygun ancak ufak değişiklik gerekiyor”, 4 puan “madde uygun” şeklinde puanlamaları istenmiştir. Uzmanlar PH-MDRÖ'nün kültürel uygunluğunu ve anlaşılabilirliğini değerlendirerek görüşlerini bildirmişlerdir.

PH-MDRÖ'nün maddelerinin kapsam geçerlik oranları (KGO) ve kapsam geçerlik indeksi (KGİ) değeri, Tablo 4.5.'te sunulmuştur. Uzman görüşleri incelenerek sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından, madde 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 21 için önerilen uygun ufak değişiklik önerileri gerçekleştirilmiştir. Madde 1, 5, 8, 9, 12 ve 20 için maddenin uygun hale getirilmesi için istenen öneri ve değişiklikler sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından değerlendirildikten sonra maddelerde değişiklikler uygulanmıştır. Değişiklik yapılan maddeler uygunluğunun tekrar değerlendirilmesi için değişiklik talep eden uzmanlara tekrar gönderilerek, görüşleri alınmış ve uygun bulunmuştur. Ölçek son olarak bir ölçme değerlendirme uzmanı, sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından incelenmiştir. Bu aşamalar sonucunda PH-MDRÖ son şeklini almıştır.

Davis tekniği kullanılarak kapsam geçerliği değerlendirilen PH-MDRÖ'nün maddelerinin kapsam geçerlik oranları (KGO) 0.55-1.00 arasında değişmektedir. KGİ

değeri ise 0.925 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, kapsam geçerliği incelenen PH-MDRÖ'nün geçerli olduğu belirlenmiş ve madde çıkarımı yapılmamıştır (157).

4.3. PH-MDRÖ'nün KGO ve KGI değerleri

	4	3	2	1	KGO Skoru
Madde 1	4	4	1	-	0,77
Madde 2	9	-	-	-	1
Madde 3	7	2	-	-	1
Madde 4	5	4	-	-	1
Madde 5	7	1	1	-	0,77
Madde 6	8	1	-	-	1
Madde 7	8	1	-	-	1
Madde 8	5	3	1	-	0,77
Madde 9	7	1	1	-	0,77
Madde 10	5	4	-	-	1
Madde 11	8	1	-	-	1
Madde 12	3	4	2	-	0,55
Madde 13	5	4	-	-	1
Madde 14	6	3	-	-	1
Madde 15	7	2	-	-	1
Madde 16	7	2	-	-	1
Madde 17	7	2	-	-	1
Madde 18	8	1	-	-	1
Madde 19	8	1	-	-	1
Madde 20	7	1	1	-	0,77
Madde 21	7	2	-	-	1
Kapsam Geçerlik İndeksi					0,925

4.2.3. PH-MDRÖ Görünüş Geçerliği

PH-MDRÖ araştırma örnekleme uygulananmadan önce, ölçek maddelerinde yaşanabilecek anlam ve yapı problemlerinin tespiti için örnekleme dahil edilmeyen 10 pediatri hemşiresine veri toplama gereçleri uygulanmıştır (167). Uygulama sonucunda katılımcılar ölçeğe anlam ve yapı açısından öneride bulunmamış ancak ölçeğin şekilsel görünümü ve ölçek açıklama metnine yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Öneriler, araştırmacı ve danışmanı tarafından gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

4.2.4. PH-MDRÖ Yapı Geçerliği

Dil geçerliği ve kapsam geçerliği incelenen PH-MDRÖ'nün yapı açısından Türk dili ve kültürüne uygunluğunu değerlendirebilmek amacıyla, doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) ve açıklayıcı faktör analizleri (AFA) uygulanmıştır (155).

Faktör analiz aşamasına geçmeden önce araştırma örnekleminin faktör analizine uygunluğunun incelenmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett's küresellik testleri kullanılmıştır. (Tablo 4.4.).

Tablo 4.4. PH-MDRÖ'nin KMO ve Bartlett's küresellik test sonuçları

Kaiser Meyer Olkin (KMO)	0,862
Bartlett's Küresellik Testi	$\chi^2=1301,892$, p<0.001

Analizler sonucunda, KMO değeri 0.862 olarak ve Bartlett's küresellik testi sonuçları $\chi^2=4008.269$, **p<0.001** hesaplanmıştır. Bulunan değerler, araştırma örnekleminin ve verinin birbiri ile ilişki gösterdiği ve faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (152).

i. PH-MDRÖ Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları

Ölçek adaptasyon çalışmalarında, geçerliğin test edilme aşamasında ölçeğin orijinal faktör yapısına uygulamasını belirlemek amacıyla DFA analizleri uygulanmaktadır (157). MDS-R 21 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır (37). Ölçeğin orijinal formatı ile yapılan çeşitli DFA yöntemleri sonucunda, bulunan uyum indeks

değerlerinin kabul edilebilir sınırların (172) altında olduğunu tespit edilmiştir (Tablo 4.5.).

Tablo 4.5. PH-MDRÖ'nün DFA bulguları

	Model Uyum İndeks Değerleri	İyi Uyum Değerleri (Kabul Edilebilir Uyum)
χ^2/SD	2,860	≤ 2 (2-5)
GFI	0,762	1 (0.90-0.99)
IFI	0,698	1 (0.95-0.99)
CFI	0,692	1 (0.90-0.99)
RMSEA	0,094	≤ 0.05 (0.05-0.09)
TLI	0,658	1 (0.95-0.99)

Ölçek maddelerinin hiçbiri madde standardize edilmiş regresyon kat sayısı değerleri 0.30'un altında bulunmamıştır. Literatürde, standardize edilmiş regresyon kat sayısı 0.30 altında olan maddenin çıkartılması önerilmektedir (162). Bu nedenle, DFA aşamasında madde çıkarımı yapılmamıştır. DFA değerleri kabul edilebilir sınırların altında çıkması ancak yapılan diğer analizlerde madde çıkarılması gerektiren bir durum olmaması nedeniyle ölçeğin kültür ve dilimize uygun olan faktör yapısının tespit edilebilmesi amacıyla AFA uygulanmıştır (157).

ii. PH-MDRÖ Açıklayıcı Faktör Analizi Bulguları


Açıklayıcı faktör analizi bir grup değişken içinde bir faktör modeli ya da yapısı belirlemek amacıyla kullanılan bir yapı geçerliği yöntemidir (157). Bu gerekçeyle, PH-MDRÖ'nün ülkemiz için oluşacak olan faktör yapısını belirlemede AFA kullanılmıştır. Tablo 4.6'da PH-MDRÖ madde faktör yükleri, faktör özdeğerleri ve açıklanan varyans değeri sunulmuştur.

Tablo 4.6. PH-MDRÖ madde faktör yükleri, özdeğerleri ve açıklanan varyans değerleri

	Yarar Sağlama- Zarar Vermeme	Hasta ve Ailenin Özerkliği	Mesleki Özerklik	Yönetsel Etik	Hasta Savunuculuğu
Madde 1				0,819	
Madde 2			0,329		
Madde 3		0,627			
Madde 4		0,858			
Madde 5		0,559			
Madde 6	0,535				
Madde 7		0,799			
Madde 8	0,405				
Madde 9					0,813
Madde 10				0,410	0,414
Madde 11					0,515
Madde 12			0,661		
Madde 13			0,693		
Madde 14			0,604		
Madde 15				0,535	
Madde 16				0,461	
Madde 17	0,714				
Madde 18	0,772				
Madde 19	0,620				
Madde 20	0,677				
Madde 21	0,681				
Özdeğer	5,812	2,328	1,249	1,121	1,101
Açıklanan					
Varyans	27,678	11,087	5,950	5,340	5,243
%					
Açıklanan Toplam Varyans %			55,298		

Ölçeğin orijinal yapısı tek faktörlü olduğundan herhangi bir faktör isimlendirmesi bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde yapılan AFA analizi sonucunda beş faktörlü bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu faktörlerin isimlendirilmesi yapılırken araştırmacı, danışmanı, bir tıp etiği uzmanı ve ölçeği geliştiren akademisyenden görüş alınmış ve bu doğrultuda faktör isimlendirmesi yapılmıştır.

Faktör analizine alınan maddelerin kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla faktörlerin özdeğerleri incelenmiştir. Literatüre göre faktörlerin özdeğeri 1'den büyük olması gerekmektedir (167). Bu doğrultuda da özdeğeri 1'den büyük olan beş faktör bulunmuştur. PH-MDRÖ'nün beş boyutlu yapısı, Şekil 4.1'de verilen yamaç-birikinti grafiğinde de görülmektedir.



Şekil. 4.1. Faktörlere ilişkin yamaç birikinti grafiği

Temel bileşen analizi metodu ve varimax döndürme tekniği kullanılarak yapılan PH-MDRÖ'nün AFA analizi sonucunda belirlenen beş boyutlu yapıda; yarar sağlama- zarar vermeme alt boyutu yedi maddeden oluşmakta (6, 8, 17, 18,19, 20 ve 21) ve açıklanan varyans değeri % 27,678'dir. Hasta ve ailenin özerkliği alt boyutu dört maddeden oluşmakta (3, 4, 5 ve 7) ve açıklanan varyans değeri % 11,087'dir. Mesleki özerlik alt boyutu dört maddeden oluşmakta (2, 12, 13 ve 14) ve açıklanan varyans değeri % 5,950'dir. Yönetmelik etik alt boyutu üç maddeden oluşmakta (1, 15

ve 16) ve açıklanan varyans değeri % 5,340, hasta savunuculuğu alt boyutu ise üç maddeden oluşmakta (9, 10 ve 11) ve açıklanan varyans değeri % 5,243 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin açıklanan toplam varyans değeri % 55,298 olarak bulunmuştur.

Tablo 4.6. incelendiğinde 10 numaralı maddenin birden fazla faktöre yüklenebildiği görülmektedir. Literatürde, bu şekilde birden fazla faktörle ilişkili olan değişkenler karışık değişken (complexity variable), binişik değişken ya da çapraz yükler (cross-loadings, split loadings) olarak adlandırılmaktadır (167). Bu çalışmada, binişik değişken ifadesinin kullanılması tercih edilmiştir. Bir faktörde binişik değişkenlerin olması o faktörün adlandırılmasını ve yorumlanmasını zorlaştıracaktır. Bu nedenle binişik değişkenlerin olması istenen bir durum değildir (167, 173, 174). Ancak, madde çıkarılması durumunda geçerlik bulgularında kayda değer bir iyileşme olmaması durumunda, ilgili maddenin korunması önerilmektedir. Çalışmamızda madde 10 çıkartılarak analiz tekrarlandığında, geçerlik bulgularında önemli bir değişim görülmemesi nedeniyle literatüründe önerdiği şekilde maddenin çıkarılmamasına karar verilmiştir.

4.3. PH-MDRÖ'nin Güvenirlik Bulgularının İncelenmesi

Ölçeğin taşınması gereken özelliklerden birisi olan güvenirlik, bir ölçme aracıyla aynı koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerlerinin kararlılığının bir göstergesidir (160). PH-MDRÖ'nün güvenirlik bulgularının test edilebilmesi amacıyla, iç tutarlık Cronbach α kat sayısı, eş değer yarılar yöntemi (split half) ve madde analizleri kullanılmıştır.

4.3.1. PH-MDRÖ'nin İç Tutarlık Cronbach α Kat Sayısı Bulguları

Tablo 4.7'da PH-MDRÖ'nün ve alt boyutlarının Cronbach α değerleri sunulmuştur.

Tablo 4.7. PH-MDRÖ'nün ve alt boyutlarının Cronbach α değerleri

Faktör	Cronbach α değeri
Yarar sağlama-zarar vermeme	0,815
Hasta ve Ailenin Özerkliği	0,758
Mesleki Özerklik	0,660
Yönetmelik Etik	0,584
Hasta Savunuculuğu	0,602
PH-MDRÖ Cronbach α	0,865

Tablo 4.7.'de görüldüğü üzere PH-MDRÖ'nün Cronbach α katsayısı 0,865 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutların Cronbach alpha kat sayıları; “Yarar sağlama-zarar vermeme” alt boyutu için 0,815, “Hasta ve Ailenin Özerkliği” alt boyutu için 0,758, “Mesleki Özerklik” alt boyutu için 0,660, “Yönetmelik Etik” alt boyutu için 0,584 ve “Hasta Savunuculuğu” alt boyutu için 0,602 olarak belirlenmiştir.

4.3.2. PH-MDRÖ'nün Eş Değer Yarılar Testi Bulguları

PH-MDRÖ'nün güvenilirliğin değerlendirilmesinde kullanılan bir diğer yöntem eş değer yarılar analizleridir. Bu analizde, ölçek iki eş parçaya bölerek, iki yarının katılımcılara aynı anda uygulanması sonrası, katılımcıların yarırlardan aldıkları puanlar arasındaki korelasyon ile güvenilirlik tahmini yapılmasını sağlamaktadır. Literatürde genellikle ölçek eş iki yarıya bölünürken tek ve çift maddeler arasında bir gruplama yapılmaktadır. Bu doğrultuda, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 maddeleri bir yarı, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 maddeleri ikinci bir yarı olarak eş değer yarılar analizleri uygulanmıştır.

Tablo 4.8. PH-MDRÖ'nün eş değer yarılar bulguları sunulmuştur.

Tablo 4.8. PH-MDRÖ'nün eş değer yarılar bulguları

Toplam madde sayısı	21 Madde
Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı	0,891
Guttman Eş Değer Yarılar Korelasyon Katsayısı	0,891

PH-MDRÖ'nün güvenilirliğinin değerlendirilmesinde kullanılan eş değer yarılar analizi sonucunda Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı 0,891 ve Guttman Eş Değer Yarılar Katsayısı 0,891 olarak hesaplanmıştır. Bulunan bulgular doğrultusunda, PH-MDRÖ'nün yapılan eş değer yarılar doğrultusunda güvenilir olduğu belirlenmiştir (157).

4.3.3. Madde Analizi

Tablo 4.9.'da PH-MDRÖ'nün madde ortalamaları, standart sapmaları, madde ve toplam korelasyon değerleri ve madde silindiğinde Cronbach α katsayısı değerleri sunulmuştur.

Tablo 4.9. PH-MDRÖ'nün madde analizlerine ait bulgular

	n	\bar{X}	SS	Madde-Toplam korelasyonları	Madde silindiğinde Cronbach α
Madde 1	210	5,13	5,18	0,308	0,862
Madde 2	210	3,80	4,51	0,418	0,858
Madde 3	210	4,35	4,36	0,419	0,858
Madde 4	210	5,78	5,55	0,373	0,860
Madde 5	210	2,94	4,12	0,344	0,860
Madde 6	210	8,10	5,80	0,574	0,852
Madde 7	210	4,83	5,52	0,345	0,861
Madde 8	210	4,79	4,60	0,532	0,854
Madde 9	210	5,71	5,35	0,307	0,862
Madde 10	210	4,40	4,80	0,449	0,857
Madde 11	210	5,63	5,56	0,454	0,857
Madde 12	210	4,30	4,98	0,536	0,854
Madde 13	210	4,29	4,86	0,463	0,856
Madde 14	210	2,14	3,80	0,451	0,857
Madde 15	210	4,00	4,74	0,544	0,854
Madde 16	210	3,40	4,53	0,427	0,858
Madde 17	210	7,21	5,52	0,510	0,855
Madde 18	210	7,12	5,51	0,560	0,853
Madde 19	210	5,66	5,73	0,468	0,856
Madde 20	210	3,90	4,47	0,512	0,855
Madde 21	210	8,68	6,17	0,419	0,859

PH-MDRÖ'nün tüm maddelerine yönelik madde toplam korelasyonları Tablo 4.9.' da görüldüğü üzere pozitif değerli ve +25'den büyüktür. Ayrıca, ölçekten herhangi bir madde silindiğinde Cronbach α katsayısında önemli bir yükselmeye sebep olmadığı görülmektedir. Bu nedenle herhangi bir madde çıkarımı yapılamamıştır.

i. PH-MDRÖ'nün Madde Ayırt Ediciliği Bulguları

Tablo 4.10.'da PH-MDRÖ'nün madde ayırt ediciliği bulguları sunulmuştur.

Tablo 4.10. PH-MDRÖ'nün madde ayırt ediciliği bulguları

	İstatistiksel Analiz (t)	p
Madde 1	12,660	0,001
Madde 2	63,661	0,000
Madde 3	28,583	0,000
Madde 4	16,352	0,013
Madde 5	36,795	0,000
Madde 6	11,400	0,039
Madde 7	17,540	0,000
Madde 8	23,773	0,000
Madde 9	26,100	0,000
Madde 10	41,714	0,000
Madde 11	28,864	0,000
Madde 12	18,945	0,000
Madde 13	25,006	0,000
Madde 14	80,593	0,000
Madde 15	57,871	0,000
Madde 16	33,632	0,000
Madde 17	12,151	0,025
Madde 18	13,947	0,000
Madde 19	33,427	0,000
Madde 20	74,459	0,000
Madde 21	10,053	0,048

PH-MDRÖ'nün maddelerinin alt ve üst %27'lik grupların aralarındaki fark bağımsız gruplar arası t test ile değerlendirilmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($p < 0.05$). Bu sonuç, PH-MDRÖ'nün madde ayırt ediciliğinin yeterli olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

4.4. PH-MDRÖ'nin Ölçek Puanlarının Katılımcılara Ait Özelliklere Göre Dağılımı

Bu bölümde, katılımcıların PH-MDRÖ'den almış oldukları puanlar incelenmiştir. Ayrıca, PH-MDRÖ'nin ölçek puanlarının katılımcılara ait değişkenlere göre dağılımı incelenmiş ve sosyodemografik ve mesleki özelliklere göre alınan puanlar arasında fark olup olmadığı analiz edilmiştir.

PH-MDRÖ puan dağılımları Tablo 4.11.'de sunulmuştur.

Tablo 4.11. PH-MDRÖ puan dağılımları

	Sıklık			Rahatsızlık		Ölçek Toplam Puanı	
	n	\bar{X}	SS	\bar{X}	SS	\bar{X}	SS
Madde 1	210	1,6	1,3	2,5	1,4	5,1	5,1
Madde 2	210	1,2	1,2	2,4	1,5	3,8	4,5
Madde 3	210	2,2	1,4	1,8	1,3	4,3	4,3
Madde 4	210	2,8	1,3	1,8	1,5	5,7	5,5
Madde 5	210	1,3	1,3	1,7	1,4	2,9	4,1
Madde 6	210	2,5	1,3	2,7	1,3	8,1	5,8
Madde 7	210	2,6	1,5	1,5	1,4	4,8	5,5
Madde 8	210	1,5	1,2	2,6	1,4	4,7	4,6
Madde 9	210	2,6	1,2	2,0	1,4	5,7	5,3
Madde 10	210	1,6	1,3	2,1	1,4	4,4	4,8
Madde 11	210	1,7	1,4	2,5	1,4	5,6	5,5
Madde 12	210	1,3	1,3	2,2	1,5	5,6	5,5
Madde 13	210	1,6	1,4	2,0	1,4	5,2	4,8
Madde 14	210	0,8	1,1	2,0	1,6	2,1	3,8
Madde 15	210	1,2	1,2	2,2	1,5	4,0	4,7
Madde 16	210	1,0	1,2	2,3	1,5	3,4	4,5
Madde 17	210	2,2	1,3	2,7	1,3	7,2	5,5
Madde 18	210	2,0	1,3	2,9	1,3	7,1	5,5
Madde 19	210	1,8	1,4	2,4	1,5	5,6	5,7
Madde 20	210	1,2	1,2	2,3	1,5	3,9	4,4
Madde 21	210	2,4	1,4	2,9	1,3	8,6	6,1

Tablo 4.11. PH-MDRÖ puan dağılımları (Devam)

	n	\bar{X}	SS	\bar{X}	SS	\bar{X}	SS
Toplam Puan (Sıklık+Rahatsızlık)	210	38,1	16,0	48,5	17,7	106,2	55,0
Toplam Puan/Madde Sayısı	210	1,8	0,7	2,3	0,9	5,0	2,6

PH-MDRÖ genel puanları incelendiğinde en yüksek puanların madde 21, 6, 17 ve 18 alındığı görülmüştür. PH-MDRÖ, sıklık, rahatsızlık ve ölçeğin toplam puanları ile değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, katılımcıların sıklık boyut toplam puan ortalamaları $38,1 \pm 16,0$, rahatsızlık boyut toplam puan ortalamaları $48,5 \pm 16,0$ ve ölçek toplam puan ortalamaları $106,2 \pm 55,0$ olarak bulunmuştur.

PH-MDRÖ'nün alt boyutlarının puan dağılımları Tablo 4.12.'de sunulmuştur.

Tablo 4.12. PH-MDRÖ'nün alt boyutlarının puan dağılımları

Alt Boyut	\bar{X} (0-16)	SS	Min-Max
Yarar Sağlama-Zarar Vermeme	6,5	5,5	0-15,4
Hasta ve Ailenin Özerkliği	4,4	4,8	0-16
Mesleki Özerklik	3,6	3,2	0-14
Yönetmelik Etik	4,1	3,5	0-16
Hasta Savunuculuğu	5,2	3,7	0-16

PH-MDRÖ'nün alt boyutlarının genel puanları ortalamaları incelendiğinde "Yarar Sağlama-Zarar Vermeme" alt boyutunun en yüksek puan aldığı, "Hasta savunuculuğu" ve "Hasta ve Ailenin Özerkliği" alt boyutlarının ise diğer alt boyutlara göre görece daha yüksek puan alındığı, en düşük puanı ise "Mesleki Özerklik" boyutunun aldığı görülmektedir.

PH-MDRÖ'nün ölçek puanının katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı Tablo 4.13.'de sunulmuştur.

Tablo 4.13. PH-MDRÖ puanının katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı

		n	\bar{X}	SS	İstatistiksel Analiz (F-t)	p
Cinsiyet						
Toplam	Kadın	190	5,0	2,6	-0,198	0.868
	Erkek	20	5,1	2,8		
Medeni Durum						
Toplam	Evli	100	5,0	2,7	-0,314	0.420
	Bekar	110	5,1	2,5		
Eğitim Durumu						
Toplam	Lise	31	4,3	2,9	1,548	0,215
	Lisans	164	5,1	2,5		
	Yüksek Lisans/Doktora	15	5,7	2,6		

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum ve eğitim alma durumuna göre PH-MDRÖ'nün puanları arasında istatistiksel açıdan bir anlamlı bir farka rastlanmamıştır ($p>0.05$).

PH-MDRÖ'nün ölçek puanının katılımcıların mesleki özelliklerine göre dağılımı Tablo 4.14.'de sunulmuştur.

4.14. PH-MDRÖ puanının katılımcıların mesleki özelliklerine göre dağılımı

		n	\bar{X}	SS	İstatistiksel Analiz (F-t)	p
Çalışılan Klinik						
	Acil	11	5,9	2,6		
	Cerrahi	14	5,3	3,5		
Toplam	Dâhiliye	81	4,7	2,6	0,886	0.473
	Onkoloji	20	5,6	2,0		
	Yoğun bakım	84	5,0	2,5		
Klinikte Çocukların İletişime Açık Olma Durumu						
Toplam	Evet	142	5,1	2,5	0,867	0.441
	Hayır	68	4,8	2,7		
Etik Konulara İlişkin Eğitim Alma Durumu						
	Mezuniyet öncesi	79	5,1	2,8		
	Mezuniyet öncesi ve hizmet içi eğitim	30	5,0	2,7		
Toplam	Hizmet içi eğitim	37	5,3	2,2	0,401	0.808
	Mezuniyet sonrası	20	4,5	2,2		
	Hepsi	44	4,8	2,6		

Katılımcıların çalıştıkları klinik, bakım verdiği çocukların sözel olarak iletişim kurabilme durumu ve etik konulara ilişkin eğitim alma durumuna göre PH-MDRÖ puanları arasında istatistiksel açıdan bir anlamlı bir fark yaratmamıştır ($p>0.05$).

Katılımcıların yaş ve mesleki özellikleri ile PH-MDRÖ puanı arasındaki ilişki 4.15. 'de sunulmuştur.

Tablo 4.15. Katılımcıların yaş ve mesleki özellikleri ile PH-MDRÖ puanı arasındaki korelasyonlar

Değişkenler	PH-MDRÖ puanı	
	r	p
Yaş	0,068	0.324
Meslek Çalışma Yılı	0,096	0.167
Pediyatri Çalışma Yılı	0,148*	0.033

Katılımcıların yaşı ve meslekteki çalışma yılı ile PH-MDRÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ($p>0.05$). Pediatri kliniklerinde çalışma yılı ile PH-MDRÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli ilişki bulunmuştur ($p<0.05$). Pediatri kliniklerinde çalışma yılı arttıkça PH-MDRÖ puanı artmaktadır.



5. TARTIŞMA

Bu bölümde, pediatri hemşirelerinde deneyimlenen moral distressin, sıklığını ve yoğunluğunu belirlemek amacıyla geliştirilen MDS-R ölçeğinin Türkçe geçerliğinin ve güvenilirliğine yönelik bulgular tartışılmıştır.

Geçerlik ve güvenilirlik analizleri, ölçüm araçlarının olabildiğince gerçeğe yakın ve objektif sonuçlar vermesini ve ölçme sonucunda doğru değerlendirilmeler yapılabilmesini sağlayan temel iki bileşendir (157, 169). Bu nedenle ölçme araçlarının “geçerlik” ve “güvenirlik” özelliklerine sahip olması beklenmektedir (157). Bu bölümde MDS-R ölçeğinin Türkçe formunun uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla uygulanan geçerlik ve güvenilirlik analizleri, uygulanma aşamasına göre sırayla tartışılmıştır.

5.1. PH-MDRÖ'nün Geçerliği

Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmesi istenilen özelliği ne derecede doğru ölçtüğüyle ilgili bir kavramdır (167). Bir başka deyişle, ölçme aracının ölçtüğü değişkeni başka hiçbir değişken karışmaksızın ölçebilme derecesidir (169). Ölçeklerin ve verilerin tipi ve türüne göre çeşitli geçerlik analiz yöntemleri üretilmiştir (157).

Likert tipli ölçeklerde kullanılması önerilen geçerlik analizleri; dil geçerliği, kapsam geçerliği, görünüş geçerliği, ölçüt (uyum) geçerliği, kestirim geçerliği ve yapı geçerliği analizleridir (155, 157, 167, 168). Kullanılan yöntemler, ölçeğe, örneklemin yapısı ve mevcut sınırlılıklara göre tercih edilmektedir (158). PH-MDRÖ'nün geçerlik bulgularının değerlendirilmesinde, “dil geçerliği”, “kapsam geçerliği”, “görünüş geçerliği” ve “yapı geçerliği” analizleri kullanılmıştır.

Dil Geçerliği

Dil geçerliğinin tespitinde ölçek uyarlama çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan çeviri-geri çeviri tekniği kullanılmıştır. Bu teknik kapsamında ölçeğin orijinal dili ile çevrilen dile hakim en az bir çevirmen ve en az bir geri çevirmen kullanılması önerilmektedir (157, 175). Ancak, Türkçe dilinin yapısı göz önüne alınarak, mecaz, yan ve eş anlamlı kelimelerin yoğunluğu nedeniyle, üç çevirmen ve üç geri çevirmen ile İngilizce ve Türkçe dil bilimcilerin görüşlerine başvurulmuştur.

Yapılan çeviri ve geri çeviriler arařtırmacı ve danıřmanı tarafından incelenerek en uygun olduđu dūřünölen çeviriler kabul edilmiřtir. Bu süreçler sonucunda, çeviriden kaynaklanabilecek hataların en aza indirilmesi ve maddenin orijinal anlam kaybının azaltılması amacıyla, ölçeđi geliřtiren akademisyene e-posta aracılıđı ile ulařılarak fikir alıř veriřinde bulunmuřtur.

Dil geçerliđi ařamaları sonucunda gerekli düzeltmeler yapılarak, ölçeđin dil geçerliđinin sađlandıđı ve PH-MDRÖ'nün Türkçe formunun anlaşılabilir ve uygulanabilir olduđu kararı alınmıřtır.

Kapsam Geçerliđi

Ölçeđi oluřturan maddelerin, ölçölmek istenen özelliđi ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadıđının göstergesidir (167, 169). Kapsam geçerliđinin belirlenmesine yönelik farklı yaklařımlar bulunmaktadır. En etkili yaklařımlardan biri, arařtırma konusu hakkında bilgi ve birikimi bulunan, tercihen akademisyenlerden oluřan uzmanların görüşlerine bařvurmaktır (154, 157, 166). Literatüre göre, kapsam geçerliđinin sađlıklı deđerlendirilebilmesi için en az beř, en fazla 40 uzman görüşüne sunulması gerekmektedir (157, 167). Bu dođrultuda, yapılan arařtırmanın kapsam geçerliđinin deđerlendirilmesi amacıyla, bir tıp etiđi uzmanı, bir pediatri uzman hekimi, iki pediatri akademisyen hemřire, beř psikiyatri akademisyen hemřireden oluřan, dokuz uzman görüşüne bařvurulmuřtur.

Literatür incelendiđinde kapsam geçerliđinin istatistiksel anlamda yorumlanabilmesi için Lawshe ve Davis teknikleri gibi bazı derecelendirme ve yorumlama ölçütlerinin kullanıldıđı görölmektedir (158, 159, 166). Arařtırma kapsamında ölçeđin kapsam geçerliđi sıklıkla kullanılan bir yöntem olan Davis tekniđi kullanılarak deđerlendirilmiřtir. Davis (1992) tarafından geliřtirilen tekniđe göre, görüşlerine bařvurulan uzmanların, ölçekte yer alan her bir madde için 1-4 puan (1-uygun deđil, 2-maddenin uygun řekle getirilmesi gerekir, 3-uygun ama ufak deđiřiklikler gerekiyor, 4-çok uygun) arası deđerlendirme yapmaları istenmektedir (157, 163). Deđerlendirme sırasında, maddede deđiřiklik gerektiđini dūřünen uzmanlardan öneri ve görüşlerini belirtmeleri istenmiřtir. Kapsam geçerliđi analizi sonucu madde 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 21' de uygun ufak deđiřiklikler, madde 1, 5, 8, 9, 12 ve 20 için maddenin uygun hale getirilebilmesi için

gerekli deęişikler yapılmıştır. Yapılan deęişiklerin deęerlendirilmesi için maddenin uygun hale getirilmesini talep eden uzmanların görüşüne tekrar sunulmuştur ve uygun bulunmuştur.

Literatür incelendiğinde, dokuz uzman görüşüne başvurulduğunda her bir madde için en küçük KGO'nun "0.75" ve üzeri olması gerekmekte ve düşük olan maddelerin çıkarılması önerilmektedir (157, 162). Bu doğrultuda, Tablo 4.3. incelendiğinde madde 12'nin KGO'nun "0.55" olduğu görülmektedir. Ancak, Davis tekniğine göre, en küçük KGO deęerinin altında olan maddeler, KGİ deęerinin 0.80'den büyük olduğu durumlarda çıkarılmasının gerekli olmadığı belirtilmektedir (157, 160, 163). PH-MDRÖ'nün KGİ deęeri "0.925" olduğu için madde 12 ölçekten çıkarılmamıştır.

PH-MDRÖ son olarak bir ölçme deęerlendirme uzmanı, sorumlu araştırmacı ve danışmanı tarafından deęerlendirilmiştir. Davis tekniği ile kapsam geçerliği analiz edilen PH-MDRÖ'nün maddelerinin KGO skorları, 0.55-1.00 arasında ve KGİ skoru 0.925 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, PH-MDRÖ'nün kapsam geçerliğine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Görünüş Geçerliği

Ölçeğin ismi, açıklamaları, maddelerin ve ölçeğin düzeni gibi faktörler ile beraber, ölçek maddelerinde ölçmesi amaçlanan yapıyı ölçüyor görünmesini deęerlendiren bir geçerlik türüdür (167). Bir ölçeğin görünüş geçerliğinin yüksek olmasının, yanıt verme eğilimlerini pozitif yönde etkilediği bilinmektedir (155). Literatüre göre, görünüş geçerliğinin deęerlendirilmesinde, uzman görüşü ve/veya küçük bir katılımcı grubuna ön uygulama yapılması önerilmektedir (158, 176). Bu doğrultuda, bir ölçme deęerlendirme uzmanının görüşü ve örnekleme dahil edilmeyen 10 pediatri hemşiresine ölçeğin uygulanmasıyla, görünüş geçerliği deęerlendirilmiştir. Katılımcılar ve ölçme deęerlendirme uzmanı, ölçek açıklamalarına ve ölçeğin düzenine yönelik önerilerde bulunmuş ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından PH-MDRÖ'nün görünüş geçerliği uygun bulunmuş ve ölçeğin uygulanabilir olduğu kararı alınmıştır.

Yapı Geçerliği

Yapı geçerliği, bir ölçeğin ölçülmek istenen davranış bağlamında soyut bir kavramı (faktörü) doğru bir şekilde ölçebilme derecesini göstermektedir (167). Yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde farklı araştırmacılar, farklı yöntemlerin kullanılmasını önermektedir (159). Bu araştırmada, ölçeğin yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde “faktör analizi” yöntemleri kullanılmıştır.

Faktör analizi, temelde birbiri ile bağlantılı olan değişkenleri belli bir faktör altında bir araya getirmede kullanılan istatistiksel bir yöntemdir (157, 159). Faktör analizi genel olarak, çok sayıdaki değişkenden az sayıda, anlamlı ve özet bir biçimde yeni değişkenlerin (boyutların) elde edilmesidir (158). Literatürde genel olarak AFA ve DFA olarak iki temel faktör analizi kullanılmaktadır (157, 159).

AFA, değişkenler yardımıyla araştırma örnekleminde toplanan veriler doğrultusunda faktör yapısının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu analiz yöntemi belirli bir kuramsal yapı veya belirli faktör yapılarının bilinmediği durumlarda kullanılan istatistiksel bir yöntemdir (158). DFA ise, araştırmacı tarafından belirlenen kuramsal faktör yapısının veya AFA ile belirlenen faktör yapılarının uyguladığının test edilmesinde kullanılmaktadır (157). Bu bilgiler doğrultusunda genellikle ölçek uyarlama çalışmalarında DFA, ölçek geliştirme çalışmalarında ise AFA kullanılmaktadır (160, 164, 166).

Faktör analizine her veri seti uygun olmayabilir. Bu nedenle, araştırmanın uygulandığı örneklemin faktör analizine uygunluğu ve yeterliliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir (159, 164). Bu doğrultuda, örneklem yeterliliğinin istatistiksel olarak hesaplanmasında çeşitli kural ve yöntemler bulunmaktadır. Bu kurallardan en çok kullanılanı “10 kuralı”dır. Bu kurala göre, ölçekte bu her madde için en az 10 katılımcı olacak şekilde araştırma grubuna dahil edilerek değerlendirilmektedir (157). Bir diğer kural ise “100 kuralı”dır. Araştırma örnekleminde faktör analizinin uygulanabilmesi için en az 100 katılımcı gerekmektedir (156, 159). Bahsedilen kurallar dışında araştırma örnekleminin faktör analizine uygunluğunun istatistiksel olarak hesaplanmasında iki varsayım bulunmaktadır. Bu varsayımlar KMO ve Bartlett testleridir. Literatürde KMO değerinin 0.90-1 arasında olması mükemmel; 0.80-0.89 arasında olması “çok iyi” 0.70-0.79 arasında olması “iyi” 0.60-0.69 arasında olması

“orta” 0.59-0.50 arasında olması “zayıf” ve 0.50’nin altında olması ise kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir (167). Yeterli örnekleme bir faktör analizinin yapılabilmesi için KMO değerinin en az 0.60 olması ve Bartlett’s küresellik testinin ise anlamlı çıkması gerekmektedir (157).

Bu çalışma kapsamında, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan PH-MDRÖ’nün örneklem büyüklüğü 210 kişi olarak belirlenmiştir. Bu durumun literatürde belirtilen “10 kuralı” ve “100 kuralı” uyum sağladığı görülmektedir. PH-MDRÖ’nün örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygunluk ve yeterliliğinin hesaplanması için KMO ve Bartlett’s küresellik istatistik yöntemleri uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda, KMO değeri 0,862 ve Bartlett’s küresellik testi sonucu da $\chi^2=1301,892$, $p=0.000$ bulunmuştur (Tablo 4.4). Bulgular doğrultusunda araştırmanın yapıldığı 210 pediatri hemşiresinin oluşturduğu örneklem faktör analizi için uygun ve yeterli olduğu görülmektedir

PH-MDRÖ’nün yapı geçerliğinin değerlendirilmesi amacıyla, DFA ve AFA kullanılmıştır. Öncelikle yapılan çalışmanın ölçek uyarlama çalışması olması ve mevcut bir faktör yapısının orijinal ölçekte var olması nedeniyle ölçeğin orijinal yapısının Türk dil ve kültürüne uygulununun analiz edilmesi amacıyla DFA kullanılmıştır. DFA’nın değerlendirilmesinde χ^2/SD , GFI, IFI, CFI, RMSEA ve TLI uyum indeks değerleri kullanılmıştır. DFA sonucunda, bu indekslerden yalnız χ^2/SD kabul edilebilir değer aralığında olduğu görülmektedir (Tablo 4.5). Literatüre göre DFA elde edilen standardize edilmiş regresyon kat sayısı 0.30 altında olan maddenin çıkartılması önerilmektedir (167). Ancak yapılan analizler incelendiğinde bütün maddelerin 0.30’un üstünde olduğu bulunmuştur. Dil, kapsam ve görünüş geçerliğinde madde çıkarılması yapılmayan PH-MDRÖ’nün yapı geçerliği aşamasında da herhangi bir maddenin çıkarımı yapılmamıştır. Ölçeğin orijinal yapısı ile yapılan DFA sonucunda kabul edilebilir değerlerin altında olması nedeniyle ülkemizde oluşacak olan faktör yapısının belirlenmesi amacıyla AFA uygulanmasına (177, 178) karar verilmiştir.

AFA uygulanırken sıklıkla kullanılan temel bileşenler analiz metodu (179) ve maddelerin faktörlere yüklenmelerinin daha net tespit edilmesinde genellikle tercih edilen eğik döndürme yöntemlerinden birisi olan varimax döndürmesi (157)

kullanılmıştır. Faktör sayısı açıklanan toplam varyans değeri, faktör özdeğerleri ve faktörlere ilişkin yamaç birikinti grafiği göz önüne alınarak karar verilmiştir. Açıklanan toplama varyans değerlerinin %40-%60 olması, faktör özdeğerlerinin 1'den büyük olması ve yamaç birikinti grafiğinin düzleştiği noktaya kadar oluşan yer doğrultusunda faktör sayısı belirlenmektedir (157, 158). Bu doğrultuda yapılan araştırmada, açıklanan varyans değeri % 55,298 olarak hesaplanmış, beş faktörün özdeğerinin 1'den büyük olduğu görülmektedir (Tablo 4.6). Yamaç birikinti grafiği incelendiğinde ise grafiğin beşinci faktörden sonra düzleştiği görülmektedir (Şekil 4.1). Bulgular göz önüne alındığında PH-MDÖ'nün ülkemizde beş faktörlü yapısının geçerli olduğu görülmektedir (Tablo 4.6).

AFA analizi sonucunda PH-MDRÖ'nün ülkemizde beş alt boyutu olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin orijinal yapısının tek alt boyutlu olması nedeniyle ölçek alt boyutlarının isimlendirmesine ihtiyaç duyulmuştur. İsimlendirme aşamasında araştırmacı, danışmanı ve bir tıp etiği uzmanının görüşleri doğrultusunda hemşirelik ve tıp etik ilkeleri ile moral distress modellerini temel alınarak isimlendirmeyi yapmıştır. İsimlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra ölçek Profesör Hamric ile e-posta aracılığıyla iletişim kurularak isimlendirmeler hakkındaki görüşü alınmış ve isimlendirmeler; “hasta ve ailenin özerkliği”, “yarar sağlama-zarar vermeme”, “mesleki özerklik”, “yönetmelik etik” ve “hasta savunuculuğu” olarak son halini almıştır.

Özerklik, hemşirelik etiği ve başta Corley (2002)'in moral distress modeli olmak üzere moral distress kavramına yönelik çalışmalarda sıklıkla söz edilen bir kavramdır. PH-MDRÖ'nün AFA analizleri sonucunda, aynı faktör altında toplanan, madde 3, 4, 5 ve 7 incelendiğinde, bu maddeler özerklik ile ilgili yaşanabilecek etik konular olarak yorumlanmıştır. Alt boyutun ortak temasına bakıldığında ise özerkliğin özel bir alanı olan, aile ve hastanın özerkliği (180, 181) ile ilgili durumların maddelerin ortak noktası olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle madde 3, 4, 5 ve 7'nin bulunduğu alt boyut “aile ve hastanın özerkliği” olarak isimlendirilmiştir.

Madde 2, 12, 13 ve 14 incelendiğinde ise, maddelerin özerklik alt kavramı altında ortaklaştığı ancak “aile ve hastanın özerkliği” alt boyutundan farklı olarak bahsi geçen maddelerin, hemşirelerin bir meslek mensubu olarak yaşadığı özerklik sorunlarını içerdiği düşünülmektedir. Sonuç olarak hem hemşirelik etiğinde yer alan

hem de moral distres kavram çalışmalarında yer verilen bir kavram olan mesleki özerkliğin bu alt boyutun ismi olmasına karar verilmiştir (182, 183).

Bir diğer faktör altında toplanan 1, 15 ve 16. maddeler, literatürde moral distres nedeni olarak yer alan, yöneticilerin yaptırımı, yasal yaptırımlar ve sağlık politikaları ile ilişkili olarak yorumlanmıştır. Bahsi geçen maddeler, moral distres kavramının ilk tanımından beri değişmeden varlığını koruyan ve moral distres nedeni olarak karşımıza çıkan, yasal, kurumsal ve politik engellere vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, bahsi geçen alt boyut için, etiğin yönetim süreçleri düzleminde ele alınmasını vurgulayan (184) “yönetmelik” başlığı uygun bulunmuştur.

Dördüncü faktör, tıp ve hemşirelik etiğinin geçmişten günümüze kadar geçerliğini koruyan en temel dört ilkesinin başında yer alan, yarar sağlama-zarar vermeme ilkesine göre isimlendirilmiştir. Başta hemşireler olmak üzere bütün sağlık profesyonellerinden, bu etik ilke doğrultusunda hizmet vermeleri beklenmektedir (185). Bu doğrultuda, madde 6, 8, 17, 18, 19, 20 ve 21 incelendiğinde hastanın yararının tehlikeye girdiği durumları içerdiği görülmektedir. Bu maddelerin, Corley’in modelinin ana önermelerinden biri olan, hemşireliğin ahlaki bir meslek olması ile doğrudan bağlantılı olduğu düşünülebilir. Bu nedenle bahsi geçen maddelerin bulunduğu alt boyutun isminin “yarar sağlama-zarar vermeme” olmasına karar verilmiştir.

Son faktöre yüklenen maddeler, 9, 10 ve 11. maddedir. Bu maddeler incelendiğinde, maddelerin Corley’in modelinde bahsettiği ve moral distresin en temel nedenlerinden biri olarak kabul ettiği hemşirenin hasta savunuculuğu rolünü yerine getirememesi bağlamını yansıttığı düşünülmektedir. Bu nedenle bahsi geçen alt boyutun isimlendirmesi “hasta savunuculuğu” olarak yapılmıştır (79, 186).

PH-MDRÖ’nün faktör yük dağılımı incelendiğinde 10. maddenin hem yönetmelik hem hasta savunuculuğu alt boyutuna neredeyse eşit yüklendiği görülmektedir (Tablo 4.6). Bu durum literatürde, karışık, binişik madde ya da çapraz yükler olarak adlandırılmaktadır (158, 159, 172). Faktör analizinde maddelerin ait oldukları faktörde yüksek yük, diğer faktörlerde ise düşük yük değerine sahip olması beklenmektedir. Bu durum sağlanmazsa maddelerin bağımsızlığı ve yorumlanması zorlaşmaktadır. Binişik maddelerin belirlenmesine yönelik kesin bir ölçüt olmamakla

birlikte farklı iki faktöre ait yük değerleri arasındaki farkın 0.1'den küçük olması bir kriter olarak kabul edilmektedir (167, 187). Literatürde, binişik maddelerde araştırmacı tercihi vurgulanmaktadır. Ayrıca, madde çıkarıldıktan sonra yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizlerinde önemli ölçüde iyileşme olmaması durumunda madde çıkarımı önerilmemektedir (173, 188). Literatüre göre binişik madde olarak kabul edilen madde 10, bu kapsamda değerlendirilmiş ve madde çıkarılarak yapılan DFA analizinde indeks değerlerinde önemli bir değişim olmadığı görülmüştür. Sonrasında tekrarlanan AFA analizinde ise beş faktörlü yapıyı, faktör yüklerini, özdeğerleri ve açıklanan varyans değerini 0,01-0,02 oranlarında etkilediği tespit edilmiştir. Ek olarak, Tablo 4.9. incelendiğinde 10. maddenin madde-toplam korelasyonun kabul edilebilir değerin (+0.25) (157) üstünde olduğu ve madde silindiğinde ölçeğin Cronbach α değerinin düştüğü görülmektedir. Tüm belirtilen bulgular doğrultusunda, madde çıkarıldığında ölçeğin geçerliğinin önemli ölçüde etkilememesi ve ölçeğin iç tutarlılık değerini dolayısıyla güvenirliliğinin olumsuz etkilemesi nedeniyle, maddenin ölçekten çıkarılmaması uygun bulunmuştur. Maddelerin faktör dağılımları incelenirken faktör yükleri göz önünde bulundurulduğu için madde 10'nun ait olduğu alt boyutun belirlenmesinde görece faktör yükü yüksek olan ve teorik olarak daha uygun (79) olduğu düşünülen alt boyut tercih edilmiştir.

5.2. PH-MDRÖ'nün Güvenirliliği

Literatürde güvenilirlik kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Genel anlamda güvenilirlik bir ölçeğin tutarlılık, kararlılık ve duyarlılık ölçüsüdür (157). Bu tanım doğrultusunda, bir ölçme aracı aynı gruba aynı şartlar altında tekrarlı bir şekilde uygulandığında, sonuçların birbiri ile tutarlı, belirli zaman aralıklarıyla tekrar uygulandığında sonuçların kararlı ve ölçülecek olan özelliği olabildiğince hassas ölçebilecek düzeyde duyarlılığa sahip olması, ölçme aracının güvenilir olduğu göstermektedir (158, 169). Bir ölçeğin güvenirliliğinin belirlenmesinde paralel testler yöntemi, test-tekrar test yöntemi, iç tutarlılık Cronbach α katsayısı, eş değer yarılar yöntemi ve madde analizi kullanılmaktadır (154, 157-159). Kullanılan yöntemler, ölçeğin özelliklerine, örneklemin yapısına ve mevcut sınırlılıklara göre tercih edilmektedir. PH-MDRÖ'nün güvenirliliğinin belirlenmesinde, "iç tutarlılık Cronbach α katsayısı", "eş değer yarılar yöntemi" ve "madde analizi" kullanılmıştır.

İç Tutarlılık-Cronbach α Katsayısı

İç tutarlılık, ölçekte yer alan her bir maddenin ölçek yapısının tamamıyla aynı yönde hareket edip etmediğinin bir göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer deyişle, ölçekte yer alan her maddenin ölçeğin bütünüyle arasındaki ilişkinin incelenmesidir (158, 159). Literatürde, bu ilişkinin derecesinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan ve kabul gören yöntem ise Cronbach α katsayısıdır (154, 157, 168). Analizler sonucu ortaya çıkan katsayı değeri; “0,80-1,00: ölçek yüksek güvenilirliğe sahip”, “0.60-0.79: ölçek oldukça güvenilir”, “0.40-0.59: ölçeğin güvenilirliği düşük” ve “0.00-0.39: ölçek güvenilir değil” şeklinde yorumlanmaktadır (157). Bu doğrultuda yapılan araştırmanın Cronbach α katsayısı değeri incelendiğinde PH-MDRÖ'nün yüksek güvenilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.7). Ayrıca, PH-MDRÖ'nün belirlenen alt boyutlarının Cronbach α katsayısı değerleri incelendiğinde yüksek güvenilirliğe ve oldukça güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir.

Eşdeğer yarılar yöntemi

Ölçeğin maddelerinin eş iki yarıya bölünmesi ile güvenilirliğin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir (157). Eş değer yarılar yöntem analizi yapılırken öncelikle ölçek iki gruba ayrılmaktadır. Grup ayrılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. En çok kabul gören yaklaşım ise ölçek maddelerinin tek maddeler ve çift maddeler olarak gruplandırılmasıdır (159). Eş değer yarılar yöntemi değerlendirilirken Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı ve Guttman Eş Değer Yarılar Katsayısı dikkate alınmakta ve çıkan değerlerin yorumlanması korelasyon katsayı değer yorumlanması ile paralellik göstermektedir (157). Yapılan çalışmada, PH-MDRÖ'nün eş değer yarılar yöntemi kullanılarak yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu bulunmuştur.

Madde analizi

Madde analizi, ölçekteki yer alan maddelerin ölçeğin amacına hizmet edip etmediğini incelemek amacıyla kullanılmaktadır (158). Bu doğrultuda, ölçekteki maddelerin ölçeğe katkısını incelemek amacıyla madde analizi yöntemlerinden

korelasyonlara dayalı madde analizi, madde silindiğinde Cronbach α ve madde ayırt edicilik gücü indeksi kullanılmıştır.

Korelasyona dayalı madde analizi, bir madde ile bütün arasındaki korelasyon o maddenin geriye kalan maddelerin tümünün ölçtüğü özelliği ölçüp ölçmediğini değerlendiren bir yöntemdir (159, 167). Ölçekte bulunan maddeler ile yapılan korelasyon analizi sonucu bir maddenin ölçeğin bütünü ile yaptığı korelasyon katsayısı düşük ise o maddenin ölçeğe katkısının düşük olduğu düşünülmektedir (157, 158). Bu doğrultuda, maddenin ölçeğe olan katkısının kabul edilebilir olması için, madde-bütün korelasyon katsayısı pozitif yönde ve en az $+0.25$ olmalıdır (157). Madde istenilen düzey olan $+0.25$ 'den düşük çıkmış ise ölçeğin güvenilirliğini düşürdüğü gerekçesiyle maddenin ölçekten çıkartılması önerilmektedir (155, 169). PH-MDRÖ'nün madde-toplam korelasyon katsayıları 0.308-0.574 arasında değişmektedir (Tablo 4.9). Bulgular doğrultusunda ölçek maddelerinin istenilen düzeyde korelasyon katsayılarına sahip olduğu bulunmuştur. Bu nedenle analizi yapılan maddelerin ölçeğin amacına hizmet ettiği saptanmıştır.

Cronbach α katsayısı ölçeğin iç tutarlılık güvenilirliğini gösteren bir bulgudur. Bu nedenle, madde silindiğinde Cronbach α değerleri önemli ölçüde yükseldiğinde o maddenin ölçekteki varlığı ölçeğin güvenilirliğini düşürdüğü şeklinde yorumlanmakta ve maddenin ölçekten çıkarılması önerilmektedir (158, 165). Yapılan çalışmanın, madde silindiğinde Cronbach α değerleri incelendiğinde, herhangi bir madde silindiğinde Cronbach α değerinin önemli ölçüde artmadığı görülmektedir.

Madde ayırt ediciliği

Madde ayırt ediciliği, iç tutarlılığının belirlenmesinde kullanılan diğer yöntemlerden biridir. Bir ölçekteki maddelerin, madde ile ölçülmesi beklenen özelliğe sahip olan ve olmayanları birbirinden ayırt edebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Tüm örneklem içinde yüksek puan alanların yer aldığı üst grubun ve düşük puan alanların yer aldığı grubun oluşturmasına ve bu iki grubun almış olduğu puanın analizine dayanan bir yöntemdir. Alt ve üst grupların belirlenmesine yönelik farklı yöntemler bulunmaktadır. Literatürde en yaygın kullanılan yöntem, yüksek puan alan %27 ve düşük puan alan yüzde %27'lik grubun kullanımına bağlı yöntemdir (171). Alt ve üst gruplar arasındaki farkların anlamlı çıkması, testin iç tutarlılığının göstergesi olarak

değerlendirilir. PH-MDRÖ'nün madde puan ortalamalarının, alt %27 ve üst %27'deki gruplarda karşılaştırıldığında, farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir, (Tablo 4.10). Bu sonuç, ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğunu ve ölçülmek istenen özelliği ölçmeye yönelik maddeler olduğunu göstermektedir (158, 171).

Ülkemizde moral distress ölçüm gereçlerine literatür incelendiğinde geçerlik ve güvenilirlik çalışması bulunan tek ölçeğim bu çalışmada incelenen moral distress ölçeğinin paralel formlarından biri olan yetişkin hastalara bakım veren hemşirelere yönelik moral distress scale revised adult scale (MDS-R) olduğu görülmektedir. Kargozoğlu ve ark. (2017) tarafından yapılan çalışma yoğun bakım hemşireleri üzerinde gerçekleştirilmiştir (52) . “Yoğun Bakım Ahlaki Sıkıntı Ölçeği” şeklinde isimlendirilen ölçeğin yapı geçerliği analizleri incelendiğinde dört faktörlü yapının açıklanan varyans yüzdesinin %53.1 olduğunu görülmüş ancak yazarlar tarafından ölçeğin orijinalinde olduğu gibi tek faktörlü yapının kullanımı önerilmiştir. Kızıltepe Keskin tarafından yapılan yayımlanmamış doktora tezi çalışmasında ise, moral distress scale revised adult scale (MDS-R) ölçek geçerlik ve güvenilirlik çalışması acil hemşireleri örnekleminde çalışılmıştır. Ölçekte AFA analizi sonucunda faktör yükü değerleri 0.30'un altında kalan beş madde çıkartılmış, geriye kalan 16 madde tek faktörlü bir yapı oluşturmuştur (189). Aynı dil ve kültürde yapılan geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının arasındaki bu farklılıkların moral distress modelinde de yer alan klinik faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Uluslararası literatür incelendiğinde ise ulusal literatüre benzer şekilde, MDS-R'nin pediatrik formlarının değil, yetişkin formlarının çalışıldığı görülmektedir. İran'da Sharif ve ark. (2017) ile Soleimani ve ark. (2016) tarafından yapılan bir yıl ara ile yapılan, MDS-R geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarında, bizim çalışmamızla benzer şekilde beş faktörlü bir yapı bulunmuştur. Ancak çalışma bulguları ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, nafile tedavi, hekim kararlarını sorgulamadan uygulama ve organizasyonel sorunlara yönelik üç faktörde benzer isimlendirmeleri olmakla birlikte, bu faktörlere yüklenen maddelerde ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir. (190, 191). Klinik ayırt etmeksizin, hastanede çalışan tüm hemşirelerin örneklemini oluşturduğu bu iki çalışmada faktör isimlendirmelerindeki ve benzer isimlerde olan faktörlerdeki farklı madde yüklenmeleri, moral distress yaşantısının ve bu yaşantıya yönelik yazarların yorumlarının oldukça bireysel olabildiği şeklinde yorumlanabilir.

Aynı dinin ve benzer bir kültürün paylaşıldığı, coğrafi olarak da yakınlık içinde olunan bir bölgede ve oldukça yakın zaman aralığında gerçekleştirilen çalışmamızda da bu iki çalışma ile benzer şekilde beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Her üç çalışmada da 17., 18.,19.,20. ve 21. Madde 1. faktöre yüklenmiştir. Sharif ve ark. (2017) bu faktörü, “mesleki yeterlilikte eksiklik” olarak isimlendirirken, Soleimeni ve ark. (2016)’ 11. Maddenin eklendiği faktörün sağlık çalışanlarının rollerini gösterdiğini belirtmiştir. Bizim çalışmamızda ise ortak maddelere ek olarak, 6,7,8 ve 21. Maddeler 1. Faktöre yüklenmiş ve bu faktör, etik ilkeler bağlamında “Yarar Sağlama – Zarar Vermeme” olarak adlandırılmıştır.

Diğer alt boyutlara yüklenen maddelerde farklılıklar olmakla birlikte benzerlikler de söz konusudur. Ancak çalışmalar bir arada değerlendirildiğine ilk göze çarpan konu, araştırmacıların maddeleri yorumlama ve faktör isimlendirmelerinde farklılık olduğudur. Hem Sharif ve ark. (2017) hem de Soleimeni ve ark. (2016) tarafından yapılan çalışmada “nafile tedavi” başlıklı bir faktör bulunmaktadır. Ancak 5.ve 10. Madde her iki çalışmada da bu başlık altında yer almaktadır. Diğer üç madde ise birbirinden tamamen farklıdır. Her üç çalışmada kurumsal ve yasal kısıtlamalara işaret eden bir faktör bulunmuştur. Bu faktör de benzer şekilde her üç araştırmacı tarafından farklı şekilde isimlendirilmiştir. Sharif ve ark. (2017) tarafından, hem de Soleimeni ve ark. (2016) “kişisel ve organiasyonel baskı altında bakım sağlama” olarak isimlendirilen faktör, Soleimeni ve ark. (2016) tarafından “kurumsal sınırlamalar” olarak adlandırılmıştır. Bizim çalışmamızda ise hem kurum hem de mevzuta vurgu yapması bakımından “yönetmelik etik” bu faktörün isimlendirilmesinde uygun bulunmuştur.

Lamiani ve ark. (2017) tarafından yapılan hemşire, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının örnekleme dahil edildiği çalışmada ise, ölçekten yedi madde çıkarılmıştır (192). Çıkarılan maddelerden, madde 11 sadece eğitim hastanelerinde geçerli olması, madde 10, 12 ve 21 tam anlaşılmasında ve madde 1, 13 ve 17 yapılan AFA analizi sonucunda faktörlere minimum değerden daha az yüklemesi nedeniyle ölçekten dahil edilmemiştir. Kalan 14 madde yapılan analizler sonucunda 4 faktörlü bir yapı oluşturduğu bulunmuştur. İran’da yapılan çalışmalara paralel olarak “nafile tedavi” başlıklı bir faktör bulunmaktadır. Belirtilen alt boyut ile yapılan çalışmada bulunan “Hasta ve Ailenin Özerkliği” alt boyutu ile üç madde ortaklaşmaktadır.

Sadece bir madde farklı bir boyuta yüklenmiştir. Diğer faktörler belirgin bir paralellik görülmemiştir. Yapılan çalışmalardan farklı olarak, Lamiani ve ark. (2017) tarafından yapılan çalışmada kurum ve mevzuata yönelik bir alt boyut bulunmamaktadır. Bu farkın nedeni ölçekten yedi madde çıkarılması nedeniyle ölçeğin ana yapısında önemli bir değişiklik olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ulusal ve uluslararası literatürde MDS-R geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında ortaya çıkan farklılıklar, moral distres yaşantısının, pek çok faktörden etkilendiği, bireysel özelliklerin de oldukça belirleyici olabildiği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, moral distres alanında kavramların kullanılması ve MDR-S ölçeğinde yer alan maddelerin yorumlanmasında yazarlar arasında ciddi farklılıklar olduğu da göze çarpmaktadır. Moral distresin, etik gibi felsefi boyutu oldukça güçlü ve farklı bakış açıları ile zenginleşen bir alanla yakın ilişki içinde oluşunun bu farklılıklara yol açtığı düşünülebilir. Ancak, moral distres ve ilişkili kavramlara ve alanın çok büyük bir bölümü tarafından kabul edilip aktif olarak kullanılan MDS-R'nin maddelerinin neye işaret ettiğine yönelik bir uzlaşma noktasının bulunması da kanımızca faydalı olacaktır.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, Hamric ve ark (2012) tarafından düzenlenen orjinal dili İngilizce olan Moral Distress Scale-Revised Pediatric Nurse Questionnaire (MDS-R)'ın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılarak, Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olup olmadığı incelendi. Bu amaca yönelik olarak, dil geçerliği, kapsam geçerliği, görünüş geçerliği, yapı geçerliği, iç tutarlık analizleri, eş değer yarılar yöntemi ve madde analizleri yapılarak, PH-MDRÖ'nün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği değerlendirildi.

6.1. Sonuç

- PH-MDRÖ'nün dil geçerliği için çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılarak, dil geçerliği sağlanmıştır.
- Uzman görüşleri sonucunda, PH-MDRÖ'nün maddelerinin tümünde KGİ değeri 0.925 olarak belirlenmiş ve kapsam geçerliği olduğu bulunmuştur (Tablo 4.3.).
- Ölçeğin KMO değeri (0.862) ve Bartlett's testi ($x^2=1301,892$, $p<0.001$) sonuçlarına göre verilerin birbiri ile ilişkili olduğu ve faktör analizi için uygun olduğu saptanmıştır (Tablo 4.4.).
- PH-MDRÖ'nün yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde öncelikle DFA kullanılmış, ölçeğin orijinal formatı ile yapılan DFA sonucunda, bulunan uyum indeks değerleri kabul edilebilir sınırların altında olması nedeniyle, Türk dili ve kültürüne uygun yapının belirlenmesinde AFA kullanılmıştır (Tablo 4.5.).
- Yapılan AFA sonucunda, Türk dili ve kültüründe PH-MDRÖ'nün 21 madde ve beş alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. PH-MDRÖ'nün faktör yüklerinin 0.329-0.858 arasında değiştiği ve açıklanan toplam varyansın %55,298 olduğu ve varyans değerinin yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır (Tablo 4.6.).
- AFA sonucunda PH-MDRÖ, orijinal formuna uygun olarak “Yarar sağlama-Zarar vermeme”, “Hasta ve Ailenin özerkliği”, “Mesleki özerklik”, “Yönetsel etik” ve “Hasta savunuculuğu” beş alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir.
- PH-MDRÖ'nün Cronbach alfa güvenirlik katsayıları, ölçeğin tamamı için 0.865, “Yarar sağlama-zarar vermeme” alt boyutu için 0.815, “Hasta ve Ailenin Özerkliği” alt boyutu için 0.758, “Mesleki Özerklik” alt boyutu için 0.660,

“Yönetmelik Etik” alt boyutu için 0.584 ve “Hasta Savunuculuğu” alt boyutu için 0.602 olarak belirlemiş ve yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4.7.).

- PH-MDRÖ'nün eş değer yarılar analizi sonucunda, Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı 0,891 ve Guttman Eş Değer Yarılar Katsayısı 0,891 olarak hesaplanmış ve güvenilir olduğu görülmüştür (Tablo 4.8.).
- Korelasyona dayalı madde analizi için “madde-toplam puan korelasyon katsayıları” hesaplanmış, korelasyon değerlerinin 0.308-0.574 değerleri arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 4.9.).
- PH-MDRÖ'nün maddelerinin alt-üst %27'lik dilim puan ortalamaları farkının istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ($p < 0.05$), ölçeğin ayırt ediciliğinin yeterli olduğu görülmüştür (Tablo 4.10.).
- PH-MDRÖ'nün katılımcıların sıklık boyut toplam puan ortalamaları $38,17 \pm 16,03$, rahatsızlık boyut toplam puan ortalamaları $48,5 \pm 16,0$ ve ölçek toplam puan ortalamaları $106,2 \pm 55,0$ olarak bulunmuştur (Tablo 4.11.).

Sonuç olarak; PH-MDRÖ'nün 21 madde ve beş alt boyuttan oluşan Türkçe formunun Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

6.2. Öneriler

PH-MDRÖ'nün;

- Pediatri hemşirelerinin moral distres düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
- Pediatri hemşirelerinde moral distrese yol açan durumların ortaya çıkartılması amacıyla yürütülecek çalışmalarda PH-MDRÖ'nün kullanılması,
- Pediatri hemşirelerindeki moral distresin dinamiklerinin incelenmesi için, moral distresin tükenmişlik, iş doyumu vb ve bunun gibi faktörlerle ilişki durumunu değerlendiren çalışmaların gerçekleştirilmesi,
- PH-MDRÖ'nün moral distresin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarda ölçüm aracı olarak kullanılması,

- PH-MDRÖ'nün ölçeğın orjinalinden farklı olarak belirlenen beş alt boyutlu yapının Türk kùltürü ve saėlık sistemi bağlamında daha yakından incelenmesi önerilmektedir.



7. KAYNAKÇA

1. Erdilek M. Sağlık personelinin iş stresi, iş-aile çatışması ve iş-aile-hayat tatminlerine yönelik algılarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. *Yönetim Bilimleri Dergisi*. 2015;13(26):113-34.
2. Hsu HY, Chen SH, Yu HY, Lou JH. Job stress, achievement motivation and occupational burnout among male nurses. *Journal of Advanced Nursing*. 2010;66(7):1592-601.
3. Khamisa N, Oldenburg B, Peltzer K, Ilic D. Work related stress, burnout, job satisfaction and general health of nurses. *International journal of environmental research and public health*. 2015;12(1):652-66.
4. Rujnan T. Onkoloji Hemşirelerinde İş stresi ve etkileyen faktörler. *Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi*. 2013;21(2):92-100.
5. Wu H, Chi TS, Chen L, Wang L, Jin YP. Occupational stress among hospital nurses: cross-sectional survey. *Journal of Advanced Nursing*. 2010;66(3):627-34.
6. Healy S, Tyrrell M. Stress in emergency departments: experiences of nurses and doctors. *Emergency Nurse*. 2011;19(4).
7. Tarhan M, Dalar L. Vardiyalı çalışma ve algılanan çalışma ortamının hemşirelerin ruh sağlığı durumları üzerine etkisi. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*. 2016;2(1 Cilt: 2):25-39.
8. ILO/WHO. Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health - Report. 2003.
9. Acar-Baltaş ZB. Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi; 2015.
10. Aytaç S. İş stresi oluşumu, nedenleri, başa çıkma yolları, yöntemleri. iş stresi yönetimi el kitabı. Ankara: Labour Ministry- CASGEM; 2009.
11. Eren N. Nurses' attitudes toward ethical issues in psychiatric inpatient settings. *Nurs Ethics*. 2014;21(3):359-73.
12. Lazzari T, Terzoni S, Destrebecq A, Meani L, Bonetti L, Ferrara P. Moral distress in correctional nurses: A national survey. *Nursing Ethics*. 2020;27(1):40-52.
13. Saeedi S, Jouybari L, Sanagoo A, Vakili MA. The effectiveness of narrative writing on the moral distress of intensive care nurses. *Nursing Ethics*. 2019;26(7-8):2195-2203.
14. Awosoga O, Pijl EM, Hagen B, Hall B, Sajobi T, Spenceley S. Development and validation of the moral distress in dementia care survey instrument. *J Adv Nurs*. 2018;74(11):2685-700.
15. Ramos AM, Barlem ELD, Barlem JGT, Rocha LP, Dalmolin GL, Figueira AB. Cross-cultural adaptation and validation of the moral distress scale-revised for nurses. *Rev Bras Enferm*. 2017;70(5):1011-7.
16. Jameton A. *Nursing practice: The ethical issues*. 1984. New Jersey: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall; 1984.

17. Wilkinson JM. Moral distress in nursing practice: experience and effect. *Nursing Forum*. 1987; 23(1):16-29.
18. Hamric AB. A case study of moral distress. *Journal of Hospice & Palliative Nursing*. 2014;16(8):457-63.
19. Ghasemi E, Negarandeh R, Janani L. Moral distress in Iranian pediatric nurses. *Nursing Ethics*. 2019;26(3):663-73.
20. Bordignon SS, Lunardi VL, Barlem ELD, Dalmolin GdL, da Silveira RS, Ramos FRS, et al. Moral distress in undergraduate nursing students. *Nursing Ethics*. 2019;26(7-8):2325-39.
21. Pergert P, Bartholdson C, Blomgren K, af Sandeberg M. Moral distress in paediatric oncology: Contributing factors and group differences. *Nursing Ethics*. 2018;26(7-8):2351-63.
22. Vaziri MH, Merghati-Khoei E, Tabatabaei S. Moral distress among Iranian nurses. *Iranian journal of psychiatry*. 2015;10(1):32-36.
23. DeKeyser Ganz F, Berkovitz K. Surgical nurses' perceptions of ethical dilemmas, moral distress and quality of care. *J Adv Nurs*. 2012;68(7):1516-25.
24. Silen M, Svantesson M, Kjellstrom S, Sidenvall B, Christensson L. Moral distress and ethical climate in a Swedish nursing context: perceptions and instrument usability. *J Clin Nurs*. 2011;20(23-24):3483-93.
25. Ohnishi K, Ohgushi Y, Nakano M, Fujii H, Tanaka H, Kitaoka K, et al. Moral distress experienced by psychiatric nurses in Japan. *Nursing Ethics*. 2010;17(6):726-40.
26. Cavaliere TA, Daly B, Dowling D, Montgomery K. Moral distress in neonatal intensive care unit RNs. *Advances in Neonatal Care*. 2010;10(3):145-56.
27. Dodek PM, Wong H, Norena M, Ayas N, Reynolds SC, Keenan SP, et al. Moral distress in intensive care unit professionals is associated with profession, age, and years of experience. *Journal of Critical Care*. 2016;31(1):178-82.
28. Ghasemi E, Negarandeh R, Janani L. Moral distress in Iranian pediatric nurses. *Nursing Ethics*. 2017;26(3):663-73.
29. Lee KJ, Dupree CY. Staff experiences with end-of-life care in the pediatric intensive care unit. *Journal of Palliative Medicine*. 2008;11(7):986-90.
30. Oh Y, Gastmans C. Moral distress experienced by nurses: a quantitative literature review. *Nursing Ethics*. 2015;22(1):15-31.
31. Trotochaud K, Coleman JR, Krawiecki N, McCracken C. Moral Distress in pediatric healthcare providers. *J Pediatr Nurs*. 2015;30(6):908-14.
32. Prentice T, Janvier A, Gillam L, Davis PGJAodic. Moral distress within neonatal and paediatric intensive care units: a systematic review. *Archives of Disease in Childhood*. 2016;101(8):701-8.
33. Sannino P, Gianni M, Re L, Lusignani M. Moral distress in the neonatal intensive care unit: an Italian study. *Journal of Perinatology*. 2015;35(3):214-21.

34. Trotochaud K, Coleman JR, Krawiecki N, McCracken C. Moral distress in pediatric healthcare providers. *Journal of Pediatric Nursing*. 2015;30(6):908-14.
35. Larson CP, Dryden-Palmer KD, Gibbons C, Parshuram CSJPCCM. Moral distress in PICU and neonatal ICU practitioners: a cross-sectional evaluation. *Pediatric Critical Care Medicine*. 2017;18(8):318-26.
36. Hamric AB, Blackhall LJ. Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. *Critical Care Medicine*. 2007;35(2):422-9.
37. Hamric AB, Borchers CT, Epstein EG. Development and testing of an instrument to measure moral distress in healthcare professionals. *AJOB Primary Research*. 2012;3(2):1-9.
38. Lievrouw A, Van Belle M, Benoit DD, editors. Coping with moral distress in oncology practice: nurse and physician strategies. *Oncology Nursing Forum*. 2016;43(4):505-12.
39. Hamaideh SH. Moral distress and its correlates among mental health nurses in J ordan. *International Journal of Mental Health Nursing*. 2014;23(1):33-41.
40. Özbaş AA. Onkoloji hemşireliğinde etik ikilem ve moral Distres. *Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatric Nursing-Special Topics*. 2017;3(1):19-26.
41. Jameton A. What moral distress in nursing history could suggest about the future of health care. *AMA Journal of Ethics*. 2017;19(6):617.
42. Wilson MA, editor Analysis and evaluation of the moral distress theory. *Nursing Forum*. 2018;53(2):259-66.
43. Deady R, McCarthy J. A study of the situations, features, and coping mechanisms experienced by Irish psychiatric nurses experiencing moral distress. *Perspectives in Psychiatric Care*. 2010;46(3):209-20.
44. Delfrate F, Ferrara P, Spotti D, Terzoni S, Lamiani G, Canciani E, et al. Moral Distress (MD) and burnout in mental health nurses: a multicenter survey. *La Medicina Del Lavoro*. 2018;109(2):97.
45. Ohnishi K, Kitaoka K, Nakahara J, Välimäki M, Kontio R, Anttila M. Impact of moral sensitivity on moral distress among psychiatric nurses. *Nursing Ethics*. 2018;26(5):1473-83.
46. Hamric AB. Empirical research on moral distress: issues, challenges, and opportunities. *HEC Forum*. 2012;24(1):39-49.
47. Morley G. What is “moral distress” in nursing? How, can and should we respond to it? *Journal of Clinical Nursing*. 2018;27(19-20):3443-45.
48. McCarthy J, Gastmans C. Moral distress: A review of the argument-based nursing ethics literature. *Nursing Ethics*. 2015;22(1):131-52.
49. Mobley MJ, Rady MY, Verheijde JL, Patel B, Larson JS. The relationship between moral distress and perception of futile care in the critical care unit. *Intensive and Critical care nursing*. 2007;23(5):256-63.

50. Corley MC, Elswick RK, Gorman M, Clor T. Development and evaluation of a moral distress scale. *J Adv Nurs*. 2001;33(2):250-6.
51. Wocial LD, Weaver MT. Development and psychometric testing of a new tool for detecting moral distress: the Moral Distress Thermometer. *Journal of Advanced Nursing*. 2013;69(1):167-74.
52. Karagözoğlu S, Yıldırım G, Ozden D, Çınar Z. Moral distress in Turkish intensive care nurses. *Nursing Ethics*. 2017;24(2):209-24.
53. Şahin LA. Sağlık Çalışanının İş Güvenliği ve İş Stresi [Yüksek lisans tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; 2017.
54. Eren E. Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2015.
55. Denizsever S. Hemşirelerde Karar Verme ile İş Stresi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Okan Üniversitesi; 2017.
56. Perrewé PL, Ganster DC. New developments in theoretical and conceptual approaches to job stress. England: Emerald Group Publishing Limited; 2010.
57. Kaçmaz N. Hemşirelerde iş stresi ve tükenmişlik. *Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi*. 2005;13(54):65-76.
58. Kebapçı A, Akyolcu N. Acil birimlerde çalışan hemşirelerde çalışma ortamının tükenmişlik düzeylerine etkisi. *Türkiye Acil Tıp Dergisi*. 2011;11(2):59-67.
59. Harnois, G., Gabriel, P., & World Health Organization. *Mental health and work: impact, issues and good practices*. Geneva: World Health Organization; 2000.
60. Sönmez S, Ursavaş A, Uzaslan E, Ediger D, Karadağ M, Gözü RO, et al. Vardiyalı çalışan hemşirelerde horlama, uyku bozuklukları ve iş kazaları. *Türk Toraks Der*. 2010;11:105-8.
61. Tel H, Karadağ M, Tel H, Aydın Ş. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamındaki stres yaşantıları ile başetme durumlarının belirlenmesi. *Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi*. 2003;2(1):13-23.
62. Tetik F. Çalışma Yaşamında İş Stresinin Verimlilik Üzerine Etkileri: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Uygulama [Yüksek lisans tezi]. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi; 2014.
63. Toh SG, Ang E, Devi MK. Systematic review on the relationship between the nursing shortage and job satisfaction, stress and burnout levels among nurses in oncology/haematology settings. *International Journal of Evidence-based Healthcare*. 2012;10(2):126-41.
64. Baron RA, Greenberg J. *Behavior in organizations: Understanding and managing the human side of work: Color transparencies*. England: Prentice Hall; 1997.
65. Işıklı B. Çatışma ve stres yönetimi-II Ç. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2013.

66. Miller H SA. ICN stress source [Internet]. 2011 [Erişim Tarihi 10 Ocak 2020] Erişim adresi: <http://www.apa.org/helpcenter/stress-kinds.aspx>
67. Çalık KY, Aktaş S, Bulut HK, Anahar EÖ. Vardiyalı ve nöbet sistemi şeklindeki çalışma düzeninin hemşireler üzerine etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015;2(1):33-45.
68. Lin SH, Liao WC, Chen MY, Fan JY. The impact of shift work on nurses' job stress, sleep quality and self-perceived health status. Journal of Nursing Management. 2014;22(5):604-12.
69. Mollaoğlu M, Fertelli TK, Tuncay FÖ. Hastanede çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2010;5(15):17-30.
70. Tarrant T, Sabo CE. Role conflict, role ambiguity, and job satisfaction in nurse executives. Nursing Administration Quarterly. 2010;34(1):72-82.
71. Yaşar BA. Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş Stresinin Çalışan Performansına Etkileri (Bir Kamu Hastanesi Uygulaması) [Yüksek Lisans]. İstanbul: Beykent Üniversitesi; 2014.
72. Czaja AS, Moss M, Mealer M. Symptoms of posttraumatic stress disorder among pediatric acute care nurses. Journal of Pediatric Nursing. 2012;27(4):357-65.
73. Türk Dil Kurumu. Ahlak [Internet]. 2019. [Erişim Tarihi 18 Aralık 2019] Erişim adresi: <https://sozluk.gov.tr/?kelime=>.
74. Childress JF, Beauchamp TL. Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University Press; 2001.
75. Aydın E. Tıp Etiği. İstanbul: Güneş Kitapevi; 2006.
76. WS, Holland JC Andersen B. Breitbart. NCCN clinical practice guidelines in oncology: distress management. New York: NCCN; 2013.
77. Bultz BD, Holland JC. Emotional distress in patients with cancer: the sixth vital sign. Community Oncology. 2006;5(3):311-4.
78. TDK. Sıkıntı [Internet]. 2019. [Erişim Tarihi 18 Aralık 2019] Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c64822a03f933.86554206.
79. Corley MC. Nurse moral distress: a proposed theory and research agenda. Nursing Ethics. 2002;9(6):636-50.
80. Kälvmemark S, Höglund AT, Hansson MG, Westerholm P, Arnetz B. Living with conflicts-ethical dilemmas and moral distress in the health care system. Social Science & Medicine. 2004;58(6):1075-84.
81. Nathaniel AK. Moral reckoning in nursing. Western Journal of Nursing Research. 2006;28(4):419-38.
82. Kälvmemark Sporrang S. Ethical competence and moral distress in the health care sector: A prospective evaluation of ethics rounds. Brno: Acta Universitatis Upsaliensis; 2007.

83. Pendry PS. Moral distress: Recognizing it to retain nurses. *Nursing Economics*. 2007;25(4):217-26.
84. De Villers MJ, DeVon HA. Moral distress and avoidance behavior in nurses working in critical care and noncritical care units. *Nursing Ethics*. 2013;20(5):589-603.
85. AACN. Moral distress [Internet]. 2019 [Erişim Tarihi 28 Aralık 2019] Erişim adresi: <https://www.aacn.org/clinical-resources/moral-distress>.
86. Winland-Brown JE, Chiarenza D, Dobrin A, editors. Nurse-physician perspectives on moral distress support the need to create a caring ethical work environment. *Forum Public Policy*. 2010;48(5): 172-8.
87. Sweeney CD. A DAISY Nurse: Moral Distress and End-of-Life Decisions in the Pediatric Setting. *Journal of Nursing Administration*. 2017;47(2):82-4.
88. Dyo M, Kalowes P, Devries J. Moral distress and intention to leave: a comparison of adult and paediatric nurses by hospital setting. *Intensive and Critical Care Nursing*. 2016;36:42-8.
89. Wolf LA, Perhats C, Delao AM, Moon MD, Clark PR, Zavotsky KE. "It's a burden you carry": describing moral distress in emergency nursing. *Journal of Emergency Nursing*. 2016;42(1):37-46.
90. Lusignani M, Gianni ML, Re LG, Buffon ML. Moral distress among nurses in medical, surgical and intensive-care units. *Journal of Nursing Management*. 2017;25(6):477-85.
91. Austin W, Bergum V, Goldberg L. Unable to answer the call of our patients: mental health nurses' experience of moral distress. *Nursing Inquiry*. 2003;10(3):177-83.
92. Grace PJ, Fry ST, Schultz GS. Ethics and human rights issues experienced by psychiatric-mental health and substance abuse registered nurses. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*. 2003;9(1):17-23.
93. Austin WJ, Kagan L, Rankel M, Bergum V. The balancing act: psychiatrists' experience of moral distress. *Medicine, Health Care and Philosophy*. 2008;11(1):89-98.
94. Lazzarin M, Biondi A, Di Mauro S. Moral distress in nurses in oncology and haematology units. *Nursing Ethics*. 2012;19(2):183-95.
95. Sporrang SK, Höglund AT, Arnetz B. Measuring moral distress in pharmacy and clinical practice. *Nursing Ethics*. 2006;13(4):416-27.
96. Austin W, Rankel M, Kagan L, Bergum V, Lerner G. To stay or to go, to speak or stay silent, to act or not to act: Moral distress as experienced by psychologists. *Ethics & Behavior*. 2005;15(3):197-212.
97. Moses L, Malowney MJ, Wesley Boyd J. Ethical conflict and moral distress in veterinary practice: A survey of North American veterinarians. *Journal of Veterinary Internal Medicine*. 2018;32(6):2115-22.

98. Oelhafen S, Monteverde S, Cignacco E. Exploring moral problems and moral competences in midwifery: A qualitative study. *Nursing Ethics*. 2018;26(5):1373-1386.
99. Epstein EG, Hamric AB. Moral distress, moral residue, and the crescendo effect. *The Journal of Clinical Ethics*. 2009;20(4):330.
100. Jameton A. Dilemmas of moral distress: moral responsibility and nursing practice. *AWHONN's Clinical Issues in Perinatal And Women's Health Nursing*. 1993;4(4):542-51.
101. Epstein EG, Delgado S. Understanding and addressing moral distress. *Online J Issues Nurs*. 2010;15(3).
102. Epstein EG, Whitehead PB, Prompahakul C, Thacker LR, Hamric AB. Enhancing Understanding of Moral Distress: The Measure of Moral Distress for Health Care Professionals. *AJOB Empir Bioeth*. 2019;10(2):113-24.
103. Tiedje LB. Moral distress in perinatal nursing. *The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing*. 2000;14(2):36-43.
104. Fry ST, Harvey RM, Hurley AC, Foley BJ. Development of a model of moral distress in military nursing. *Nursing Ethics*. 2002;9(4):373-87.
105. Howe EG. Fourteen important concepts regarding moral distress. *The Journal of Clinical Ethics*. 2017;28(1):3-14.
106. Peter E. Advancing the concept of moral distress. *Journal of bioethical inquiry*. 2013;10(3):293-5.
107. Corley MC, Minick P. Moral distress or moral comfort. *Bioethics Forum*. 2002;18(1-2):7-15.
108. Corley MC, Minick P, Elswick R, Jacobs M. Nurse moral distress and ethical work environment. *Nursing Ethics*. 2005;12(4):381-90.
109. Watt K, Kirschen MP, Friedlander JA. Evaluating the Inpatient Pediatric Ethical Consultation Service. *Hospital Pediatrics*. 2018;8(3):157-61.
110. Prentice T, Janvier A, Gillam L, Davis PG. Moral distress within neonatal and paediatric intensive care units: a systematic review. *Arch Dis Child*. 2016;101(8):701-8.
111. Austin CL, Saylor R, Finley PJ. Moral distress in physicians and nurses: Impact on professional quality of life and turnover. *Psychol Trauma*. 2017;9(4):399-406.
112. Elpern EH, Covert B, Kleinpell R. Moral distress of staff nurses in a medical intensive care unit. *American Journal of Critical Care*. 2005;14(6):523-30.
113. Gutierrez KM. Critical care nurses' perceptions of and responses to moral distress. *Dimensions of Critical Care Nursing*. 2005;24(5):229-41.
114. Hamric AB, Blackhall LJ. Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. *Crit Care Med*. 2007;35(2):422-9.

115. Pauly B, Varcoe C, Storch J, Newton L. Registered nurses' perceptions of moral distress and ethical climate. *Nursing Ethics*. 2009;16(5):561-73.
116. Radzvin LC. Moral distress in certified registered nurse anesthetists: implications for nursing practice. *AANA journal*. 2011;79(1):39-47.
117. Rice EM, Rady MY, Hamrick A, Verheijde JL, Pendergast DK. Determinants of moral distress in medical and surgical nurses at an adult acute tertiary care hospital. *J Nurs Manag*. 2008;16(3):360-73.
118. Penny NH, Bires SJ, Bonn EA, Dockery AN, Pettit NL. Moral Distress Scale for Occupational Therapists: Part 1. Instrument Development and Content Validity. *Am J Occup Ther*. 2016;70(4):73-81.
119. Resnik DB. Moral Distress in Scientific Research. *Am J Bioeth*. 2016;16(12):13-5.
120. Zuzelo PR. Exploring the moral distress of registered nurses. *Nursing Ethics*. 2007;14(3):344-59.
121. Powell SB, Engelke MK, Swanson MS. Moral Distress Among School Nurses. *J Sch Nurs*. 2018;34(5):390-7.
122. Rushton CH. Principled moral outrage: an antidote to moral distress? *AACN Adv Crit Care*. 2013;24(1):82-9.
123. Piers RD, Van den Eynde M, Steeman E, Vlerick P, Benoit DD, Van Den Noortgate NJ. End-of-life care of the geriatric patient and nurses' moral distress. *J Am Med Dir Assoc*. 2012;13(1):80 e7-13.
124. Fernandez-Parsons R, Rodriguez L, Goyal D. Moral distress in emergency nurses. *J Emerg Nurs*. 2013;39(6):547-52.
125. Maffoni M, Argentero P, Giorgi I, Hynes J, Giardini A. Healthcare professionals' moral distress in adult palliative care: a systematic review. *BMJ Support Palliat Care*. 2019;9(3):245-54.
126. Fogel KM. The relationships of moral distress, ethical climate, and intent to turnover among critical care nurses. Chicago: Loyola University; 2007.
127. Kada O, Lesnik T. Facets of moral distress in nursing homes : A qualitative study with examined registered nurses. *Z Gerontol Geriatr*. 2019;52(8):743-50.
128. Lamiani G, Borghi L, Argentero P. When healthcare professionals cannot do the right thing: A systematic review of moral distress and its correlates. *Journal of Health Psychology*. 2017;22(1):51-67.
129. Shoorideh FA, Ashktorab T, Yaghmaei F, Alavi Majd H. Relationship between ICU nurses' moral distress with burnout and anticipated turnover. *Nursing Ethics*. 2015;22(1):64-76.
130. Ulrich CM, Grady C. *Moral Distress in the Health Professions*. New York: Springer; 2018.
131. Rushton CH. Defining and addressing moral distress: tools for critical care nursing leaders. *AACN Advanced Critical Care*. 2006;17(2):161-8.

132. Green MM, Wicclair MR, Wocial LD, Kondrat A, Mukherjee D. Moral Distress in Rehabilitation. *PM&R*. 2017;9(7):720-6.
133. Beumer CM. Innovative solutions: The effect of a workshop on reducing the experience of moral distress in an intensive care unit setting. *Dimensions of Critical Care Nursing*. 2008;27(6):263-7.
134. Radzvin LC. The occurrence of moral distress in certified registered nurse anesthetists. ProQuest; 2008.
135. Hamaideh SH. Moral distress and its correlates among mental health nurses in Jordan. *Int J Ment Health Nurs*. 2014;23(1):33-41.
136. Ameri M, Safavibayatneed Z, Kavousi A. Moral distress of oncology nurses and morally distressing situations in oncology units. *Australian Journal of Advanced Nursing*. 2016;33(3):6-12.
137. Brandon D, Ryan D, Sloane R, Docherty SL. Impact of a pediatric quality of life program on providers' moral distress. *MCN The American Journal of Maternal Child Nursing*. 2014;39(3):189-97.
138. Af Sandeberg M, Wenemark M, Bartholdson C, Lützn K, Pergert P. To change or not to change-translating and culturally adapting the paediatric version of the Moral Distress Scale-Revised (MDS-R). *BMC Medical Ethics*. 2017;18(1):14-23.
139. Thomas TA, Thammasitboon S, Balmer DF, Roy K, McCullough LB. A Qualitative study exploring moral distress among pediatric resuscitation team clinicians: challenges to professional integrity. *Pediatric Critical Care Medicine : A Journal Of The Society Of Critical Care Medicine And The World Federation Of Pediatric Intensive And Critical Care Societies*. 2016;17(7): 303-8.
140. Janvier A, Nadeau S, Deschenes M, Couture E, Barrington K. Moral distress in the neonatal intensive care unit: caregiver's experience. *Journal of Perinatology*. 2007;27(4):203-12.
141. Çavuşoğlu H. Pediatri Hemşireliğinde Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar. *Türkiye Klinikleri Medical Ethics, Law and History-Special Topics*. 2017;3(1):47-52.
142. Prentice T, Janvier A, Gillam L, Davis PG. Moral distress within neonatal and paediatric intensive care units: a systematic review. *Archives of Disease in Childhood*. 2016;101(8):701-8.
143. Shorideh FA, Ashktorab T, Yaghmaei F. Iranian intensive care unit nurses' moral distress: A content analysis. *Nursing Ethics*. 2012;19(4):464-78.
144. Burston AS, Tuckett AG. Moral distress in nursing: contributing factors, outcomes and interventions. *Nursing Ethics*. 2013;20(3):312-24.
145. Morley G, Ives J, Bradbury-Jones C, Irvine F. What is 'moral distress'? A narrative synthesis of the literature. *Nursing Ethics*. 2017;26(7):646-62.
146. Rice EM, Rady MY, Hamrick A, Verheijde JL, Pendergast DK. Determinants of moral distress in medical and surgical nurses at an adult acute tertiary care hospital. *Journal of Nursing Management*. 2008;16(3):360-73.

147. Meltzer LS, Huckabay LM. Critical care nurses' perceptions of futile care and its effect on burnout. *American Journal of Critical Care*. 2004;13(3):202-8.
148. Wallis L. Moral distress in nursing. *AJN The American Journal of Nursing*. 2015;115(3):19-20.
149. Karakachian A, Colbert A. Nurses' Moral Distress, Burnout, and Intentions to Leave: An Integrative Review. *J Forensic Nurs*. 2019;15(3):133-42.
150. Kocaman N. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği ve rolü nedir? *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*. 2005;8(3):107-18.
151. Dawber C. Reflective practice groups for nurses: a consultation liaison psychiatry nursing initiative: part 2—the evaluation. *International Journal of Mental Health Nursing*. 2013;22(3):241-8.
152. Sharpe M. Liaison psychiatry-defining needs and planning services. *Journal of Psychosomatic Research*. 1995;39(1):103-13.
153. Mevzuat. KLP hemşireliği [Internet]. 2012. [Erişim Tarihi 23 Nisan 2020] Erişim adresi: <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.13830-ek-2%20ve%203.html>.
154. Atılgan H. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık; 2017.
155. Thorndike R, Christ, T. Psikolojide ve eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Nobel Kitabevi; 2017.
156. Adnan Kan BA. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayınları; 2000.
157. Alpar R. Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlilik. Ankara: Detay Yayıncılık; 2018.
158. Kartal M, Bardakçı S. Spss ve amos uygulamalı örneklerle güvenirlik ve geçerlilik analizleri. Ankara: Akademisyen Yayınevi; 2018.
159. Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006.
160. Ercan İ, İsmet K. Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*. 2004;30(3):211-6.
161. Pnueli A, Siegel M, Singerman E, editors. Translation validation. *International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*. New York: Springer; 1998.
162. Erkan S, Gömleksiz M. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık; 2014.
163. Davis LL. Instrument review: Getting the most from a panel of experts. *Applied Nursing Research*. 1992;5(4):194-7.
164. Karakoç AG, Dönmez L. Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. *Tıp Eğitimi Dünyası*. 2014;13(40):39-49.
165. Arıkan S, Demirlitaş N, Gültekin S. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık; 2017.

166. Erefe İ. Hemşirelik Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. Ankara:HEMAR-GE; 2004.
167. Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2007.
168. Erkuş A, Sünbül Ö, Sünbül SÖ, Yormaz S, Aşiret S. Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-II ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ve ölçme kuramları. Ankara: Pegem Yayıncılık; 2017.
169. Güler N. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık; 2017.
170. Fruet IMA, Dalmolin GL, Bresolin JZ, Andolhe R, Barlem ELD. Moral distress assessment in the nursing team of a hematology-oncology sector. Rev Bras Enferm. 2019;72(1):58-65.
171. Çetin B. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık; 2017.
172. Erkorkmaz Ü, Etikan İ, Demir O, Özdamar K, Sanisoğlu SY. Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2013;33(1):210-23.
173. Tabachnick BG, Fidell LS, Ullman JB. Using multivariate statistics. Boston: Pearson; 2007.
174. Şencan H. Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005.
175. Bolarinwa OA. Principles and methods of validity and reliability testing of questionnaires used in social and health science researches. Nigerian Postgraduate Medical Journal. 2015;22(4):195-01.
176. Holden RR. Face validity. The Corsini Encyclopedia of Psychology. 2010:1-2.
177. Çapık C. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.17(3).
178. Orçan F. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi: ilk hangisi kullanılmalı? Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2018;9(4):413-21.
179. Karaman H, Burcu A, Aktan DÇ. Açımlayıcı faktör analizinde kullanılan faktör çıkartma yöntemlerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017;37(3):1173-93.
180. Aydın E. Tıp etiğinde hasta özerkliğine saygı ilkesi. Aydın E. Tıp etiğinde hasta özerkliğine saygı ilkesi. 2003;25(2):92-97.
181. Mutlu MS. Hasta-Hekim İlişkisinde Temel Yaklaşımlar: Paternalizm ve Hasta Özerkliği. [Konu İncelemesi]. Kayseri: Kadir Has Üniversitesi; 2018.
182. Karagözoğlu Ş. Hemşirelikte Bireysel ve Profesyonel Özerklik. Turkish Journal of Research & Development in Nursing. 2008;10(3):41-52.
183. Taylan S, Alan S, Kadioğlu S. Hemşirelik Roller ve Özerklik. Turkish Journal of Research & Development in Nursing. 2012;14(3):66-76.

184. Aydın İP. Yönetmelik mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2014.
185. Burkhardt MA, Nathaniel AK. Çağdaş hemşirelikte etik. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2013.
186. Şermet E. Hemşireler İçin Hasta Savunuculuk Ölçeğinin Geliştirilmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2019.
187. Auerswald M, Moshagen M. How to determine the number of factors to retain in exploratory factor analysis: A comparison of extraction methods under realistic conditions. *Psychological Methods*. 2019; 24(4):468–491.
188. Brown TA. Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Publications; 2015.
189. Kiziltepe SK. Acil Servis Hemşirelerinde Ahlaki Sıkıntı ve Başa Çıkma Yollarını Etkileyen Faktörler [Doktora Tezi]. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 2019.
190. Sharif Nia H, Shafipour V, Allen K-A, Heidari MR, Yazdani-Charati J, Zareiyan A. A Second-order confirmatory factor analysis of the moral distress scale-revised for nurses. *Nursing Ethics*. 2017;26(4):1199-1210.
191. Soleimani MA, Sharif SP, Yaghoobzadeh A, Panarello B. Psychometric evaluation of the moral distress scale-revised among Iranian nurses. *Nursing Ethics*. 2016;26(4):1226-1242.
192. Lamiani G, Setti I, Barlascini L, Vegni E, Argentero P. Measuring Moral Distress Among Critical Care Clinicians: Validation and psychometric properties of the Italian moral distress scale-revised. *Crit Care Med*. 2017;45(3):430-7.

8. EKLER

EK-1. Hemşire Bilgi Formu

KATILIMCI FORMU

Çalışma pozisyonunuzu belirtiniz?

Klinik Akademi Yönetici Hemşire

1) Yaşınız.....

2) Cinsiyetiniz

Kadın Erkek

3) Çalıştığınız klinik

Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Diğer (Belirtiniz).....

4) Çalışmakta olduğunuz klinikte çocuklar sözel iletişim kurabilecek tıbbi durum, yaş ve gelişim düzeyinde midir?

Evet Hayır

5) Medeni Durumunuz

Evli Bekar

6) Meslekteki Çalışma Yılıınız.....

7) Pediatriye Çalışma Yılıınız.....

8) Eğitim Durumunuz

Hemşirelik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik

Bölümü

Lisans Tamamlama

Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik

Bölümü

Diğer.....

9) Etik konulara ilişkin eğitim alma durumu (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Mezuniyet öncesi

Mezuniyet sonrası

Hizmet içi eğitim

8. Bir meslektaşımın ya da hekimin tıbbi tedavi ile ilgili yaptığı hatayı kayıtlara geçirmediğini öğrendiğimde, bu konuda herhangi bir şey yapmaktan kaçınmak									
9. Sağladığı bakımın yetersiz olduğunu düşündüğüm bir hekime yardımcı olmak									
10. Bakımları konusunda kendimi nitelikli hissetmediğim hastalara bakım vermek durumunda kalmak									
11. Tıp öğrencilerinin, sadece beceri geliştirmek için hastalar üzerinde acı verici işlemleri uyguladıklarına şahit olmak									
12. Doktor ağrı kesicinin/opioidin dozunu arttırarak ölüme neden olmaktan korktuğu için, çocuğun acısını/ızdırabını azaltmada faydalı olmayan diğer uygulamalara devam etmek									
13. Hekimin, çocuğun prognozunu ebeveynleri ile konuşmama isteğine uymak									
14. Bilinçsiz bir çocuğun ölümünü hızlandıracağını düşündüğünüz halde sedatif /opiatların dozunu artırmak									
15. İlgili personel veya yetkili makamdaki kişi hiçbir şey yapılmaması konusunda talepte bulunduğu için gözlemlediğim etik meseleyle ilgili hiçbir şey yapmamak									
16. Hasta çocuğun bakımı konusunda aile ile aynı görüşte olmasam da dava açılmasından korktuğum için onların isteklerine uymak									
17. Çocuğun bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip olmayan hemşireler ya da diğer sağlık personeliyle birlikte çalışmak.									
18. Ekip içi iletişiminin yetersiz olması nedeniyle hasta bakım kalitesinin azaldığına şahit olmak									
19. Ebeveynlere yeterince bilgi verilmeden, aydınlatılmış onam alındığı durumları görmezden gelmek									
20. Aynı sağlık personelinin bakım vermesinin sağlanamaması nedeniyle hasta çocuğun bakımının zarar görmesine seyirci kalmak									
21. Hasta için güvenli olmadığını düşündüğüm sayıda hemşire veya diğer sağlık personeli ile çalışmak									

EK-3. Araştırma Davet Formu

Değerli Meslektaşım,

Bu e-postayı, pediatri kliniğinde çalışan bir hemşire olduğunuz için almış bulunmaktasınız. “Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması” başlıklı tez çalışması kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ danışmanlığında, Mustafa Sabri KOVANCI tarafından yürütülmektedir. pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin yaşamış oldukları moral distresin saptanabilmesi amacıyla yapılması planlanan çalışmada, siz sahada çalışan meslektaşlarımızın desteğine ihtiyaç duymaktayız. Araştırma kapsamında görüşlerinizin çok değerli olduğunu ve pediatri alanında çalışan hemşirelerin yaşamakta olduğu stresi azaltmada yapılacak girişimlere katkı sağlayacağını belirtmek isteriz.

Araştırma kapsamında aşağıda verilen linkde yer alan soruları cevaplamanızı talep ediyoruz. Toplan 29 sorudan oluşan çalışma yaklaşık 6-10 dakikanızı alacaktır. Çalışmaya destek vermek için anket sorularını cevaplamanızı ve bu mesaj metnini ve çalışma linkini pediatri kliniklerinde çalıştığınızı bildiğiniz meslektaşlarımıza iletmenizi rica ediyoruz.

LİNK: <https://forms.gle/f27NaxDVDiFxcSJn8>

Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ

03123051580

azize.atli@hacettepe.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI

03123051590

sabri.kovanci@hotmail.com

EK-4. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul Onayı



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Sayı : 1696657- 40,35

Konu :



ARAŞTIRMA PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Toplantı Tarihi : 14 MAYIS 2019 SALI
Toplantı No : 2019/13
Proje No : GO 19/522 (Değerlendirme Tarihi: 14.05.2019)
Karar No : 2019/13-32















Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ali ÖZBAŞ'ın sorusuna araştırmacı olduğu, Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI'nın y'taşek lisans tezi olan, GO 19/522 kayıt numaralı, "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revizyon-Ölçümlü Türkiye Formunun Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması" başlıklı proje önerisi araştırmanın gerekçe, amaç, yaklaşım ve yöntemleri dikkate alınarak incelenmiş olup, idari iznilerin tamamlanması kaydıyla 01 Temmuz 2019-01 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere etik açıdan uygun bulunmuştur. Çalışma tamamlandığında sonuçlarını içeren bir rapor önerisinin Etik Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

1. Prof. Dr. Nartem AKARSU	(Başkan)	İZİMLİ	9 Doç. Dr. Gözde GÜRGİN	(Üye)
2. Prof. Dr. Sevdâ F. MÜFTÜOĞLU	(Üye)	İZİMLİ	10 Doç. Dr. Fatma Vural OKUR	(Üye)
3. Prof. Dr. M. Yıldırım SARA	(Üye)	İZİMLİ	11. Doç. Dr. Can Ebru KURT	(Üye)
4. Prof. Dr. Nevel SAÇLAM	(Üye)	İZİMLİ	12. Doç. Dr. H. Hüseyin TURNAĞÖL	(Üye)
5. Prof. Dr. Ayşe Lale DOĞAN	(Üye)	İZİMLİ	13. Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÖKÖZ	(Üye)
6. Prof. Dr. Mintaze Kerem GÜNEL	(Üye)	İZİMLİ	14. Dr. Öğr. Üyesi Müge DEMİR	(Üye)
7. Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU	(Üye)	İZİMLİ	15. Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN	(Üye)
8. Prof. Dr. M. Özgür UYANIK	(Üye)	İZİMLİ	16. Av. Meltem ONURLU	(Üye)

EK-5. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu Protokol Revizyon Onayı

	<p>T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu</p>
Sayı : 16969557-2275	
Konu :	
	17.12.2019
<p>Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı ÖZBAŞ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi</p>	
<p>Sayın Dr. Öğr. Üyesi ÖZBAŞ,</p>	
<p>Kurulumuzun 06.11.2018 tarihli toplantısında GO 19/522 kayıt numarası ile onaylanmış olan ve "<i>Pediyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlilik Çalışması</i>" başlıklı projeniz için vermiş olduğunuz 02.12.2019 tarihli protokol revizyonu ve araştırma yeri değişikliği dilekçeniz Kurulumuzun 17.12.2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve uygun bulunmuştur. Çalışmada araştırma yerinin Çocuk Hemşireleri Derneği, Çocuk Cerrahi Hemşireleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği olarak değiştirilmiştir. Çalışma tamamlandığında sonuçlarını içeren bir rapor örneğinin Etik Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.</p>	
Bilgilerinize rica ederim	
	<p> Prof. Dr. Ayşe Lale DOĞAN Başkan</p>
<p>EK _____ : Toplantı Katılım Tutanağı</p>	
<p>Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 06100 Sıhhiye-Ankara Telefon: 0 (312) 305 1082 • Faks: 0 (312) 310 0580 • E-posta: goetik@hacettepe.edu.tr</p>	
Ayrıntılı Bilgi için: _____	

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
17/12/2019 tarih ve 2019/29 no'lu toplantı
KATILIM LİSTESİ

Prof. Dr. Ayşe Lale DOĞAN (Başkan)	
Prof. Dr. Sevda MÜFTÜOĞLU	
Prof. Dr. Yıldırım SARA	
Prof. Dr. Mintaze Kerem GÜNEL	
Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU	
Prof. Dr. Necdet SAĞLAM	
Prof. Dr. M. Özgür UYANIK	
Doç. Dr. Gözde GİRGİN	
Doç. Dr. Fatma Visal OKUR	
Doç. Dr. Can Ebru KURT	İZİNLİ
Doç. Dr. H. Hüsrev TURNAGÖL	
Dr. Öğr. Üyesi Müge DEMİR	
Dr. Öğr. Üyesi Özay GÖKÖZ	
Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN	
Av. Meltem ONURLU	

EK-6. Başvurulan Üniversite Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinden Gelen Ret Yazıları



T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
H.Ü. Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliği

Tarih: 31.05.2019 09:37
Sayı: 75967797-804.01.E.00006618540

E.606443

Sayı : 75967797-804.01
Konu : Mustafa Sabri KOVANCI (Uygulama İzni)

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 23/05/2019 tarih ve E.606443 sayılı yazınız.

İlgi yazıda Fakülteniz Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlilik Çalışması" başlıklı tezinin veri toplamaya yönelik anket uygulamasını hastanemizde yapmak istediği bildirilmiştir. Ancak hastanemizdeki yoğunluk ve iş yükünün fazla olması nedeniyle, anketin hastanemizde uygulanması uygun görülmemiştir.

Gereği için bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

e-İmzalıdır
Prof. Dr. E. Nazlı GÖNÇ
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimisi

Evrakın elektronik imzalı suretine <https://belgeolugrafisi.hacettepe.edu.tr> adresinden bcb1f321-d9ad-482b-9186-50d74a737440 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Otomatik Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

H.Ü. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliği Sıhhiye /ANKARA
Telefon:(312) 305 1142-3052802 Faks:(312) 3243284 E-posta:

ERİŞİM ÇİZİMİ





T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hastaneler Başhekimliği
Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimlik



Tarih: 25.06.2019
Sayı: -76108556-774.01.04[774.01.04]-
E.18586-E.00000645707



Sayı : 76108556-774.01.04[774.01.04]-E.18586
Konu : Azize ATLI ÖZBAŞ Anket İzmi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı)

İlgi : 18.06.2019 tarihli ve E.635054 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile Fakülteniz Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCIN'ın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması" başlıklı tezinin veri toplamaya yönelik anket uygulamasını 01 Temmuz 2019- 01 Temmuz 2020 tarihleri arasında Hastanemiz Pediatri Kliniklerinde çalışan hemşireler ile yapılabilmesi talebiniz, Başhekimliğimizce uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. A.Rıfhan AKAR
Başhekim

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Top Fak. Cad. 06280 Dikimevi - Marmak - ANKARA
Tel.No: 0312 395 63 72 / Belgeler No: 0312 362 34 41
E-Posta: cubbakli@rectorcine.ankara.edu.tr

Bilgi için:Hassan ÇİFTÇİ
Müdür
Telefon No:(312) 395 63 62

Evrak Tarih ve Sayısı: 21/06/2019-E.77559



Tarih:
21/06/2019
Sayı:
-903.07.02-
E.00000649883

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gazi Hastanesi Başhekimliği



Sayı : 42000842-199-
Konu : Anket İzmi(Arş. Gör. Mustafa
Sabri KOVANCI)

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Personel Daire Başkanlığı)

İlgi : 19/06/2019 tarihli ve 18744377-903.07.02- 75559 sayılı yazı.

İlgi yazıda, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Azize Atlı ÖZBAŞ danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Arş. Gör. Mustafa Sabri Kovancı'nın "*Pediyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize- Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlilik Çalışması*" konulu anket çalışması talebi kurumunuzda yapılan araştırma yoğunluğu nedeniyle uygun bulunmamıştır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

e-İmzadır
Prof. Dr. Ahmet DEMİRCAN
Başhekim



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN
DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. EAH - DR. SAMİ
ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI EAH TIPTA UZMANLIK VE EĞİTİM
KURULU BİRİMİ

14/06/2019 15:15 - 73799008 - 799 - E. 113



Sayı : 73799008-799
Konu : Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

İlgi: 28/05/2019 tarihli ve 35640939-799-913 sayılı yazı.

İlgi tarih sayılı yazınıza istinaden; Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğrt. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ' ın danışmanlığında Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI' nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize- Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasını kurumumuzda yapma isteği Başhekimimizce uygun bulunmamıştır.

Gereğini arz ederim

e-imzalıdır.
Doç. Dr. A. Zülfikar AKELMA
Başhekim

Babür caddesi No:36 06080 Telsizler/ Ankara

Telefon: Faks No: (0312)305 6460

e-Posta: esin.bespinar@saglik.gov.tr İnternet Adresi: esin.bespinar@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden bda7a300-0bd6-4699-bfbd-3c2badb8ec44 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Esin BEŞPİNAR

Birim Sorumlusu

Telefon No: (0 312) 305 60 40



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 72300690-799
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 20.08.2019 tarih ve 35640939-799-E.1341 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza istinaden, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Öğrt. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının uygulamasının ilgi yazıda yer alan ekli listedeki hastanelerin pediatri kliniklerinde görev yapan hemşireler ile 01.09.2019 - 01.09.2020 tarihleri arasında Hastanemizde yapma talebi, Hastanemiz Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulumuzun 16.09.2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, Hastanemiz Çocuk Hastanesi bölümünden görüş alınması karar alınmış olup, Çocuk Hastanesinin görüşü "kuruluş aşamasında olmasından dolayı çalışmanın Hastanemizde yapılması uygun bulunmamıştır" şeklindedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

e-İmzalıdır.
Op. Dr. Aziz Ahmet SUREL
Koordinator Başhekim



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH -
ANKARA ÇSHHO EAH EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BİRİMİ
25/06/2019 09:56 - 96206329 - 799 - E.130
00095846739

Sayı : 98206329-799
Konu : Arş.Gör. Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 28.05.2015 tarihli ve 35640939-799-E.913 sayılı yazımız.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri için Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması" başlıklı çok merkezli tezini hastanemizin Bilkent Şehir Hastanelerine taşınması planlandığından hastanemizde yapması uygun görülmemiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Emrah ŞENEL
Baştabip

Ziraat Mah. İrfan Baştuğ Cad. Kurtdereh Sok. Altındağ / ANKARA

Telefon: Faks No: 03123472330

e-Posta: ilhan.kuz@saglik.gov.tr İnternet Adresi: www.ankaracocuk.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 12b08814-549e-43bc-b7e8-e3749e81eeb7 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: İlhan KUZ

SAĞLIK MEMURU

Telefon No: 03125969859



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULU (TUEK)
KARAR DEFTERİ



KARAR TARİHİ: 25.07.2019
KARAR NO: 07

25.07.2019 TARİHLİ 07. KURUL KARARININ DEVAMIDIR

10. GEAH Acil Tıp Kliniğinde görev yapmakta olan Dr. Öğrt.Üyesi Sedat BİLGE'nin 17.06.2019 tarihli, SAYI:50687469-301.99-E.10326 sayılı "Akademik Çalışması Hk." konulu dilekçesi ve "Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı Değerlerinin Venöz Tromboemboli, Akut Serebral İskemi ve Akut Koroner Sendrom İle İlişkinin Değerlendirilmesi" başlıklı bireysel araştırma proje çalışması incelenmiş ve araştırma izni talebi oybirliği ile uygun görülmüştür.
11. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 19.06.2019 tarihli, SAYI: 35640939.799.E.1011 sayılı ve "Arş.Gör. Mustafa Sabri KOVANCI (Tez Çalışması)" konulu; Arş.Gör. Mustafa Sabri KOVANCI'nın, "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması" başlıklı tez çalışması incelenmiş ve çalışmanın örnekleminin alınacağı ilgili kliniğin çalışma ile ilgili uygun olmadığı yönündeki kararı göz önünde bulundurularak araştırma izni talebi oybirliği ile uygun görülmemiştir.
12. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 28.06.2019 tarihli, SAYI: 35640939.799.E.1064 sayılı ve "Doç.Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Bireysel Araştırma Proje)" konulu; Doç.Dr. Duygu HİÇDURMAZ'ın, "Onkoloji Alanında Çalışan Hemşirelerin Hastaların İntihar Riskini Tanıma ve Yönetmeye İlişkin Durumlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma" başlıklı bireysel araştırma proje çalışması incelenmiş ve araştırma izni talebi oybirliği ile uygun görülmüştür.
13. GEAH Aile Hekimliği Kliniğinde görev yapmakta olan Dr. Tuba SÜRÜCÜ'nün 05.07.2019 tarihli, SAYI: 50687469-044-E.11636 sayılı "Anket Çalışması Hk." konulu dilekçesi ve "Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastalarda Beslenme Durumu" başlıklı bireysel araştırma proje çalışması incelenmiş ve araştırma izni talebi oybirliği ile uygun görülmüştür.
14. GEAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görev yapmakta olan Doç.Dr. Erman ATAŞ'ın 11.07.2019 tarihli, SAYI: 50687469-030-E.11979 sayılı "Akademik Çalışma Hk." konulu dilekçesi ve "Pediatrik Hodgkin Lenfoma Hastalarında Tedavi Sonu CR (Tam Remisyon) Olan ve Sonrasında Nüks Olanlarda Prognostik Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı bireysel araştırma proje çalışması incelenmiş ve araştırma izni talebi oybirliği ile uygun görülmüştür.
15. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 05.07.2019 tarihli, SAYI: 35640939.799.E.1117 sayılı ve "Dr.Öğrt.Üyesi Gülay YAZICI'nın (Bireysel Araştırma Projesi)" konulu; Dr. Öğrt.Üyesi Gülay YAZICI'nın, "Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Adli Vakaya Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi" başlıklı bilimsel araştırma proje çalışması incelenmiş ve bahse konu çalışmanın metodolojisinde eksikliklerin olması, tıbbi hizmette aksamaya yol açabileceği ve çalışmada kullanılacak olan anket/ölçek formundaki bazı soruların idari hususları içermesi nedenleriyle araştırma izni talebi oybirliği ile uygun görülmemiştir.
16. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 11.07.2019 tarihli, SAYI: 35640939.799.E.1144 sayılı ve "Emine Nurdan CEYHAN (Tez Çalışması)" konulu; Yüksek Lisans Öğrencisi Emine Nurdan CEYHAN'ın, "Çocukluk Aşılı Hakkında Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Aşı Tereddütü Ölçeği'nin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması" başlıklı tez çalışması incelenmiş ve araştırma izni talebi oybirliği ile uygun görülmüştür.

(Handwritten signatures and initials)



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ



SUAM Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

KARAR TARİHİ :13.09.2019

KARAR NO : 14

KARAR

10. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Mustafa Sabri KOVANCI'nın, "Pediatri Hemşireleri için Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" konulu çalışmasının hastanemizde yapılması uygun bulunmamış olup reddine,

Karar verilmiştir.

Prof. Dr. Salim ERKAYA
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fulya KAYIKÇIOĞLU
Eğitim Görevlisi

Doç. Dr. İstemi HAN ÇELİK
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sadıman KIYKAÇ
ALTINBAŞ
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yaprak USTUN
Başhekim



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ - T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
13/09/2019 17:00 - 43278876 - 799 - E. 4340



00101075094

Sayı : 43278876-799
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
(Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlıkın Geliştirilmesi Birimi)

İlgi : 20/08/2019 tarihli ve 35640939-799-1341 sayılı yazınız.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğr.Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu tez çalışmasını hastanemizde yürütme talebi, Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulunun 10.09.2019 tarih ve 48 no'lu toplantısında görüşülmüş olup, uygun görülmemiştir.

Bilgilerinizi arz ederim.

e-imzalıdır.
Doç.Dr.Davut AKDUMAN
Başhekim

Pınarbaşı Mah. Ardahan Sok. No:25 Keçiören/ANKARA

Telefon: 0312 356 9000 Faks No: 0312 356 90 20

e-Posta: harun.hamarat@saglik.gov.tr İnternet Adresi: www.akcah.gov.tr

Bilgi için: Harun HAMARAT

BÜRO PERSONELİ

Telefon No: 0312 356 9000/1379

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 283750b6-33fc-46cb-a554-f4a6f6c5f697 kodu ile erişebilirsiniz.
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden c8e4517c-bb44-4b39-b2fc-28ca01ba01fd kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ
- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ

05/09/2019 14:31 - 82478784 - 799 - E_2941



00100509179

Sayı : 82478784-799
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
(Sağlığın Geliştirilmesi Birimi)

İlgi : 20/08/2019 tarihli ve 35640939-799-1341 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğrt.Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasına yönelik izin talebi Hastane Yöneticiliğimizce değerlendirilmiş olup uygun görülmemiştir.

Gereğini arz ederim.

e-İmzalıdır.

Uzm. Dr. Rana ÇİTİL
Başhekim V.

ar Mah. Dikmen Cad. No: 312

Bilgi için: Rahşan Güner GEÇİM

ir: Faks No: 3125932930

HEMŞİ

ir: Rahsan.GunerGecmez@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

Telefon No: 03125932929 / 40

g.unergecmez@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 407ac2e4-6990-4a37-b3d7-4378af6a60969 kodu ile erişebilirsiniz.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden c8e4517c-bb44-4b39-b2fc-28ca01ba01fd kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Akçurt Devlet Hastanesi



Sayı : E0411026-799
Konu : Arş.Gdr.Ahmetoğlu Sabri KÖMÜRCİ
(Tee Çalışması)

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
(Sağlığın Geliştirilmesi Birimi)

İlgi : 20/08/2019 tarihli ve 35640939-799-1341 sayılı yazı.

İlgide bahsi geçen tee çalışmasının hastanemizde yapılması pediatri kliniğimiz
olmadığından uygun görülmemiştir.
Bilginize arz ederim.

e-İmzalıdır.
Uzm.Dr. Adem YALÇINKAYA
Devlet Hastanesi Başhekimisi



T.C.
BALA KAYMAKAMLIĞI
Bala İlçe Entegre Devlet Hastanesi

BALIKIŞIRI BALI İLÇE ENTİGRE DEVLET HASTANESİ
BALIKIŞIRI BALI İLÇE ENTİGRE DEVLET HASTANESİ
15640939-799-1341



Tarih:
01.10.2019
Sayı: /799/
E.00000002046

Sayı : 30780121-799
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tet Çalışması)

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
(Sağlığın Geliştirilmesi Birimi)

İlgi : 2008/2019 tarihli ve 15640939-799-1341 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazı ile Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğet.Üyesi Azizce ATLI ÖZBAŞ'ın denetimliğinde Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revizör-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının uygulanmasını ekli listedeki hastanelerin pediyatri kliniklerinde görev yapan hemşireler ile 01 Eylül 2019-01 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmasına yönelik gerekli izin talebi yazısı Başhekimliğimizce incelenmiştir.

Hastanesimizde Pediyatri kliniği olmadığından tez çalışması yapılması uygun görülmemiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

e-İmzalıdır.
Dr.Sabahattin ÖZKAYA
Bağışçip



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Tarih:
01.10.2019
Sayı : 799
E.000000290

Sayı : 33373887-771
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
ASM SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ BİRİMİ

İlgi : Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, ASM Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlıkın Geliştirilmesi Biriminin 20/06/2019 tarihli 33640939-799-1341 sayılı ve 99586280 barkod no'lu yazısı.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğrt.Üyesi Azize ATLI ÖZBAS'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pedatri Hemşireleri için Moral Distres Revizor-Ölçeği" Türkiye Formasyon Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının uygulamasını başlatmanız pedatri kliniklerinde görev yapan hemşireler ile 01 Eylül 2019-01 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmasını yönelik tezin talebi ilgi yazı ile izlenmiştir.

Söz konusu çalışmada kullanılacak olan anket soruları hastane yöneticiliğinizde incelendiğinde, anket sorularında daha çok çocuk yoğun bakım ve çocuk onkoloji ünitelerinde çalışan hemşireleri ilgilendirdiği dâğıtılarak ve hastanemizde bu ünitenin bulunmaması nedeniyle ille bahse konu talep uygun bulunmamıştır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-İmza ile,
Prof.Dr.Gülten KIVYAK
Başhekim



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurttaş Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Tarih:
01/10/2019
Sayı :799
E.00000002946

Sayı : 2003663-799
Konu : Tez Çalışması/
Mustafa Sabri KOVANCI

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Geliştirilmesİ Birimi

İlgİ : 20/08/2019 tarihli ve 35640939-799-1341 sayılı yazınız.

İlgİ tarih ve sayılı yazı ile bildirilen Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğrt.Üyesi Aziz ATLI ÖZBAŞI'nı danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Önceği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenlik Çalışması" konulu tez çalışmasını TUEK'de değerlendirilebilmesi için, hastanemizin web sayfası içerisinde bulunan TUEK sekmesi altında yer alan "TUEK Çalışma Başvuru Formu" ve çalışmanın yapılacağı Kliniğin eğitim sorumlusu ile görüşmek "İlgili Klinik Onay ve Başvuru Formu"nun doldurulması gerekmektedir.

İlgiliye öze konusu formlarla başvuru yapması gerektiği iletildiği olup evraklar getirilmediğinden değerlendirmeye alınamamıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-İmza/dr.
Prof.Dr. Fevzi ALTUNTAŞ
Başhekim



26.08/2019 13:54 - 65804141 - 799 - E.1916



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi

Sayı : 65804141-799
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : İl Sağlık Müdürlüğünün 20/08/2019 tarihli ve 35640939-799-1341 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıda Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğrt.Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının pediatri kliniklerinde görev yapan hemşireler arasında yapılmasına yönelik gerekli izin talebi hastanemiz Eğitim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir.

Pediatri servisinde uzun süreli yatışların olmamasından dolayı sabit hemşire görevlendirmesi bulunmadığından, çalışmaya dahil edilme kriterleri arasında yer alan "En az 6 aydır çocuk hastalarla çalışıyor olmak" kriterini karşılamadığı düşünülmekte olup, durumun tarafınızca değerlendirilmesi hususunda;

Gereği için bilgilerinizi arz ederim.

e-imzalıdır.
Uzm. Dr. Hamza BOZKURT
Başhekim

EK-7. Başvurulan Üniversite Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinden Gelen İzin Yazıları



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Duatepe Devlet Hastanesi



Sayı : 39668018/799
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Sağlığını Geliştirilmesi Birimi

İlgi : 20.08.2019 tarihli ve 99686280 sayılı yazınız.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğr.Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Düzres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışması Hastane Yöneticiliğimize uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-İmzalıdır.
Dr.Hüseyin ARSLAN
Başhekim

Polatlı Devlet Hastanesi/ Personel Birimi 0 (312) 638 29 38/1610

İlgi için Güler KAYA

Telofon : Faks No: 03126304038

ŞEF

e-Posta: guler.kaya@ogsa.gov.tr İnternet Adresi: Ankara - Eğitimci Kurumları

Telofon No: 03126304038

Önemli İhtisatı Mak. Abdülaziz Cad.No:2 FİYATLİ

Bu belge 2020 sayılı e-Devlet Kanunu ile elektronik ortamda yayımlanmıştır ve elektronik ortamda onay gerektirmez. Bu belgeyi elektronik ortamda onay gerektirmez. Bu belgeyi elektronik ortamda onay gerektirmez. Bu belgeyi elektronik ortamda onay gerektirmez.



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Şehit Sait Ertekin Devlet Hastanesi



Tarih:
01/10/2019
Sayı : 799
E.000000000000

Sayı : 20945601-799
Kona : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı'nın 20/08/2019 tarihli ve 99652540 barkodlu yazısı.
İlgi: 20.08.2019 tarih ve 99686280 barkodlu yazısı;

İlgide kayıtlı yazı ile Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğrt.Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pedatri Hemşireleri için Moral Distres Revizor-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının pedatri kliniklerinde görev yapan hemşireler ile 01 Eylül 2019-01 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmasına yönelik gerekli tüm talebi belirlenen süreçte tarafımdan yürütülmesi, katılımların gönüllülük esasıyla dayandırılarak katılımcıların yazılı onaylarının alınması, çalışma sonucunun Bakanlığımızın bilgisi dışında ilan edilmemesi, başka bir amaçla kullanılmaması, hakta emsal ve kişilerin zarar görmemesi, ayrıca söz konusu çalışma sonucunun bir örneğinin ilgili üniversite tarafından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesi kaydıyla sağlık sisteminde yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

e-İmzalıdır.
Uzm. Dr. Sibel ÖNSAT
Başhekim Yardımcısı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK POLİSİSİ
HASTANESİ - MÜHÜRLEME ÖLÇÜLERİ
KODU: 0011, 001101, 00110101



Tarih:
05.10.2019
Sayı : 798
E.00000002996



Sayı : 90932776-804.01
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışmanı)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

İlgi : 20.08.2019 tarih ve E.1341 sayılı yazınız.

İlgi gün ve sayılı yazınızda belirtilen, "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması" konulu yönlük İsmail İzzet Çelikkaya'nın uygulamasına yönelik tez çalışmasının Ancağırma Görevlisi Mustafa Sabri KOVANCI tarafından yapılması kaydıyla sakınca bulunmamaktadır.

Bilgileriniz arz ederim.

e-İmza ile
Uz.Dr.Reyhan ÖZTÜRK
Başhekim

Haymana İHS-İHH Hastaneler Birimi Çocuk İleri

Tel: 0312 658 24 78

e-Posta: ihh@hsa.gov.tr / ihh@hsa.gov.tr / ihh@hsa.gov.tr

Bilgi İçin: Vildan ARABACI

0312 658 24 78

Tel: 0312 658 24 40

© 2019 Sağlık Bakanlığı. Tüm hakları saklıdır. Bu belge, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Herhangi bir şekilde izinsiz olarak çoğaltılması, yayımlanması veya dağıtılması yasaktır.



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi



Tarih:
01.10.2019
Sayı: 199
E.0808002982

Sayı : 71734248-799
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması) Hk.

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
ASM Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
(Sağlığın Geliştirilmesi Birimi)

İlgi : 2008/2019 tarihli ve 35640039-799-1341 sayılı yazı.

İlgi yazı gereği; "Pediyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkiye Formunun Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışması uygulamasının yapılmasına yönelik istek Hastanemizce değerlendirilip uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-İmzalıdır.
Uzm. Dr. Hakan ÇİME
Başhekim

108. Yıllık Ayhan Cad.No:1 Nallıhan/ANKARA

Tel:0312 7855882

e-Posta: ayhan.nallihan@sağlik.gov.tr İnternet Adresi: Ayhan MÜTLÜ (VTR)

E-Posta:ayhan.nallihan@sağlik.gov.tr Tel:03127855882 (1063)

Bağlı İsim Ayhan MÜTLÜ

SÜREKLİ İÇİ

Tel:0312 785 10 41

Evrensel elektronik imza sistemi kullanılarak hazırlanmıştır. Evrensel elektronik imza sistemi hakkında bilgi için lütfen www.saglik.gov.tr adresinden adresimiz, 1 412 412 veya 0312 344 96 09 47 telefon ile iletişime geçiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi

TC SAĞLIK BAKANLIĞI DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ
SAĞLIK İL SAĞLIK BAKANLIĞI DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ



Tarih:
01/10/2019
Sayı : 199
E-ÖZEL/007994

Sayı : 22568850
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
Tez Çalışması Hk.

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
(Sağlık Hizmetleri Başkanlığına)

İlgi : 20/08/2019 tarihli ve 1341 sayılı yazınız.

İlgide sayılı yazınıza istinaden; Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğr.Üyesi Azizce ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediyatri Hemşireleri İçin Menal Diyabet Revize-Ölçüçü Yürüye Formunun Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının uygulanması hastanemizde yapma talebi Başbekirliğimize uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederim.

e-İmzalıdır.
Uzm. Dr. Mustafa H. TÜRKKANI
Başhekim



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 93471371-799
Konu : Arş. Gör. Mustafa Sabri KAVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
(Sağlığın Geliştirilmesi Birimine)

Not :İlgi : 19/06/2019 tarihli ve 35640939-799-1011 sayılı yazımız.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğrt.Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KAVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının uygulamasını hastanemizde yapması uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

e-İmzalıdır.
Uzm. Dr. Mustafa Sırrı KOTANOĞLU
Başhekim V.

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sakarya Mh. Ülucanlar Cd.
No:89 Altındağ / ANKARA
Telefon: Faks No: 0 312 595 31 01

e-Posta: talip.tur@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ankaracah5.personel@saglik.gov.tr
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1bcd3db4-3e1f-49e2-8d5a-61e117300b8f kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Talip TÜR

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 312) 595 30 81



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi

Sayı : 66954450
Konu : Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI
(Tez Çalışması)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Sağhım Geliştirilmesi Birimi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr.Öğrt.Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ'ın danışmanlığında Arş.Gör.Mustafa Sabri KOVANCI'nın "Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması" konulu yüksek lisans tez çalışmasının 01 Eylül 2019-01 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmasına yönelik konulu tez çalışması ile ilgili yapmış olduğu talep uygun olarak değerlendirilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Op. Dr. Ömer ŞAHİN
Başhekim

EK-8. Çocuk Hemşireleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği izin yazıları

Çocuk Hemşireleri Derneği İzin Yazısı

Pediyatri Hemşireleri Çalışması

Serap Balci <seraybalci@hotmail.com>
27.03.2020 Cum 13:19
Siz

Sayın Mustafa Sabri Kovancı,
Çocuk Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu olarak, yapacağınız çalışmayı dernek üyelerimizle paylaşabileceğinizi belirtir, başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç.Dr. Serap Balci (Dernek Başkanı)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Abide-i Hürriyet Cad. 34381 Şişli - İstanbul
Tel : 0 212 440 00 00 – 27025
Faks : 0212 224 49 90
E-mail: seraybalci@hotmail.com; sbalci@istanbul.edu.tr

mustafa sabri kovanci
10.12.2019 Sal 12:51
seraybalci@hotmail.com

EK 1 etik kurul raporu.pdf 410 KB
EK 2 çalışma protokolü.docx 32 KB
EK 3 enstitü kurul kararı.pdf 304 KB
EK 4.docx 13 KB
MD pediatri ölçeği.docx 29 KB

6 ekin (810 KB) tümünü göster Tümünü indir Tümünü OneDrive'a kaydet

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Serap BALCI,

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans öğrenciyim, aynı zamanda aynı ana bilim dalında araştırmaya görevlisi olarak çalışmaktayım. Dr.Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş'ın danışmanlığında "Pediyatri Hemşireleri İçin Revize Edilmiş Moral Distres Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Güvenirlilik Çalışması" isimli yüksek lisans tezi çalışmasını yürütmekteyim. Bu bağlamda, çalışmayı yapabileceğimiz pediatri hemşiresi olan meslektaşlarımızı ulaşılabilmemiz konusunda, derneğinizin desteğine ihtiyac duyuyoruz.

Çalışmaya ilişkin dilekçe, çalışma protokolü, etik kurul onayı, enstitü onayı, duyuru metni (Çalışma linki) ve ölçek ektedir.

Saygılarımla...

Türk Hemşireler Derneği

Pediyatri Hemşireleri Çalışması

Türk Hemşireler Derneği <info@thder.org.tr>
27.04.2020 Pzt 08:57
Siz; Azize Atlı Özbaş

Sayın Kovancı,
Çalışmanız uygun bulunmuş, şube başkanlarımızla paylaşılmıştır.
İyi günler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
THD Genel Merkez

mustafa sabri kovanci
24.04.2020 Cum 02:29
thd

EK 1 etik kurul raporu.pdf 410 KB
EK 2 çalışma protokolü.docx 32 KB
EK 3 enstitü kurul kararı.pdf 304 KB
EK 4.docx 13 KB
MD pediatri ölçeği.docx 29 KB

6 ekin (810 KB) tümünü göster Tümünü indir Tümünü OneDrive'a kaydet

Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kuruluna,

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans öğrenciyim, aynı zamanda aynı ana bilim dalında araştırmaya görevlisi olarak çalışmaktayım. Dr.Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş'ın danışmanlığında "Pediyatri Hemşireleri İçin Revize Edilmiş Moral Distres Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik Güvenirlilik Çalışması" isimli yüksek lisans tezi çalışmasını yürütmekteyim. Bu bağlamda, çalışmayı yapabileceğimiz pediatri hemşiresi olan meslektaşlarımızı ulaşılabilmemiz konusunda, derneğinizin desteğine ihtiyac duyuyoruz.

Çalışmaya ilişkin dilekçe, çalışma protokolü, etik kurul onayı, enstitü onayı, duyuru metni (Çalışma linki) ve ölçek ektedir.

Saygılarımla...

EK-9. Aydınlatılmış Onam

PEDİATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN MORAL DİSTRES REVİZE-ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Değerli Katılımcı,

Moral Distres “Bir kişinin yapılacak doğru eylemi bilmesine rağmen, kurumsal kısıtlamalar nedeniyle doğru eylem sürecini takip etmenin neredeyse imkânsız olduğu durumlarda yaşadığı sıkıntı” olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, Hamric ve ark. (2012) tarafından geliştirilen “Moral Distress Scale-Revised Pediatrics Nurse” in Türkçe uyarlamasını, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaparak alana özgü yeni bir ölçme aracı kazandırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın ismi “Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması”dır.

Sizin de bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Araştırmaya katılıp katılmamakta serbestsiniz, katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız. Araştırma, araştırmacı tarafından verilen anketten oluşup, yaklaşık 20 dk sürecektir.

Bu araştırmayı yapmak istememizin nedeni, pediatri hemşirelerinin moral distress düzeylerini belirleyip, çıkan sonuçlar doğrultusunda çözüm yolları geliştirmektir.

Araştırma için Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alınmış alınmıştır. Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. Sizinle ilgili bilgiler gizli tutulacak, ancak çalışmanın kalitesini denetleyen görevliler, etik kurullar ya da resmi makamlarca gereği halinde incelenebilecektir.

Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır, çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekme hakkına da sahipsiniz.

(Katılımcının Beyanı)

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş danışmanlığında Arş. Gör. Mustafa Sabri Kovancı tarafından yapılacağı belirtilen araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı ve bu araştırmaya “katılımcı” olarak davet edildim.

Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacılar ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağına bilincindeyim). Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.

Araştırma sırasında herhangi bir sorun ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Arş. Gör. Mustafa Sabri Kovancı’ya 05074782177 (cep) no’lu telefondan ve HÜHF Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı adresinden arayabileceğimi biliyorum.

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim.

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.

Kabul ediyorum.

EK-10. MDS-R Ölçeğinin Yazarının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasına Yapılmasına İlişkin Onay Yazısı

Pediatric Version of the MDS-R

mustafa sabri kovanci
6.08.2018 Pzt 14:27
abhamric@vcu.edu

Dear Hamric

I am Mustafa Sabri Kovanci a research assistant at Hacettepe University Faculty of Nursing in Turkey. I have previously requested permission from you for the purpose of studying the reliability validity for the pediatric version of the MDS-R. I contacted the people on the list of Turkish academics that you had sent before. They have stated that they do not study on the pediatric version of MDS-R. So I would like to ask you for permission to study the reliability of the pediatric version of the MDS-R and information on scoring and interpretation.

Best regards....

Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği ABD

sabri.kovanci@hotmail.com
msabri.kovanci@gmail.com
Sıhhiye, Ankara, Turkey

Mustafa Sabri KOVANCI, RN, MSN
Research Assistant
Hacettepe University

Pediatric Version of the MDS-R

Nurse Pediatric Questionair... 78 KB
Whitehead_et_al-2015-Journa... 128 KB

2.41 (208 KB) Tümünü indir Tümünü OneDrive'a kaydet

Dear Ms. Kovanci,

My apologies for the delay in my response. I am happy to give you permission to use the MDS-R pediatric nurse version, and have attached it. Thank you for writing and for your interest in the Moral Distress Scale - Revised (MDS-R). I am assuming that you are only interested in the pediatric nurse version. Let me know if you wish to use the other pediatric versions as well.

Scoring: The MDS-R has a unique scoring scheme, designed to give a measure of current level of moral distress. Conceptually, items that have never been experienced or are not seen as distressing do not contribute to an individual's level of moral distress. As noted, the Likert scales for each item have been adjusted to 0-4 from Corley's original 1-7 scoring range. To generate a composite score, the frequency score and intensity (named "level of disturbance") score for each item should be multiplied; note that this results in eliminating items never experienced or not distressing from the composite score. In addition, items rarely experienced or minimally distressing have low scores and items experienced frequently and as most distressing have higher scores. Each item product of frequency and intensity will range from 0 to 16. To obtain a composite score of moral distress, these individual item products should be added together. Using this scoring scheme allows all items marked as never experienced or not distressing to be eliminated from the score, giving a more accurate reflection of actual moral distress. The resulting score based on 21 items will have a range of 0-336.

Interpretation: There is no firm "score" that indicates high, medium, or low moral distress, as this is a relatively new instrument and it is a norm-referenced measure. In my studies, I have worked with "cut scores", where I divide the sample into three groups based on the scores (high, medium, and low groups). Then I compare the high and low scorers against selected other variables - see Hamric & Blackhall for an earlier description of the differences between high and low scoring groups.

With that said, we are gathering data that show that moral distress is associated with individuals considering leaving their positions. I think we could safely say that someone who leaves a position due to moral distress has "high" moral distress in that setting, where someone who never considered leaving has "low" (or at least lower) moral distress. I'm attaching a copy of our latest research using a large sample of professionals from various disciplines. Look at Table 4 at the top of page 6. It shows that individuals who considered or left previous positions or were considering leaving their current position had MDS-R mean scores of 92 - 108. Individuals who had not or were not considering leaving had scores of 54 - 70. In the earlier study validating the MDS-R we saw somewhat higher scores - look at Table 6, page 6 in the Hamric, Borchers, & Epstein article on developing and testing the MDS-R; these subjects were only in ICU settings. That second study separates the responses of nurses and physicians.

So I think you have two possible approaches to trying to interpret whether a score indicates "high" moral distress:

1. you could say that the scores I described from previous studies are an indication of high distress versus low distress.
- OR, and I think this second approach is stronger,
2. you could say that in your study, scores associated with intentions to leave or stay in a position are indicative of high versus low moral distress in your study population. If you are not familiar with using cut scores in data analysis, please find a statistician with whom you can consult.


I am happy to give you permission to use the MDS-R. I do request that you let me know your findings from your project. If you decide to change items for particular specialty purposes or for different settings or outside the USA, I request that you keep me informed of the changes you make and the results you obtain.

I hope this information is clear. Let me know if you have further questions.

Thank you for your interest in moral distress.

Ann Hamric

Ek-11. Turnitin Dijital Makbuz ve Orijinallik Raporu



Dijital Makbuz

Bu makbuz ödevinizin Turnitin'e ulaştığını bildirmektedir. Gönderiminize dair bilgiler şöyledir:

Gönderinizin ilk sayfası aşağıda gönderilmektedir.

Gönderen:	Mustafa Sabri Kovancı
Ödev başlığı:	Tez
Gönderi Başlığı:	PEDIATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN
Dosya adı:	MOR...turnitin.docx
Dosya boyutu:	459.46K
Sayfa sayısı:	85
Kelime sayısı:	19,394
Karakter sayısı:	135,818
Gönderim Tarihi:	30-Nis-2020 06:37PM (UTC+0300)
Gönderim Numarası:	1312174931

İÇERİK

Ödevinizin ilk sayfası aşağıda gönderilmektedir. Gönderiminize dair bilgiler şöyledir:

Gönderen: Mustafa Sabri Kovancı

Ödev başlığı: Tez

Gönderi Başlığı: PEDIATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN

Dosya adı: MOR...turnitin.docx

Dosya boyutu: 459.46K

Sayfa sayısı: 85

Kelime sayısı: 19,394

Karakter sayısı: 135,818

Gönderim Tarihi: 30-Nis-2020 06:37PM (UTC+0300)

Gönderim Numarası: 1312174931

İÇERİK

Ödevinizin ilk sayfası aşağıda gönderilmektedir. Gönderiminize dair bilgiler şöyledir:

Gönderen: Mustafa Sabri Kovancı

Ödev başlığı: Tez

Gönderi Başlığı: PEDIATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN

Dosya adı: MOR...turnitin.docx

Dosya boyutu: 459.46K

Sayfa sayısı: 85

Kelime sayısı: 19,394

Karakter sayısı: 135,818

Gönderim Tarihi: 30-Nis-2020 06:37PM (UTC+0300)

Gönderim Numarası: 1312174931

İÇERİK

Ödevinizin ilk sayfası aşağıda gönderilmektedir. Gönderiminize dair bilgiler şöyledir:

Gönderen: Mustafa Sabri Kovancı

Ödev başlığı: Tez

Gönderi Başlığı: PEDIATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN

Dosya adı: MOR...turnitin.docx

Dosya boyutu: 459.46K

Sayfa sayısı: 85

Kelime sayısı: 19,394

Karakter sayısı: 135,818

Gönderim Tarihi: 30-Nis-2020 06:37PM (UTC+0300)

Gönderim Numarası: 1312174931

TEZİN ADI: PEDIATRİ HEMŞİRELERİ İÇİN MORAL DİSTRES REVİZE-ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Mustafa Sabri KOVANCI

TOPLAM SAYFA SAYISI: 85 Sayfa

ORJİNALLIK RAPORU

% 16	% 9	% 4	% 13
BENZERLİK ENDEKSİ	İNTERNET KAYNAKLARI	YAYINLAR	ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

BİRİNCİL KAYNAKLAR

1	Submitted to Ordu Üniversitesi Öğrenci Ödevi	% 5
2	www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080 İnternet Kaynağı	% 1
3	Submitted to Okan Üniversitesi Öğrenci Ödevi	% 1
4	www.journalagent.com İnternet Kaynağı	% 1
5	Submitted to TechKnowledge Turkey Öğrenci Ödevi	% 1
6	toad.halileksi.net İnternet Kaynağı	<% 1
7	Submitted to Beykent Üniversitesi Öğrenci Ödevi	<% 1
8	dergipark.org.tr İnternet Kaynağı	<% 1

9. ÖZGEÇMİŞ

I. Bireysel Bilgiler

Adı-Soyadı: Mustafa Sabri KOVANCI

Doğum Yeri ve Tarihi: Çorum - 06.07.1994

Uyruğu: T.C.

İletişim Adresi ve Telefonu: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Altındağ/Ankara - 0 (312) 324 20 13/177

II. Eğitim

Yüksek Lisans: 2018 - Devam ediyor, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Lisans: 2012-2017, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

III. Mesleki Deneyim

Hemşire: Ekim 2017- Mart 2018, Fatsa Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi

Araştırma Görevlisi: 2018- Devam ediyor, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı