

# SÜREKLİ ÖFKE (SL-ÖFKE) VE ÖFKE İFADE TARZI (ÖFKE-TARZ) ÖLÇEKLERİ ÖN ÇALIŞMASI

A. Kadir Özer  
Uygulamalı Psikoloji Hizmetleri  
B.U., M.U. Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi

## ÖZET

Bu makalede, Sürekli Öfke (SL-ÖFKE) ve Öfke İfade Tarzi (ÖFKE-TARZ) ölçeklerinin (Spielberger, 1988) Türkçeye uyarlanmasına ilişkin yapılan bir dizi araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Çeşitli örneklemelere uygulanan SL-ÖFKE ölçeğinin alfa değerlerinin .67 ile .92 arasında olduğu gözlenmiştir. ÖFKE-TARZ ölçeğinin faktör analizine tabi tutulması sonucunda, orijinalinde olduğu gibi, maddeLER, öfkenin kontrolünü ölçen ÖFKE-KONTROL; dışavurumunu ölçen ÖFKE-DIŞA ve içe tutulmasını ölçen ÖFKE-İÇTE alt ölçeklerini yansitan faktörlere yiğilmiştir. ÖFKE-KONTROL, ÖFKE-DIŞA ve ÖFKE-İÇTE ölçeklerinin alfa değerleri, sırasıyla, .80-.90, .69-.91 ve .58-.76 arasında bulunmuştur. Tansiyon hastalarını içeren bir çalışmada, "yüksek" tansiyon hastalarının, kontrol grubuna oranla öfkeleri içe; "sınırdı" tansiyon hastalarının ise öfkeleri dışa vurma eğiliminde olduklarına ilişkin bulgular, ÖFKE-TARZ ölçeği için önemli bir kriter geçerliliği sağlamıştır. Söz konusu ölçeklerin gelecek çalışmalarında test, tekrar-test güvenilirlik değerlerinin araştırılmasında yarar vardır.

## ABSTRACT

In this particular article, data from a series of studies related to the adaptation of Trait Anger (T-Anger) and Anger Expression Scales (AngerEX) (Spielberger, 1988) to Turkish are reported. It was found that the alfa coefficients of T-Anger ranged from .62 to .92. Application of factor analysis to the items of the Turkish version of AngerEX verified rather clearly that the items clustered into factors that reflected the Anger/Control, Anger/Out and Anger/In subscales of the original AngerEX scale.

The alfa coefficients for the Anger/Control, Anger/Out and Anger/In subscales were found to be between .80-.90, .69-.91 and .58-.76, respectively. In a study that involved hypertension patients, the finding that while the "high" hypertensive group suppressed anger, the "borderline" hypertensives expressed anger out significantly more than the controls provided criterion validity for the AngerEX scale. It is suggested that future research should focus on obtaining data with respect to test-re test reliability of the scales.

## GİRİŞ

Sürekli Öfke (SL-ÖFKE) ölçeği ile ilgili çalışmalar, Charles D. Spielberger ve grubu tarafından 1980 başlarında başlatılmış ve geliştirilmiştir (Spielberger, 1980; 1988; Spielberger, Jacobs, Russell & Crane, 1983).

Kaygı çalışmalarında olduğu gibi Spielberger öfke duygusuna "süreklik" ve "durumsallık" kavramsal ayırımı ile bilmektedir. Ona göre durumsal öfke "amaca yönelik davranışın engellenmesi veya haksızlık algılaması karşısında ne şiddette gergilik, kızgınlık, sinirlilik, şiddet gibi subjektif duyumsaların yaşandığını yansitan bir duyu durumudur." Sürekli Öfke ise, durumsal öfkenin genelde ne sıklıkta yaşandığını yansitan bir kavramdır.

Öfkenin durumsallık-süreklik ayrılımı ile incelemesinin yanı sıra, ne şekilde ifade edildiğinin de araştırılmasının önemli olduğu ortaya konmuştur (Spielberger, Johnson, Russell, Crane, Jacobs & Worden, 1985; Spielberger, Krasner & Solomon, 1988). Bu çalışmaların bir ürünü olan Öfke İfade Tarzı (ÖFKE-TARZ) ölçeğinde oluşturulan üç alt ölçekte biri, hissedilen öfkenin bastırılarak içe tu-

tulmasını (ÖFKE-İÇTE), diğeri dışa vurumunu (ÖFKE-DIŞA); bir diğeri de öfkenin, mantığa bürünme, bastırma inkar gibi savunmalarla kontrol edilmesini (ÖFKE-KONTROL) ölçmek için geliştirilmiştir.

Bu makalede yer alan çalışmalar, ÖFKE-SL ve ÖFKE-TARZ ölçekleri ile ilişkilidir. Durumsal Öfke ölçüği ile ilgili çalışmalar henüz ilk aşamalardadır.

### Kullanılan ölçme araçları

#### 1. Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçekleri:

SL-ÖFKE ölçeginin yönergusonde kişinin kendisini genelde nasıl hissettiğini; ÖFKE-TARZ ölçeginde ise genelde ne sıklıkta sözü edilen şekilde davranışlığını belirtmesi istenmektedir. ÖFKE-TARZ ölçeginde maddeler rastgele bir dağılıma göre sıralanmışlardır. Bu dağılım ölçegin İngilizce orijinaline bağlı kalınarak yapılmıştır. Yine bu ölçekte, "ÖFKE-LENDİĞİMDE YA DA KIZDIĞIMDA" ortak tümcesi her üç maddede bir tekrarlanmaktadır. Kişi, herbir maddenin okuduktan sonra yanıtını, "Hemen Hiçbir Zaman", "Bazen", "Çoğu Zaman", "Hemen Her Zaman" seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtir. Ölçekte, alt ölçeklerin herbiri için sekiz maddedir yer almaktadır.

SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçeklerindeki her maddenin dözdür. Maddeler öfkenin yokluğundan değil, varlığından hareketle ölçüm yaparlar. Tepkilerin verilmesinde kullanılan ölçek aralıklarında şu puanlar verilir: "Hemen Hiçbir Zaman" (1); "Bazen" (2); "Çoğu Zaman" (3) ve "Hemen Her Zaman" (4). SL-ÖFKE ölçeginde toplam puan, herbir maddede elde edilen ölçek aralığı puanlarının toplanmasıyla elde edilir. SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçeklerinin maddeleri ve puanlanması makalenin sonunda "Ek" olarak verilmiştir.

SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçeklerinin Türkçe'ye çevrilme çalışması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, ölçek maddeleri, doktora derecesi olan, Türkçe ve İngilizce dillerine eşdeğerde hakim beş psikoloğa verilmiştir. Herbirinden, ölçek maddelerini, içeriği en iyi yansıtacak şekilde Türkçe'ye çevirmeleri istenmiştir. Beş kişiden oluşan bu "hakem" grubunun, herbir maddenin üzerinde sergiledikleri benzerlikler ve farklılıklar incelendikten sonra, herbir maddenin İngilizce orijinalinin altına hakemlerden elde edilen seçenekler sıralanmıştır. Herhangi bir hakemin çevirisi, diğer herhangi bir

hakemin çevirisine tıpatıp uygun olmadığı takdirde incelemeye alınarak katı bir standart uygulanmıştır.

Bu şekilde oluşturulan ölçekler, ikinci aşamada, yine her iki dile hakim 25 kişilik başka bir gruba verilmiştir. Grup üyelerinin herbirinden İngilizce maddeleri okumaları ve Türkçe çeviri seçenekleri arasında, anlamı en iyi şekilde yansitan işaretlemeleri istenmiştir. Çeviri seçenekleri arasında çoğunluk tarafından işaretlenen seçenek söz konusu maddede için Türkçe seçenek olarak kabul edilmiştir.

### Örneklem

SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçekleri ilk aşamada üniversite (52), lise son (53), hemşirelik meslek lisesi (113) öğrencilerine, yöneticilere (78) ve psikolojik danışma için başvurmuş "nörotik" gruba uygulanmıştır. Bu ilk çalışmada (Özer, 1992), öfke ölçeklerinin yanı sıra, kavram ve kriter geçerliğini incelemek amacıyla diğer ölçekler de deneklere verilmiştir. Bu çalışma sonrasında, ÖFKE-TARZ ölçegindeki üç maddenin, maddenin, madde bırakma ve faktör ağırlıklarının düşük olması üzerine, ifade edilişlerinde değişiklik yapılmıştır. Onuçüncü maddenin ilk şekli "İçime atarım" iken, "Öfkemi içime atarım" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, maddenin "Kabul etmek istedigimden da öfkeliyimdir" iken, "Bellii ettiğimden daha öfkeliyimdir" e; maddenin "İnsanların farkettiğinden çok daha fazla sınırlenirim" iken, "İçimden, insanların farkettiğinden çok daha fazla sınırlenirim" e dönüştürülmüştür.

Bu düzeltmelerden sonra, 81 hipertansiyon hastasını içeren bir çalışmada (Özer, Erer, Kocabas & Canberk, 1993), öfke ölçeklerinin kavram geçerliği araştırılmıştır. Son olarak, öfke ölçekleri, 98 üniversite, 134 hemşirelik meslek lisesi öğrencisine verilerek faktör yapıları incelenmiştir.

### İç-Tutarlık

Tablo 1 SL-ÖFKE, Tablo 2 ise ÖFKE-TARZ ölçeklerinin şimdiden kadar çalışılmış grupların tümünde elde edilen madde-bırakma korelasyonlarını ve alfa katsayılarını göstermektedir. Tablo 1 ve 2 incelediğinde, ölçeklerin iç-tutarlıkla ilgili değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde oldukları görülmektedir. Örneklemlerarası farklılıklara bakıldığından, SL-ÖFKE ölçeginin alfa değerlerinin, tansiyon hastaları, nörotik grup ve yönetici grubunda, öğrenci grup-

larına kıyasla daha yüksek çıktıları gözlenmektedir. Tansiyon hastaları örnekleminde elde edilen alfa katsayılarının genelde, diğer örneklemede elde edilenlerden daha yüksek çıktıları görülmektedir.

Bu çalışmada, SL-ÖFKE ölçünün öğrenci gruplarında elde edilen alfa değerleri .67 ile .82 arasında değişmektedir. Spielberger ve arkadaşlarının (1983) bu ölçek ile ilgili buldukları alfa değerleri .82 ile .90 arasında değişmektedir.

Spielberger ve arkadaşlarının ÖFKE-TARZ alt ölçeklerinin öğrenci örneklemlerinde elde ettikleri alfa değerleri .85 (ÖFKE-KONTROL), .76 (ÖFKE-DIŞA) ve .74 (ÖFKE-İÇTE) (1988) olarak belirlenmiştir. ÖFKE-TARZ ölçünün uygulandığı çeşitli örneklemlerde elde edilen alfa değerleri ÖFKE-KONTROL için .80 ile .86; ÖFKE-DIŞA için .72 ile .83, ve ÖFKE-İÇTE ölçüği için .60 ile .73 arasında bulunmuştur.

**Tablo 1**

**Sürekli Öfke Ölçeği (SL-ÖFKE) Madde-Bırakma ve Alfa Katsayıları**

	Hemşire Meslek		Tansiyon			
	Üni. Öğr.	Lisesi Öğr.	Lise Son Yöneticiler	Tansiyon Nörotik Hast..		
	1*	2	1	2		
Madde No	N= 52	98	113	134	53	78
					42	81
1	.55	.53	.53	.51	.44	.45
2	.59	.49	.37	.37	.50	.49
3	.66	.51	.53	.54	.50	.63
4	.44	.43	.35	.30	.31	.50
5	.33	.29	.45	.19	.29	.36
6	.57	.56	.41	.58	.17	.24
7	.41	.38	.44	.56	.33	.51
8	.40	.51	.39	.41	.15	.39
9	.64	.33	.55	.52	.38	.54
10	.52	.46	.47	.44	.31	.46
Alfa	.82	.77	.78	.78	.67	.79
					.84	.91

(\*) (1) ilk araştırmada, (2) en son araştırmada kullanılan örneklemleri ifade etmektedir.

**Tablo 2**  
**Öfke Tarzı Ölçeği Alt Ölçeklerinin Madde-Bırakma ve Alfa Katsayıları**

	Hemşire Meslek		Tansiyon		Nörotik Hast..			
	Üni. Öğr.	Lisesi Öğr.	Lise Son Yöneticiler	Tansiyon Nörotik Hast..				
	1	2	1	2				
Madde No	N= 52	98	113	134	53	78	42	81
ÖFKE-KONT.								
11	.77	.74	.60	.63	.60	.57	.61	.77
14	.54	.53	.57	.70	.39	.58	.66	.71
18	.61	.65	.46	.59	.58	.57	.52	.75
21	.73	.64	.67	.54	.62	.59	.53	.75
25	.67	.64	.57	.61	.51	.57	.37	.69
28	.36	.41	.57	.29	.27	.28	.32	.28
30	.37	.59	.62	.50	.55	.47	.57	.76
34	.76	.59	.52	.61	.59	.71	.60	.84
Alfa	.86	.86	.84	.83	.80	.82	.81	.90
ÖFKE-DIŞA								
12	.66	.56	.46	.53	.33	.34	.61	.68
17	.30	.22	.50	.54	.45	.19	.30	.73
19	.42	.26	.43	.51	.34	.33	.48	.69
22	.64	.27	.46	.69	.51	.46	.60	.66
24	.62	.42	.35	.56	.37	.48	.60	.81
29	.62	.52	.40	.65	.64	.48	.49	.79
32	.48	.59	.35	.58	.50	.41	.18	.69
33	.47	.48	.37	.37	.52	.36	.23	.63
Alfa	.81	.77	.72	.83	.76	.69	.74	.91
ÖFKE-İÇTE								
13	.18	.12	.06	.02	.30	.21	.21	.47
15	.29	.34	.35	.30	.22	.19	.48	.06
16	.38	.53	.31	.33	.20	.28	.52	.27
20	.32	.45	.26	.17	.33	.40	.37	.50
23	.59	.55	.43	.58	.25	.49	.59	.51
26	.38	.48	.36	.42	.34	.33	.46	.53
27	.40	.50	.33	.58	.44	.30	.58	.66
31	.52	.47	.40	.53	.30	.11	.50	.76
Alfa	.69	.73	.61	.66	.60	.58	.77	.76

**Tablo 3**  
**ÖFKE-TARZ Ölçeği Maddelerinin, Tansiyon Hastaları (81),**  
**Üniversite Öğrencileri (98) ve Hemşirelik Öğrencileri (134)**  
**Örneklemelerinde, 3-Faktöre Dayalı Varimaks Rotasyonlu**  
**Analizlerden Elde Edilen Faktör Ağırlıkları, Faktörlerin**  
**Eigen Değerleri ile herbir Faktörün Toplam Puandaki**  
**Değişimi Açıklama Yüzdeleri.**

TANŞİYON HASTALARI  
 FAKTÖRLER

	I	II	III
ÖFKE-KONTROL			
11	(-.67)		.39
14	(-.50)		.55
18	(-.63)		.54
21	(-.52)		.50
25	(-.67)		.30
28			.67
30	(-.47)		.66
34	(-.80)		.39
ÖFKE-DIŞA			
12	.69		
17	.85		
19	.70		
22	.72		
24	.83		
29	.83		
32	.73		
33	.70		
ÖFKE-İÇTE			
13	(-.70)	.52	
15		.33	(-.56)
16		.57	(-.56)
20	(-.50)	.65	
23		.76	
26		.79	
27		.84	
31			
Eigen Değeri	10.32	3.29	1.47
Değişim %	43.0	13.7	6.1
Katkı %			

**Korelatif İlişkiler:**

SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçeklerinin Sürekli Kaygı Envanteri (Öner, 1983), Depresif Sıfatlar Lisesi (Özer, 1993) ve Öfke Envanteri (Özer, 1975) ölçek puanlarıyla olan korelasyon katsayıları Tablo 4'de gösterilmiştir.

Tablodan gözlenebileceği gibi, SL-ÖFKE ölçeği puanlarının Öfke Envanteri puanları ile korelasyonu, paralel (concurrent) geçerlilik açısından makul sınırlar içinde değerlendirilebilir. SL-ÖFKE ölçeğinin kaygı ile .40 ve depresyon ile .33 olan korelasyonları, bu üç duygusal eğilimin içine olduğuna bir gösterge olarak alınabilir. Spielberger ve arkadaşlarının (1988) bulgularına paralel olarak SL-ÖFKE ve ÖFKE-DIŞA ölçeklerinin korelasyonları oldukça yüksek çıkmıştır. Ayrıca, bu iki ölçünün ÖFKE-KONTROL ölçeği puanları ile oluşturdukları ters ve yüksek korelasyonlar beklenen doğrultudadır. ÖF-

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ  
FAKTÖRLER

	I	II	III
<b>ÖFKE-KONTROL</b>			
11	.81		
14	.65		
18	.70		
21	.65	(-.40)	
25	.69		
28	.63		
30	.59		
34	.64		
<b>ÖFKE-DIŞA</b>			
12	(-.44)	.55	
17		.33	
19		.40	
22		.59	
24	(-.46)	.32	
29		.57	
32	(-.49)	.54	
33		.71	
<b>ÖFKE-İÇE</b>			
13	.42		
15		.45	.45
16		.67	
20		.62	
23		.69	
26		.66	
27		.64	
31		.60	
Eigen Değeri	6.22	3.20	1.72
Değişime Katkı %	25.9	13.4	7.2

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ  
FAKTÖRLER

	I	II	III
<b>ÖFKE-KONTROL</b>			
11	.69		
14	.76		
18	.73		
21	.62		
25	.70		
28	.39		
30	.59		
34	.65		
<b>ÖFKE-DIŞA</b>			
12	(-.34)	.47	
17		.66	
19		.43	.30
22		.73	
24	(-.42)	.45	.34
29		.67	
32	(-.45)	.40	.40
33		.76	
<b>ÖFKE-İÇE</b>			
13	.55		
15		.38	.37
16			.58
20		.47	.32
23			.72
26			.56
27			.68
31			.70
Eigen Değeri	7.08	2.64	1.63
Değişime Katkı %	29.5	11.0	6.8

KE-İÇTE ölçünün SL-ÖFKE ile korelasyonu .35 olup, ÖFKE-KONTROL ölçü ile oluşturduğu korelasyon tüm grup ele alındığında sıfırdır. ÖFKE-İÇTE ölçünün, diğer alt ölçeklere kıyasla, kaygı ve depresyon ölçümleri ile oluşturduğu manidar düzeydeki korelasyonlar, bu ölçünün öfkenin bastırılmasının ötesinde, nörotik eğilimleri de yakalayabildiği şeklinde değerlendirilebilir.

ölçeklerinde elde ettikleri ortalamalar, sırasıyla, 16.58 ve 18.69'dur. Bu ortalamalar, Spielberger ve arkadaşlarının (1985) saptadıklarının tam tersidir. Yani, onların çalışmalarında ÖFKE/DIŞA ölçünde elde edilen ortalama ÖFKE/İÇTE ölçünginkinden daha yüksektir. Hatırlanacağı gibi, bu çalışmadaki lise grubu, üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin bu hazırl-

**Tablo 4**  
**SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ alt ölçeklerinin Sürekli Kaygı (SL-Kaygı)- Depresif Sıfatlar Listesi (DSL) ve Öfke Envanteri (ÖE) ile olan Korelasyonları**

	SL-Kaygı	DSL	ÖE	SL-ÖFKE	ÖFKE KONT.	ÖFKE DIŞA
<b>SL-ÖFKE</b>						
Toplam	.40*	.33**	.53**			
Üni. (N=150)	.33*	.19	.41*			
Nöro. (N=64)	.37*	.35	.53**			
Yöne. (N=78)	.24	.05	.59**			
<b>ÖFKE-KONT.</b>						
Toplam	-.08	-.16	-.18	-.48		
Üni.	-.25	-.01	-.30	-.60**		
Nöro.	.21	-.17	.03	-.17		
Yöne.	.09	-.05	-.10	-.45**		
<b>ÖFKE-DIŞA</b>						
Toplam	.24	.12	.27	.62**	-.48	
Üni.	.23	.17	.27	.66**	-.66	
Nöro.	.18	.04	.29	.57	-.20	
Yöne.	.13	.01	.16	.57**	-.44	
<b>ÖFKE-İCTE</b>						
Toplam	.35**	.39**	.31**	.48**	.01	.26**
Üni.	.26	.38*	.45**	.57**	-.23	.35
Nöro.	.43*	.25	.30	.48**	.37*	.23
Yöne.	.28*	.37**	.21	.28	-.09	.10

\*P<.01

\*\*P<.001

#### Normatif Bulgular:

Tablo 5, SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ alt ölçeklerinin çeşitli grupparda elde edilen ortalama ve standart sapmalarını göstermektedir. Ayrıca bu tabloda, grup ortalamalarının varyans analizi ile karşılaştırmasını içeren F- oranları ve istatistiksel anlamlılık düzeyleri de verilmiştir.

Lise öğrencilerinin ÖFKE/İCTE ve ÖFKE/DIŞA

lik dönemi içinde yaşadıkları yüklü fiziksel ve psikolojik stresin öfke duygulanımını dışa vurma eğilimini yükseltmiş olabileceği söylenebilir. Bu açıdan bakıldığından, grubun hem SL-ÖFKE ve herde diğer alt ölçeklerden aldıkları puanlar bir kriter geçerliği bulgusu olarak kabul edilebilir.

SL-ÖFKE ölçünde en yüksek puanlar Lise ve Nörotik gruplardan elde edilmiştir. Bu iki grubun o-

ortalamaları yönetici ve hemşirelik öğrencileri gruptlarından elde edilen ortalamalardan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur ( $LSD=3.33$ ,  $p<.05$ ). Bunun yanı sıra, nörotik grubun ÖFKE/İÇTE ortalamasının diğer grupların herbiriin ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksek çıkması ( $LSD=2.50$ ,  $p<.05$ ), bu ölçeğin nörotik sorumlarda söz konusu olan öfkeyi bastırma eğilimini oldukça iyi yakalayabildiğini göstermektedir.

ÖFKE/KONTROL ölçüğünde en yüksek ortalamaların, yönetici ve üniversite öğrencileri gruplarına ait olduğu görülmektedir. Yönetici grubunun ortalaması, hem lise hem de nörotik grubun ortalamalarından istatistiksel anlamlılıkta yüksek bulunmuş iken, üniversite öğrencilerinin ortalamasının sadece lise öğrencilerinininkinden anlamlı ölçüde yüksek olduğu saptanmıştır ( $LSD=3.19$ ,  $p<.05$ ).

**Lise Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri, Yönetici, Nörotik ve Hemşirelik Öğrencileri Gruplarında Elde Edilen Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Tek - Yönlü Varyans Analizinin Saptadığı F-Oranları**

		Lise Öğr.	Üni. Öğr.	Yöne.	Nöro	Hemş. Öğr.	F-Oranı
SL-ÖFKE	ORT.=	23.70	21.30	19.15	23.92	20.96	10.80***
	SS.=	4.10	5.28	4.20	5.63	4.69	
SL-ÖFKE	ORT.=	19.45	22.28	23.47	20.76	20.73	7.89***
	SS.=	3.96	5.69	4.11	4.53	4.73	
SL-OFKE	ORT.=	18.69	16.89	15.46	17.21	15.98	7.34***
	SS.=	4.06	4.16	3.15	4.03	3.41	
SL-ÖFKE	ORT.=	16.58	17.01	16.46	19.00	16.15	5.04***
	SS.=	3.20	3.84	3.18	4.42	3.42	

\*\*\* $P<.001$

#### Kriter Geçerliği:

Öfke duygusuyla "hipertansiyon" arasındaki ilişkiye inceleyen araştırmalarda (Johnson, 1988; Netter ve Neuhaeuser-Metternich, 1991), hipertansiyon hastalarının genelde daha sık öfke yaşadıklarına ve öfkelerini "bastırıldıklarına", ilişkin veriler bulunmuştur. SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçüklerinin kriter geçerliğini araştırmak üzere yüksek tansiyon hastalarını içeren bir araştırma yapılmıştır (Özer, Erer, Kocabas ve Canberk, 1993). Bu

araştırmada, hipertansiyon hastaları "sınırda" (borderline) ve "yüksek" alt gruplarına ayrılarak, hipertansiyon sorunu olmayan bir hasta grubuya SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçekleri puanları açısından karşılaştırılmışlardır. Tablo 6 bu gruptarda elde edilen ortalamaları, standart sapmaları ve grupların varyans analizi ile karşılaştırılmalardan elde edilen F-oranlarını göstermektedir.

Tablodaki bulgular, SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçeklerinin kriter geçerliğine önemli ölçüde ışık tutmaktadır. SL-ÖFKE puanlarının ortalamalarına bakıldığından, gruplar arasında manidar bir farklılık olduğu görülmektedir,  $F(2,106)=3.58$ ,  $p<.04$ . Teketek grup karşılaştırmalarında, sadece "sınırda" hipertansiyon grubunun ortalamasının kontrol grubundan manidar düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur ( $LSD=2.80$ ,  $p<.05$ ).

**Tablo 5**

**Lise Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri, Yönetici, Nörotik ve Hemşirelik Öğrencileri Gruplarında Elde Edilen Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Tek - Yönlü Varyans Analizinin Saptadığı F-Oranları**

ÖFKE-TARZ alt ölçeklerine bakıldığından, sadece ÖFKE/DIŞA ölçüğünde manidar bir F-oranı olduğu görülmektedir,  $F(2,106)=3.28$ ,  $p<.04$ . "Sınırda" hipertansiyon grubunun, hem yüksek hipertansiyon hem de kontrol grubunun ortalamalarından manidar düzeyde farklı olduğu görülmektedir ( $LSD=2.80$ ,  $p<.05$ ).

ÖFKE/KONTROL ölçüğünde en düşük ortalamaya "sınırda" hipertansiyon grubunda görülmekle birlikte, varyans analizi manidar bir F-oranı üretmemiştir.

ÖFKE/İCTE ortalamalarının varyans analizi gruplar arasında manidar bir farklılık göstermemekle birlikte, tek tek karşılaştırmalarda yüksek hipertansiyon grubunun ortalamasının kontrol grubunun ortalamasından manidar düzeyde farklı olduğu görülmüştür ( $LSD=2.80$ ,  $p<.05$ ).

Bu araştırma, SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçeklerinin literatürde saptanmış olan hipertansiyon ve öfke ilişkisini doğruladığını göstermektedir. Bunun da ötesinde bulgular, literatüre, hipertansiyon konusuna "sinirda" ve "yüksek" ayırmını yaparak yaklaşmanın, öfke ile hipertansiyon ilişkisini daha isabetli bir şekilde anlamaya yardımcı olacağını katkısını da yapmaktadır.

.80 ile  $\alpha=.90$ ; ÖFKE/DIŞA'nın  $\alpha=.69$  ile  $\alpha=.91$  ve ÖFKE/İCTE'nin  $\alpha=.58$  ile  $\alpha=.76$  arasında olduğu gözlenmiştir. Bu değerler, kabul edilebilir sınırlar içinde olup, ölçeklerin orijinaliyle ilgili yayınlanmış olan verilerle genelde tutarlılık göstermektedir. ÖFKE/İCTE ölçünün alfa değerlerinin diğerlerine kıyasla daha düşük olması, bu ölçünün madde yapısının daha heterojen olduğunu göstermektedir. Nitelik, bu ölçünün kaygı ve depresyon eğilimleri ile koreasyonlarının diğer alt ölçeklere kıyasla daha yüksek çıkması, madde yapısının, öfkenin bastırılmasının ötesinde başka eğilimleri de yakaladığına bir gösterge olarak alınabilir. Bu aşamada, ölçek-

**Sinirda, Yüksek ve Hasta Kontrol Gruplarında Elde Edilen Ortalama, Standart Sırpma ve Varyans Analizinin Saptadığı F-Oranları ve Manidarlık Düzeyleri.**

		"Yüksek" (N=50)	"Sinirda" (N=31)	Hasta Kontrol Grubu (N=28)	F-Oranı	Manidar Düzeyi
SL-ÖFKE	ORT.= SS.=	23.14 7.43	24.96 5.96	20.57 5.59	3.28	.04
ÖFKE-KONT.	ORT.= SS.=	23.56 6.20	20.96 5.40	23.14 5.26	2.04	.13
ÖFKE-DIŞA	ORT.= SS.=	14.52 5.57	17.12 4.97	14.28 3.59	3.28	.04
ÖFKE-İCTE	ORT.= SS.=	18.88 4.62	17.74 4.14	16.71 3.79	2.36	.09

### TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Spielberger ve arkadaşları tarafından orijinali İngilizce olarak geliştirilen SL-ÖFKE ölçeği ve ÖFKE-TARZ alt ölçeklerinin (ÖFKE/KONTROL, ÖFKE/DIŞA, ÖFKE/İCTE) Türkçeleri, yapılan bir dizi çalışmaya, ölçek geliştirmede önemli görülen belirli bazı ölçütleri yeterli ölçülerde karşılar görünümektedir.

Güvenirlilik çalışmalarında, ölçeklerin iç-tutarlılık değerleri üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. SL-ÖFKE ölçünün çeşitli örneklemelerde elde edilen alfa değerleri  $\alpha=.67$  ile  $\alpha=.92$ ; ÖFKE/KONTROL'ün

rin test-tekrar test güvenilirlik katsayıları yoktur. İerde bu değerlerin araştırılması ile ölçeklerin güveniligi önemli ölçüde pekişecektir.

ÖFKE-TARZ ölçünün faktör analizi sonuçları, orijinal ölçekte varsayılan yapıyı oldukça isabetli bir şekilde onaylamaktadır. Faktör analizi, Üniversite öğrencileri ve hemşirelik meslek lisesi öğrencileri örneklemelerinde, ÖFKE/KONTROL faktörünün birinci ve ağırlıklı faktör olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Bu, Spielberger ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarındaki bulgularla tutarlıdır. Tansiyon hastaları örneklemesinde birinci faktör, ÖFKE/İCTE ölçünün maddelerinden oluşmaktadır. Bu bulgu, li-

terатурde öfkenin bastırılması ve hipertansiyon ilişkisiyle tutarlıdır. Nitekim, kriter geçerliliği amacıyla yapılan araştırmada, SL-ÖFKE ÖLÇEĞİ ve ÖFKE-TARZ Ölçeklerinin, tansiyon hastalarını kontrol grubundan oldukça net bir şekilde ayırdığı saptanmıştır.

SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçek puanlarının yüzde sıralamasının 15 ve T-puanı olarak karşılıklarının bu aşamada oluşturulması erkendir. Bu aşamada, ölçeklerden elde edilen puanların, araştırma ve klinik tanımlama amacıyla kullanımlarında bu raporda sunulan ortalama ve standart sapmaların kullanılması uygun olacaktır.

### KAYNAKLAR

- Johnson,E.H. (1988). The role of the experience and expression of anger and anxiety in elevated blood pressure among black and white adolescents. *Journal of National Medical Association*, 81, 573-584.
- Lubin,B. (1967). *Manual for The Depression Adjective Check Lists*. San Diego: Educational and Industrial Testing Service.
- Netter,P., ve Neuhaeuser-Metternich,S. (1991). Types of aggressiveness and catecholamine response in essential hypertensives and healthy controls. *Journal of Psychosomatic Research*, 35, 409-419.
- Novaco,R.W. (1975). *Anger control: The development and evaluation of an experimental treatment*. Lexington, MA: D.C. Health.
- Öner,N.P. (1983). State and trait anxiety in Turkish patients and normals. In C.D.Spielberger & R.Diaz-Guerrero (Eds.), *Cross-cultural anxiety*, (Vol.2). Washington: Hemisphere, 107-119.
- Özer,A. (1992). A preliminary validation study of Anger Expression and Trait Anger scales in Turkish Samples. Yayınlanmamış Monograf, İstanbul:Uygulamalı Psikoloji Hizmetleri.
- Özer,A. (1993). Öfke, kaygı ve depresyon eğilimlerinin bilişsel alt yapısıyla ilgili bir çalışma. *Türk Psikoloji Dergisi*, 9, 12-25.
- Özer,A., Erer,Ş., Kocabas,Z. ve Canberk,A. (1993). Comparison of borderline hypertensive, high hypertensive and nonhypertensive patients in trait anger, anger expression, trait anxiety, depression and somatization. *Psychosomatic Medicine*. (Yayınlanmamış makale).
- Spielberger,C.D. (1980). *Preliminary manual for the State-Trait Anger Scale (STAS)*. Tampa,FL: University of South Florida, Human Resources Institute.
- Spielberger,C.D. (1988). *Manual for The State-Trait Anger Expression Scale (STAXI)*. Odessa,FL:Psychological Assessment Resources,Inc.
- Spielberger,C.D., Jacobs,G., Russell,S., ve Crane,R..(1983). Assessment of Anger: The State-Trait Anger Scale. In J.N. Butcher & C.D.Spielberger (Eds.), *Advances in personality assessment*, Hillsdale, NJ:LEA, Vol.2, 159-187.
- Spielberger,C.D., Johnson,E.H., Russell, S.F., Crane,R.J., Jacobs,G.A. ve Worden, T.J. (1985). The experience and expression of anger: Construction and validation of an anger expression scale. In M.A.Chesney & R.H.Roseman (Eds.), *Anger and hostility in cardiovascular and behavioral disorders*. New York:Hemisphere/McGraw-Hill, 5-30.
- Spielberger,C.D., Krasner,S.S. ve Solomon,E.P. (1988). The experience, expression, and control of anger. In M.P. Janisse (Ed.), *Health psychology: Individual differences and stress*. New York:Springer Verlag/Publishers, 89-108.

**Ek:**

SL-ÖFKE ölçeginin maddeleri şunlardır:

1. Çabuk parlarım.
2. Kızgın mizaçlıyım.
3. Öfkesi burnunda bir insanım.
4. Başkalarının hataları yaptığım işi yavaşlatınca kızarım.
5. Yaptığım iyi bir işten sonra, takdir edilmemek canımı sıkar.
6. Öfkelenince kontrolümü kaybederim.
7. Öfkelendiğimde, ağızma geleni söylerim.
8. Başkalarının önünde eleştirmek beni çileden çıkarır.
9. Engellendığımde, içimden birilerine vurmak gelir.
10. Yaptığım iyi bir iş kötü değerlendirildiğinde çitagina dönerim.

ÖFKE-TARZ ölçeginin maddeleri şunlardır:

11. öfkemi kontrol ederim.
12. Kızgınlığımı gösteririm.
13. Öfkemi içime atarım.
14. Başkalarına karşı sabırlıyım.
15. Somurtur ya da surat asarım.
16. İnsanlardan uzak dururum.
17. Başkalarına iğneli sözler söylerim.

18. Soğukkanlılığımı korurum.
19. Kapıları çarpmak gibi şeyler yaparım.
20. İçin için köpürürm ama göstermem.
21. Davranışlarımı kontrol ederim.
22. Başkalarıyla tartışırım.
23. İçimde kimseye söyleyemediğim kınler beslerim.
24. Beni çileden çıkarılan herneyse saldırırım.
25. Öfkem kontrolden çıkmadan kendimi durdurabilirim.
26. Gizliden gizliye insanları epeyce eleştiririm.
27. Belli ettiğimden daha öfkeliyimdir.
- 28.Çoğu kimseye kıyasla daha çabuk sakinleşirim.
29. Kötü şeyler söylerim.
30. Hoşgörülü ve anlayışlı olmaya çalışırım.
31. İçimden, insanların farklılığından daha fazla sinirlenirim.
32. Sinirlerime hakim olamam.
33. Beni sinirlendirene, ne hissettiğimi söylerim.
34. Duygularımı kontrol ederim.

ÖFKE-TARZ ölçeginin ÖFKE-İÇTE alt ölçüği puanı, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27 ve 31; ÖFKE DIŞA alt ölçüği puanı, 12, 17, 19, 22, 24, 29, 32 ve 33; ÖFKE-KONTROL ölçeginin puanları ise, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 30 ve 34 numaralı maddelerde elde edilen ölçek aralığı puanlarının toplanmasıyla elde edilirler.